

Contribution to the knowledge of beetles (Insecta Coleoptera) of some protected areas of Apulia, Basilicata and Calabria (Italy)

Fernando Angelini

Via De Reggio 142, 72021 Francavilla Fontana, Brindisi, Italy; email: angelini_fernando@libero.it

ABSTRACT

The lists of Coleoptera published by the author between 1986 and 1996 concerning the following protected areas from southern Italy are updated: Gargano Promontory, Policoro Wood, Pantano Lake of Pignola, Pollino Massif and Sila Plateau. Data is integrated with subsequent collections of the writer and with bibliographic citations of other authors. With the same criteria the species of further three areas are also listed: Mount Vulture-Monticchio Lakes, Central Lucan Apennines and Aspromonte. A total of 5,130 taxa were recorded for the eight surveyed National or Regional Parks, which are located in Apulia, Basilicata and Calabria regions (Italy). Of these species, 472 are endemic to the Italian territory. The saproxylic species amount to 1,115, their related IUCN category is referred to and an interpretation of the emerging data is suggested. A chronology of the entomological researches carried out in the past has been reconstructed, moreover description of main features and geographical boundaries of the treated sites are provided. All taxa subject of this study are listed in taxonomic order with indication of the areas where their presence occurs and specifying the data source. The total number of species for each family is evaluated area by area and the data on the most representative of Coleoptera families are briefly commented, with remarks on the current state of research.

KEY WORDS

Biodiversity; Coleoptera; National Parks; southern Italy; species.

Received 10.10.2019; accepted 21.02.2020; published online 16.03.2020

INTRODUCTION

The realization of this work stems from the need to update, in the taxonomy and nomenclature, several catalogues on southern Italy Coleoptera published by the author in the decade 1986-1996: Coleotterofauna del Massiccio del Pollino (Angelini, 1986), Coleotterofauna del bosco di Policoro (Angelini & Montemurro, 1986), Coleotterofauna del Promontorio del Gargano (Angelini, 1987), Coleotterofauna dell'Altopiano della Sila (Angelini, 1991) and Coleotterofauna della Riserva Naturale WWF Lago Pantano di Pignola (Angelini, 1996).

The research carried out in the following years by the author has besides produced a significant amount of unpublished data, which here go to integrate those previously published. Likewise, to offer an overview as accurate and complete as possible of the current state of knowledge on the Coleoptera in these areas, all the species and data reported by other authors in the vast bibliography (annexed) have been added.

It has been decided to expand the portion of territory examined in the previous catalogues to include the Park of the Mount Vulture-Monticchio Lakes, the Central Lucan Apennines and the Aspro-

monte since for these areas the amount of data collected over the years is significant and at the same time there is a body of literature that dates back to the first entomological explorations of Southern Italy, going back to the last quarter of XVIII century. Map of figure 1 shows the general location of all the study areas.

For the Gargano Promontory, data from Holdhaus (1911), previously excluded by Angelini (1987), are also included.

It is necessary to present the unpublished or bibliographic data in the form of a table rather than provide a full list with accurate information on the collection localities since this solution, although more appropriate, would require a remarkably more voluminous contribution; a similar update is underway, with comprehensive detail of all the localities, bibliographic references and status changes that have occurred over time, to be published exclusively online.

The coleopterological researches in Apulia, Basilicata and Calabria

The extreme south of Italy is a reservoir of great biodiversity and of a fauna with a rather different composition than the rest of the Peninsula. Entomo-



Figure 1. Study areas: in black, the location of the eight sites in southern Italy covered by this study.

logically, this territory suffered greatly during the 19th century due to the substantial lack of naturalists native to these regions and for the difficulty of connections by land (Salfi, 1963: 4) because of the local wilderness; it is not a coincidence that the history that will be exposed is clearly different from that of neighboring Sicily (Romano, 2006).

Only in the 20th century, studies on entomofauna have become more systematic, sometimes promoted by Italian universities and museums to acquire valuable study material.

A substantial contribution came from the author's personal researches, being himself favored by residing in Apulia and thus being able to more easily and frequently explore the target regions of this work, and from the many colleagues and friends entomologists with whom he shared fruitful hikes over the years.

The following is a chronicle of the explorations that involved these areas.

1783. The earlier research of which we know about in southern Italy are conducted in Aspromonte (Calabria ulteriore) in 1783 by Giulio Candida and Giuseppe Stefanelli and published by Vincenzo Petagna (1787), which lists 239 species of collected insects. It should be emphasized that this publication was a great success at the time so that the first print, which took place in 1786 and has not been possible to obtain, was followed by others including that of 1787 mentioned in the bibliography and most frequently cited.

1826. Luigi Petagna, Giovanni Terrone and Michele Tenore from 3 to 16 July make a botanical expedition from Naples to Cosenza, visit Monte Sirino and Pollino and mention 4 species of Coleoptera.

1827. Oronzo Gabriele Costa visits the Aspromonte together with Giovanni Gussone in the month of July (Costa A., 1863) and the list of vertebrates and arthropods they found is published 12 years later (Costa O.G., 1839), although the related report is read at the Royal Academy of Sciences the following year.

1851. Christian Suffrian (1851: 79) describes *Chrysolina interstincta* based on two specimens coming respectively from Sicily and Calabria and collected by Ludwig Parreyss (Daccordi & Ruffo, 2005: 121, teste Bourdonné); no other data was

found concerning the research carried out by Parreyss in Calabria.

1859. Achille Costa visits Sila and Aspromonte (Costa A., 1881: 1). Four years later he publishes the data about Aspromonte (Costa A., 1863) listing 577 Coleoptera species, which include those previously mentioned by Petagna (1787).

1870–1875. Giovanni Battista Adami, A. Stefanini, Filippo Fanzago, Guelfo Cavanna and L. Pannato presumably perform entomological research in Calabria in these years and a first list (devoid of collecting sites) of 300 species of Coleoptera is published by Bertolini (1876).

1876. Achille Costa from July 11th to September 12th of 1876 visits Sila, the surroundings of Tiriolo and Cirò and makes known the results of his research five years later (Costa A., 1881: 45–51).

1876. Guelfo Cavanna and other naturalists visit the Aspromonte in the months of May and June and their material is studied by various specialists, but the results are not divulged.

1878. Flaminio Baudi di Selve conducts researches in Calabria: *Omoglymmius germari* (Ganglbauer, 1891) in Mazzei et al. (2019).

1880. Antonio Biondi, Cesare Caroti and Guelfo Cavanna between the 8th and 16th of July 1880 carry out research in Rionero and Mount Vulture and between 24th and 28th of July the same year on Pollino. The results are released by various specialists and the whole list of collected Coleoptera is published by Baudi, Piccioli & Cavanna (1882). Cavanna (1882) also publishes a detailed report about this mission.

1881. (April), 1883 (September), 1884 (May), 1887 (August) Andrea Fiori is in Calabria (in 1884 and 1887 with Flaminio Baudi di Selve); dates of the last three trips are taken from one of his works (Fiori, 1894: 87); many data are disclosed in various papers both by Fiori and Baudi. Most of the citations found in Luigioni (1929) sub “Cal” are taken from these research, and secondarily from the publications mentioned above and a few others that follow.

1887. Andrea Fiori in August visits Sila (Fiori, 1894) and Gargano (Fiori, 1914b); only some of the data are made known in scattered works.

1896. Achille Costa visits Pollino Massif (Salfi,

1963: 19 and Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 13) but does not publish the relevant data.

1905. Gustav Paganetti-Hummler visits Aspromonte for a long time; from one of his papers (Paganetti-Hummler, 1910) can be deduced that he collected in the following periods and localities: April–May in Gerace, Antonimina and Ciminà, from May to the beginning of August in Santa Cristina, Sant’Eufemia and Aspromonte. It is known that a manuscript exists which lists, with collecting localities, the species found in Aspromonte by Paganetti-Hummler (Magistretti, 1960: 111), but unfortunately it was not possible to trace it.

1906. Giacomo Cecconi visits Tremiti Islands between 15 and 25 of February and from 25 of May for a few days. The material collected is published by him two years later (Cecconi, 1908).

1906–1907. Karl Holdhaus visits Gargano from 10 to 30 of May in 1906 accompanied by Hamilkar Stolz and later from 3 to 18 April 1907 together with Alfred Kniž and Moritz Hilf. The latter stayed until the 20th of June to collect Coleoptera on behalf of Otto Leonhard. The results of these researches are published four years later (Holdhaus, 1911).

1909 and 1910. Alfredo Andreini carries out long researches in Basilicata in the surroundings of Latronico and Maratea; from examination of his finds, mentioned in many publications as well as from the direct study of specimens he collected and are now kept in the Dodero collection at Genoa (Poggi i.l.), it is possible to establish that he stayed there from April 21 to September 20 of 1909; instead for the year 1910 the timespan of its permanence is not possible to ascertain.

1911, 1912 and 1913. Andrea Fiori visits Mount Vulture in the month of May 1911 (Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 15). From 15th of April to 4th of June 1912 he makes researches in Calabria and Sicily (Fiori 1915a and 1915b). In 1913 he goes on Gargano (Fiori, 1914b, 1915a). Only a few individual findings are published in the above mentioned works.

1913. Adolfo Falzoni explores Sila in the month of June (Fiori, 1914a: 18).

1921. Andrea Fiori in August visits Sila: *Clinidium canaliculatum* (O.G. Costa, 1839) in Mazzei et al., 2019).

1923. Giuseppe Müller visits Mount Vulture (Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 15).

1925. Arturo Schatzmayr visits Mount Vulture in May (Schatzmayr, 1926: 145, sub *Oedemera subulata* Olivier, 1790 = *Oedemera pthysica* (Scopoli, 1763).

1926. Jaroslav Štorkán searches the Gargano in June. A list of species not previously mentioned by Holdhaus (1911) is published by Roubal (1932).

1933. An examination of Zombori's work (1984) shows that Agostino Doderò collected beetles in Sila at Camigliatello from 27 May to 23 August 1933; further data related to Cosenza and San Pietro in Guarano are deduced from the publications of Poggi (2009) and Liberti & Poggi (2018). Reference to his findings is also present in papers by other authors.

1933. Arturo Schatzmayr and Carl Koch visit Pollino in July (Tassi, 1966a: 1 and Magistretti 1955: 1); only three contributions are published on this mission (Koch, 1933a, Koch, 1933b and Wittmer, 1935).

1934, 1937 and 1940. Alessandro Ghigi explores Gargano in August 1934, then in 1937 (unknown period) and again, together with Francesco Pio Pomini, in the second half of April. Between the end of May and 5 June 1940 both of them, besides Gargano, also visit the Tremiti Islands. The results are published by Gridelli (1949b).

1939. Lars Brundin & Thure Palm visit Pollino in June and in a short note several species of Coleoptera are reported (Palm, 1939). The Curculionidae collected in this expedition are treated by Magnano (1957a), and Cerambycidae by Tassi (1966a). Various data are disclosed in works by other authors, including the description of some new species (Nyholm, 1948).

1939. Edgardo Moltoni from June 25 to July 14 collects in Sila and results are published by Schatzmayr (1941 and 1943).

1941–1945. Alessandro Focarile in July 1941 and, with Giovanni Mariani, in April 1942 is on Mount Vulture; between 5 September 1943 and 10 April 1945 he carries out research in various places in Apulia and Basilicata including Mount Vulture and Pollino Massif (Focarile, 1959: 18). The results

of these researches were only published in small part by different authors.

1948. Giovanni Binaghi visits Gargano in the spring; only a few of these data are published (Binaghi, 1948).

1948, 1949, 1950 and 1957. Sandro Ruffo, Edoardo Gridelli, Antonio Giordani Soika, Mario Magistretti and Angelo Pasa go to Gargano, Tremiti Islands, Murge and Salento as part of a research on Apulian fauna promoted by Umberto D'Ancona of the Institute of Adriatic Studies (Gridelli, 1949b: 148; Magistretti, 1966: 8 and Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 21). The results are published by Gridelli (1949a, 1949b and 1950), by Ruffo (1955) as well as by about fifteen Italian and foreign specialists in the journal "Memorie di Biogeografia Adriatica" (1950–1962) (Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 21).

1950. Giovanni Binaghi in May is in Sila and in Aspromonte, only some data is published in various works.

1950, 1951 and 1953. Marcello La Greca, Michele Sarà and R. Capaldo (7 July–10 August 1950), Sandro Ruffo, Angelo Pasa and Livio Tamani (10–23 June 1951 and 12–24 June 1953) carry out a series of research campaigns on Pollino promoted by Naples University. The results are published between 1950 and 1966 in thirty-two memoirs (Salfi, 1951; Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 21) seventeen of which dedicated to Coleoptera.

1955. Guido Grandi promotes a research campaign for the Institute of Entomology of Bologna University at the Umbra Forest (Gargano). Searches begin on July the 4th and last for about one month; in addition to Grandi himself, Maria Matilde Principi, Giorgio Fiori, Egidio Mellini and Dante Faggioli also take part. The first results are published by Faggioli (1955); the researches conducted are illustrated by Grandi (1956).

1955. Marcello La Greca visits the Tremiti Islands as part of a research project promoted by the Institute of Zoology and Comparative Anatomy of Bari University.

1956–1958. Alessandro Focarile and Giovanni Mariani in these years undertake coleopterological research in 23 sites along the Ionian shorelines of Apulia, Basilicata and Calabria; they do sampling in Policoro Wood on May 27–29 of 1956, June 9 of

1957 and May 24 of 1958. The outcomes of these researches are illustrated in a series of eighteen works released between 1959 and 1979.

1957, 1958, 1963 and 1966. As part of a research project on Apennine fauna promoted by the Civic Museum of Natural History of Verona and coordinated by Sandro Ruffo (started in 1954 with a mission on the Sibillini Mountains), in Aspromonte six expeditions made up of a total of nine members are performed: in May and July 1957, June and August 1958, August 1963, October 1966 (Magistretti & Ruffo, 1969: 388). The results for 16 families are illustrated in eight papers.

1957. Anna and Mario Magistretti, Angelo Pasa, Sandro Ruffo and Livio Tamanini visit Policoro Wood in May (Magistretti & Ruffo, 1969: 387); individual data are published in many papers.

1960. Anna and Mario Magistretti, Angelo Pasa, Sandro Ruffo and Livio Tamanini visit Mount Vulture and the Monticchio Lakes in June (Magistretti & Ruffo, 1969: 387); only single data are published in several works.

1960. Some Roman entomologists, stimulated by Frederick Hartig, go exploring Mount Vulture (Ruffo & Vigna Taglianti, 1988: 15).

1960, 1961, 1962 and 1967. As part of the research on Apennine fauna promoted by the Civic Museum of Natural History of Verona, five missions carried out by a total of seven members visit Sila, the Coastal Chain and Serre Calabre: in June and August 1960, August 1961, August 1962, July 1967 (Magistretti & Ruffo, 1969: 388). The results concerning 12 families of Coleoptera are published in five papers.

1960, 1961, 1962 and 1963. Giorgio Marcuzzi conducts his research in Apulia (comprehensive of Gargano and the Tremiti islands, including Pianosa) and in Basilicata's province of Matera. The results are shown in the works of Marcuzzi (1962) and Marcuzzi & Lafisca Turchetto (1977).

1961. Walter Liebmann visits Aspromonte (Magnano, 1964: 107) but the results do not appear to have been published.

1962. Giovanni Sichel and his colleagues go to Aspromonte (Tassi, 1966: 622) but the outcome of their research is not known.

1963, 1964 and 1967. As part of the research on Apennine fauna promoted by the Civic Museum of Natural History of Verona, four missions composed by a total of five members visit Apulia (Gargano, Murge, Terra d'Otranto) and Basilicata (Matera): in September 1963, June 1964, May and September 1967. Results are partially published in many papers. Just Magistretti (1966) releases data about Carabidae on the basis of all the specimens collected in Apulia in the overall expedition period.

1963. Gunnar Dahlgren from June 27th to July 7th visits Lorica in Sila by himself (from June 9th to June 26th he explores other Calabrian sites: Paola, Rogliano, Cosenza and Castigione) and the results are published (Dahlgren, 1964).

1964. A series of researches on the Central Lucan Apennines, Mount Vulture, Pollino and Policoro is begun by numerous members of the Roman Association of Entomology (Fabio and Mario Cassola, Franco Tassi, Silvio Bruno, Vincenzo Vomero, Gianni Gobbi, Giuseppe Maria Carpaneto, Franco Marozzini, Mario and Giuseppe Pinzari, Francesco Sacco, Paolo Marcello Brignoli, Walter Rossi, Paolo Audisio, Enzo Colonnelli) (Gobbi, 1971a: 28) but only a small part of the enormous amount of data collected is published (Gobbi, 1971a, 1973a, 2018; Colonnelli, 1974a; Gobbi & Piattella, 2008).

1965, 1968, 1970 e 1972. Giovanni Binaghi, Italo Bucciarelli, Alessandro Focarile, Giovanni Mariani, Giuseppe Meggiolaro and Carlalberto Ravizza visit Mount Sirino in the Central Lucan Apennines; only a contribution on the Carabids is presented by Ravizza (1973) as a whole, while the remaining data are individually published in scattered works.

1965–1967. Michele Sarà and Giovanni Salamanna make a series of explorations of the Tremiti Islands in the context of a research on island populations promoted and financed by the National Research Council, in this specific case entrusted to the Institute of Zoology and Comparative Anatomy of Bari University. Data regarding Scarabaeidae family are published by Salamanna (1968).

1968–1976. Helio Pierotti visits Pollino, Sila and Aspromonte on several occasions and announces the results regarding genus *Aphodius* in 1977. Between 1969 and 1973 even Giovanni Dellacasa

repeatedly goes to Sila and Aspromonte and the author's results are included in Pierotti's work (1977).

1968. In the month of July the author's personal searches in southern Italy begin, assiduously lasting for over 40 years for periods varying from 1 to over 20 days. The results of this research have been published only very partially in a series of twenty-eight works, some of which are dedicated to specific areas: Policoro (1986, with F. Montemurro), Pollino (1986), Gargano (1987), Sila (1991), Lago Pantano di Pignola (1996), light traps in Laghi Pantano di Pignola and San Giuliano (1998); other data were recorded in works dedicated to specific families: Hydradephaga (1972–1984), Hydrophilidae (1973 and 1974 with G. Ferro), Ptiliidae (1997, with M. Sörensson), Carabidae (1997, with V. Monzini), Curculionoidea (1997, with R. Caldara), Latridiidae (1999, with W. Rücker), Leiodinae (1985–1995), Cryptophagidae (1981, 1984 and 1996 with J.C. Otero), Malachinii (2001, with C. Pasqual), Phalacridae (1995, with Z. Švec) and Pselaphinae (2001, with G. Sabella). More than 500,000 specimens were collected overall, all studied by specialists (except for several Staphylinidae, Ptiliidae, Nitidulidae, Scydmaeninae, Mordellidae, Scaptidae, Bruchinae, Phalacridae, Corylophidae, Alexidae) and belonging to over 4,500 species. Data also appear in publications of many other authors, including descriptions of about one hundred new species.

1973. As part of the Verona Museum's Programs, Roberto Pace undertakes a series of research in Central southern Apennines and visits in particular Gargano, Pollino Massif, Orsomarso Mountains, Serre Calabre, Sambiasi and Aspromonte. He describes many hypogeous new species in a total of thirteen publications (1974b–2002).

It is deemed of no use to report the researches undertaken after the 1970s, when connections became easier and many were the entomologists who visited the southern regions. Related data are dispersed in an endless series of works (well over 300, with descriptions of more than 140 endemic species) while there are no coordinated research campaigns with overall publication of the data.

From the late 1980s to date, Pietro Brandmayr and his collaborators have been a reference point for entomological research mainly in Sila, but also

in other territories from Aspromonte to Pollino. Their research, though essentially aimed at ecological studies, in particular about Carabidae used as environmental indicators, has not left out the other Coleoptera families, especially the saproxylic beetles. With their results they have produced dozens of works, both of divulgative and scientific nature, also including descriptions of new species.

MATERIAL AND METHODS

Study areas

Only in the last thirty years the eight areas covered by this study have been gradually placed under special protection through the establishment of several National and Regional Parks. Entomological research, on the other hand, as described above, has a much longer history and the writer himself has done most of his research before such protected areas were created.

It is not always easy to give an interpretation of the borders that entomologists, especially in the past, have attributed to these areas. Their specimens were often labeled only with generic toponyms such as "Gargano", "Sila", "Aspromonte", etc., and usually the meaning was in a geographical sense, the one marked by natural boundaries. We must nevertheless bear in mind that in some circumstances these natural elements (like woods, lakes, marshes, lagoons, etc.) may have undergone drastic changes, both in extension and in quality, due to the anthropic impact in the last few centuries, a phenomenon much accelerated in the most recent decades. This caused the "contraction" of several natural boundaries compared to how they were in the past.

Another factor to be considered, on the opposite side, is that the newly defined Parks perimeters in some cases excluded shorelines, wet areas, or portions of forests of considerable interest, environments which were often included in the areas of activity of entomological expeditions.

From this it follows that only in specific circumstances the delimitation of the areas under study coincides quite faithfully with the administrative borders of the respective newly established protected areas (such as in Policoro Wood, Mount Vulture-Monticchio Lakes, Pantano Lake of Pignola)

while this does not happen in other areas such as Gargano Promontory, Pollino Massif, Sila Plateau and Aspromonte. For this reason, it is here considered appropriate to briefly explain the boundaries as they were historically meant and which ones are adopted in this work, they are those generally meant in the “entomological” sense.

The study areas located in Apulia, Basilicata and Calabria are respectively indicated in figures 2, 3 and 4.

1. Gargano promontory (Apulia: Foggia province, Fig. 2) is a karst plateau that stretches out towards the Adriatic Sea, almost devoid of a superficial river network. It includes a great variety of peculiar environments ranging from the millenary Foresta Umbra to the Mediterranean scrub, from coastal lagoons to pre-desert hills and plains.

All records to the east of an ideal line linking the mouth of Fortore river with Poggio Imperiale, Apricena, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo and Manfredonia have been included. The Gargano National Park (established by Law No. 394 of 6.12.1991) is part of this territory, but excludes the south-eastern coast between Vieste and Torre del Segnale, wide areas between Lake Varano and Carpino-Vico del Gargano as well as all the territories south of Lesina Lake.

Gargano Promontory was explored, from an entomological point of view, since 1887 but initially just a few finds were disclosed. Almost 20 years

later, in 1906–1907, Holdhaus and his collaborators carried out long and thorough researches and the overall results were announced by Holdhaus himself (1911). In the following years the territory has been the subject of several researches promoted both by individual entomologists and by public institutions and many general works or dedicated to single families have been published.

The writer undertook research in this area in the years 1970–1984 and published the overall results in a general catalogue in 1987; after this date he carried out further significant research aimed mainly at the investigation of the soil fauna.

2. Policoro Wood (Basilicata: Matera province, Fig. 3). The Riserva regionale Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro was established with L.R. n. 28 of 08.09.1999.

On the Ionian coast, historically, there was one of the southern most important floodplain forests, partially marshy, comprising the nuclei of Pantano soprano and Pantano sottano. In the XVIII century the extent of the forest was already much reduced but it was still described by travellers as an enchanted, luxuriant and uncontaminated place devoid even of viable trails. Nowadays only a very small portion of the old and renowned wood remains, with a limited naturalness degree, along the course of the river Sinni downstream of the Metaponto-Sibari railway and to the southeast of the interpoderal road that runs parallel to the railway at about 300 meters. An area of reforestation, mainly of *Pinus halepensis*, *Eucalyptus camaldulensis* and *E. globulus*, has been included in the Reserve, east of the municipal road that leads from Policoro Wood to the dewatering system. The occasional floods of Sinni river pour debris on its outfall that sometimes carry an exceptional quantity of invertebrates (for example, on 17.IX.2000 sifting the beached debris, over 300 Coleoptera species were found).

The first entomological researches carried out on Policoro Wood are quite recent as they date back to 1956–1958 and the results were announced in a series of works that appeared between 1959 and 1979; the site gained notoriety and in the following years was the object of many explorations by entomologists from all over Italy but only a small number of the results was published in an organized manner, while many data were scattered in several papers.




Figure 2. Apulia (Italy): 1. Gargano Promontory.

The writer, together with his friend Fernando Montemurro, has done research here in the years 1976–1984 and published the overall results in a general catalogue in 1986. After this publication he carried out further research whose data are reported with the abbreviation “N” in the respective column of Table 1.

Parks of Lucanian Apennines (sites 3, 4, 5 and 6). The Lucan Apennines is a section of the southern Apennines that stretches as an arc from the Sella di Conza (between Campania and Basilicata) to Passo dello Scalone (in Calabria). It is bordered by the Ofanto river to the north, Sele to the west, Bradano to the east, from the Tyrrhenian to the south-west, from the plain of Sibari and the Gulf of Taranto to the south-east and also includes the mountains of Cilento in Campania and Orsomarso in Calabria.

The author gathered data all across this wide sector of the Apennines. For some areas he got a significant number of records on the coleopterological fauna (over a thousand species) and each of these areas will be separately treated: 3) Parks of Mount Vulture-Monticchio Lakes, 4) Regional Reserve of Pantano Lake of Pignola, 5) the complex Central Lucan Apennines-Sellata-Volturino-Viggiano-The Lagonegrese and Sirino massif, 6) Pollino National Park (partially). Below is a brief description of these sites, whose location is shown in figure 3, and respective National and Regional Parks exact designations based on the establishment acts.

On other areas of the Lucan Apennines, namely Cilento and Orsomarso Mountains, particularly interesting data are known as well as records referred to new species, but unfortunately not numerically significant, which is why it was preferred to omit them in this study.

3. Mount Vulture-Monticchio Lakes (Basilicata: Potenza province, Fig. 3) includes both the Parco Naturale Regionale del Vulture (established with L.R. n. 28 of 20.11.2017) and the Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio (established with D.P.G.R. n. 1183 of 30.08.1984).

The woods of Mount Vulture, an ancient inactive volcano, surround two lakes of volcanic origin and are characterized by the remarkable variety of habitats and by very special microclimatic conditions which allow the presence of a low altitude beech forest (650 m a.s.l.). The site still has a suffi-

cient degree of naturalness despite the massive tourist exploitation.

The first entomological researches on Mount Vulture and its lakes date back to 1880 and were made known two years later in a list including species collected also in other sites. In XX century the place was visited by numerous researchers with data published in several works. The entomological findings deduced from these contributions come from a small area around Mount Vulture: the summit, the territories adjacent the two lakes of Monticchio and the road that links the town of Rionero in Vulture to Mount Vulture.

The writer began occasional explorations in this area in 1970. A particularly intense period of research followed in the years 2000–2003, after which he drafted a report and a detailed list of collected species that he delivered to Basilicata Region.

4. Pantano Lake of Pignola (Basilicata, Potenza province, Fig. 3) was established as Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola with D.P.G.R. n. 795 of 19.06.1984.

The lake, which occupies a piedmont depression at 750 m a.s.l. bounded to the north by Serra Stantiere, to the west by the ridges of Petrucco relief and to the south by the watershed of La Rocca, is managed by WWF and has a fair degree of naturalness, although before being fenced it was subject to considerable upheavals. The reduced slope of the banks allows diversified aquatic vegetation, while the meadows and the sparse arboreal vegetation in contact with this ancient wetland are rich in ecological niches that make it an area of high biodiversity.

The only entomological researches on Pantano Lake of Pignola were conducted by the writer in the years 1991–1994 and were carried out along the entire perimeter of the lake, already fenced at the time. The results were released in a special publication by the WWF in 1996. After this publication further research was undertaken, the data of which are shown with the symbol “B” or “N” in the respective column.

5. Central Lucan Apennines-Central area Province of Potenza (Basilicata: Potenza and Matera provinces, Fig. 3) here refers to the “Sellata-Monte Croccia-Monte Volturino-Viggiano-Lagonegrese-Sirino massif” complex.

It is a complicated mountain system that constitutes the central backbone of Lucan Apennines, which varies in landscape from the harsh and almost dolomitic aspect of the northern peaks to the more gentle mountains of the Maddalena, to return to the grandeur of Mount Sirino massif and Mount Alpi in the southernmost offshoots. The whole territory is rich in woods that in the lower altitudinal zone are constituted by evergreen oaks and thermophilous broad-leaved trees and in the upper zone by *Quercus cerris* and mixed beech-woods, as well as some isolated chestnut groves and the residual forest of Abetina di Laurenzana, which hosts a local variety of *Abies alba*.

The entomological data shown come from places located between the middle and upper course of Basento and Sinni rivers; the north-western border lies between the sources of the Basento river (Fossa Cupa) and the villages of Brienza and Atena Lucana; the south-western boundary runs along the border with Campania region up to Lagonegro and, near Lauria, joins the Sinni river which represents its southern border thus including Mount Sirino and Mount Alpi; the southeast boundary is an ideal line connecting Salandra with Stigliano, Sant'Angelo and Valsinni.

In this area we find the following Reserves and National Parks:

- a. Riserva Nazionale Naturale Antropologica Monte Crocchia (established with D.M.A.F. of 11.09.1971);
- b. Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane (established with L.R. n. 47 of 24.11.1997);
- c. Riserva Regionale Abetina di Laurenzana (established with D.P.G.R. n. 2 of 4.01.1988);
- d. Riserva Regionale Lago Laudemio (established with L.R. n. 42 of 22.05.1980 and D.P.G.R. n. 426 of 19.04.1985);
- e. Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (established with D.P.R. of 8.12.2007);
- f. A small part of Pollino National Park that protrude to the north of Sinni river and which, of significance, includes Mount Alpi.

News of the first research in Central Lucan Apennines dates back only to 1909 and there is no work of synthesis on the Coleoptera fauna; rather, there are many data dispersed in a myriad of works

even with description of new species which refer to the second half of the last century.

The writer has carried out several researches, generally of short duration (1–5 days), between 1980 and 2000, but so far he had communicated only single data in contributions dedicated to specific families despite having found over 1,000 Coleoptera species.

6. Pollino Massif (Basilicata: Potenza and Matera provinces, Calabria: Cosenza province, Fig. 3). Parco Nazionale del Pollino was established with Law n. 67 of 11.03.1988; with subsequent acts and decrees the perimeter has been extended (Law n. 305 of 28.8.1989, D.M. of 31.12.1990, D.P.R. of 15.11.1993 and D.P.R. of 2.12.1997) so that it currently represents the largest national park in Italy. In it we find Riserva Naturale Biogenetica Statale Rubbio and Riserva Naturale Orientata Gole del Raganello in Basilicata, Riserva Naturale Statale Valle del Fiume Lao and Riserva Naturale Orientata Valle del Fiume Argentino in Calabria (Orsomarso mountains).

The Pollino Massif includes all the highest peaks of southern Apennines, whose forms have been shaped by the ancient glaciations and which for part of the year are covered by snowfields. The alternation of karstic phenomena and morainic deposits makes the landscape very evocative. Some



Figure 3. Basilicata (Italy): 2. Policoro Wood; 3. Mount Vulture-Monticchio Lakes; 4. Pantano Lake of Pignola; 5. Central Lucan Apennines; 6. Pollino Massif.

plant associations are unique to this area, where for example at the highest altitudes rare relict populations of *Pinus leucodermis* can be found. Also chestnut groves, oak woods and beech woods show noteworthy characteristics.

Considering the origin of most of the data, here it was intended for “Pollino” the whole area that includes the peaks of Monte Pollino, Serra del Prete, Dolcedorme, Serre di Crispo and Ciavole, Coppola di Paola and the neighboring territories; very different is the current perimeter of Pollino National Park extending from the Tyrrhenian to the Ionian.

Boundaries of Pollino Massif pass therefore to the north along the course of Sinni river from Episcopia (Potenza province) to Valsinni (Matera province), to the east and west follow the border with Calabria region but protrude widely from it at Alesandria del Carretto up to Francavilla Marittima where the southern border follows the course of Raganello stream and from here the localities of Frascineto, Morano Calabro, Campotenese and Mormanno. Pollino Massif shows a barely acceptable state of naturalness, although the anthropic impact is definitely excessive and favored both by the construction of new roads and by poor surveillance.

The first research on Pollino Massif dates back to 1880 and was published in 1882. Later it was the subject of studies whose results were only partially published; starting from the middle of last century wider research campaign were promoted by Naples University and finally the results were published in 17 works dedicated to Coleoptera. Several other researches have been carried out by single entomologist whose data were dispersed in many papers or made known in contributions dedicated to single families.

The writer used to explore Pollino Massif in the years 1969-1985 and he published the overall results in a general catalogue in 1986. Later he further investigated the area until around 2000, collecting nearly 500 further species.

7. Sila Plateau (Calabria: Cosenza, Catanzaro and Crotona provinces, Fig. 4). Parco Nazionale della Sila was established with Law n. 344 of 8.10.1997 and D.P.R. of 14.11.2002. In 2014 the site was included in the UNESCO Man and Biosphere Program.

It is one of the areas that are historically less populated and with the highest percentage of wooded surface of Italy. The plateau is made up of igneous

and metamorphic rocks that clearly differentiate it from the calcareous bulk of the Apennines and that influence the form of the landscape, as well as that of the vegetation. In fact, at high altitudes, *Pinus nigra laricio* dominates and, even higher, *Fagus sylvatica*, frequently interspersed with *Abies alba*.

The data considered in this work and often reported by the authors as “Sila” concern an area that extends far beyond the boundaries of Sila National Park, as it includes wide wooded areas to the north and east of Cecita Lake and both east and west of Ampollino Lake as well as to south of the latter. As far as man’s impact is concerned, the same is true as for what was said about Pollino Massif, though the situation is slightly better.

The first researches in Sila Plateau date back to 1859, but these results were never disclosed. Later it was the subject of further explorations, of which only some were published in their entirety in 1881, 1941 and 1943, while other data were dispersed in a myriad of contributions. In the 1960s the territory was the subject of a research project promoted by Verona Museum and the results relating to some of the families were announced in several papers. Meanwhile and subsequently the Pollino Massif had become the destination of a large number of entomologists whose results were only partially communicated in numerous contributions.

The writer in the years 1969–1988 visited Sila Plateau several times for periods of 7–15 days and therefore disclosed the results of its collections in a general catalogue in 1991.

8. Aspromonte (Calabria: Reggio Calabria province, Fig. 4). Parco Nazionale dell’Aspromonte was established with Law n. 305 of 28.08.1989, D.P.R. of 14.01.1994 and D.P.R. of 19.07.2008).

This is a mountainous massif with a jagged topography occupying the southernmost tip of the Stivale (the Boot: in a figurative sense, par excellence, Italy, so called because of its geographical shape that resembles that of a boot) and whose flora and fauna are extremely heterogeneous due to multiple factors: the low latitude, the elevation height differences, the presence of tectonic terraces as well as the proximity of the sea and the different exposure of mountainsides respect to this. Like Sila Plateau, Aspromonte consists of rocks more similar to Alpine ones than those of the Apennines, and also here in the woods the *Pinus nigra laricio* is predominant above 800 m,

while from the 1,200 m and at higher altitudes the prevailing tree cover is *Fagus sylvatica* and *Abies alba*. A peculiar feature of superficial hydrography is the “fiumara”, a characteristic type of watercourse with a very wide pebbly bed and for most of the year dry, but seasonally subject to flash floods.

In this work, Aspromonte is meant in a geographical sense and therefore is that area located south of Petrace river and of “fiumare” of Platì and Careri; it is thus considered a portion of territory that is more than double in area compared to that of the National Park. This choice was made both to include the many data reported over almost two centuries of entomological investigations and to not exclude the fauna of the coasts, which has particularly interesting but different species to that of the mountainous areas.

It should be noted here that mainly the fauna of south-eastern territories, riparian and not, between Locri and Ionian Saline is particularly interesting also because of the different geology, nature of the soil, and the degree of man’s influence compared to that of the territory located to the west between Rosarno and Reggio Calabria. The general impact of man’s activities is more or less analogous to that of other National Parks of southern Italy, consid-

ring that “Park” in this region often means uncontrolled tourism and illegal building rather than carefully safeguarding the natural environments that remain.

Of the eight sites here treated, Aspromonte, approached by sea from Sicily, is the one that was first investigated with research dating back to 1783, the results being announced three years later. Further studies bear dates of the first half of XIX century demonstrating the attraction that this site had already gained among entomologists two centuries ago. The research continued discontinuously and with data published only partially until the mid-twentieth century, when Aspromonte was the object of accurate research by members of the expeditions promoted by Verona Museum and the results concerning some families were announced in various papers. In the following years further short journeys were made by several entomologists, some of whom did not publish any results and other who did so sporadically in various works.

The writer visited Piani d’Aspromonte for the first time around 1975 and until 2000 undertook many and accurate researches, though the results until now were released only minimally in various publications dedicated to single families.

Samples

In order to integrate and update the previous catalogues, all the publications that could be found were consulted. Every paper bearing data on southern Italy has been carefully examined, and possible synonymies and taxonomic status changes have been checked.

Furthermore, the new records resulting from the research carried out by the author himself after the publication of the aforementioned catalogues are reported.

For field research, a wide range of collecting techniques has been used, mainly on sight, with collecting nets, entomological umbrella, sifting (of leaf litter, rotten wood, hay, mushrooms, dung, soil under stones in meadows or woods, etc.) combined with the use of Winkler/Moczarski extractors, light traps, collecting net for aquatic beetles, aerial and pitfall traps both with and without attractive baits.

All the study material has been identified by specialists but substantial quantities of specimens are still undetermined (17,000 Staphylinidae,




Figure 4. Calabria (Italy): 7. Sila Plateau; 8. Aspromonte.

10,000 Ptiliidae, 7,500 Nitidulidae, 3,700 Scydmaeninae, over 3,000 Mordellidae and Scaptiidae, 2,100 Bruchinae, 1,700 Phalacridae, 1,700 Corylophidae, 1,300 Alexiidae, 600 Clambidae).

Most of the specimens collected by the writer are kept in the author's personal collection, currently deposited at the Museum of Natural History, Section of Zoology, of Florence University.

The results are shown in Table 1, in which the families are listed according to the taxonomic order adopted by Bouchard et al. (2011).

For the nomenclature, the status and the sequence of subfamilies and tribes within of families, reference was made to volumes 1–8 of the “Catalogue of Palaearctic Coleoptera”, with some adjustments according to the works listed below:

Ptiliidae: Sörensson & Delgado, 2019
 Elateroidea: Kundera et al., 2014
 Elateridae: Kundera et al., 2018
 Drilini: Kundera & Bocak, 2011
 Cebrionini: Kundera & Bocak, 2011
 Peltidae: Gimmel et al., 2019
 Lophocateridae: Gimmel et al., 2019
 Trogossitidae: Gimmel et al., 2019
 Thymalidae: Gimmel et al., 2019
 Rhadalidae: Bocakova et al., 2011; Gimmel et al., 2019
 Malachiinae: Gimmel et al., 2019
 Dasytinae: Gimmel et al., 2019
 Cucujoidea - Coccinelloidea: Robertson et al., 2015
 Nitidulidae: Cline et al., 2014
 Cybocephalidae: Cline et al., 2014
 Teredidae: Robertson et al., 2015
 Anamorphidae: Robertson et al., 2015
 Mycetaeidae: Robertson et al., 2015
 Curculionoidea: Alonso-Zarazaga et al., 2017

Also consulted were the works of Żyła & Solodovnikov (2019), Vasilikopoulos et al. (2019) and Zhang et al. (2018) but it was considered more appropriate not to take them into account here.

Names, initials and diacritical marks of the various authors have been verified on Bousquet (2016).

Species, contrariwise, are listed in alphabetical order for the simple fact that names of eventual subgenus have been omitted to make the “Species” column more manageable.

The species lists, subdivided by family, were subjected to a critical examination by the colleagues referred to in the “Acknowledgments” chapter, who

reviewed the taxonomic status and added unpublished data eventually in their possession.

Taxonomic status of species and of superior categories is updated to 31.12.2019.

Symbols used in Table 1:

X: species previously reported in the author's catalogues of Gargano Promontory, Policoro Wood, Pantano Lake of Pignola, Pollino Massif and Sila Plateau;

B: new bibliographic data, relating to the areas already mentioned as well as to Mount Vulture-Monticchio Lakes, Central Lucan Apennines and Aspromonte. In cases where the presence of a species in a given area is documented both in the bibliography and in CKmap, it was preferred to report the record with the symbol “B”;

CK: data resulting from “CKmap” (national database) if not otherwise published;

H: Holdhaus citations (1911) concerning Gargano Promontory and omitted in the author's previous contribution to this promontory (Angelini, 1987);

N: new data from the author, if not already mentioned in other publications and then reported with the symbol “B”;

!: records added by specialists who have reviewed the families of their competence: Paolo Audisio (Hydraenidae and Nitidulidae), Cesare Bellò (Curculionidae), Mauro Daccordi (Chrysomelidae), Jiří Háva (Dermestidae), Francesco Izzillo (Buprestidae and Cerambycidae), Leonardo Latella (Carabidae), Carlo Leonardi (Alticinae), Gianfranco Liberti (Rhadalidae and Melyridae), Andrea Liberto (Oedemeridae), Gianluca Magnani (Buprestidae), Alessandro Mascagni (Elmidae and Dryopidae), Antonio Mazzei (Carabidae), Giuseppe Platia (Elateridae), Roberto Poggi (Pselaphinae), Saverio Rocchi (Helophoridae), Davide Sassi (Chrysomelidae), Pierpaolo Vienna (Histeridae), Adriano Zanetti (Staphylinidae), Iuri Zappi (Cleridae).

[E]: endemic species.

The “IUCN Category” column shows the IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Categories, as adopted in the Italian Red Lists of saproxylic Coleoptera referred to, compiled by Audisio et al. (2014) and Carpaneto et al. (2015), and the same abbreviations are used.

Table 1. THE LIST OF SPECIES found in the eight study sites.

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| COLEOPTERA Linnaeus, 1758 | | | | | | | | | |
| MYXOPHAGA Crowson, 1955 | | | | | | | | | |
| SPHAERIUSOIDEA Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| SPHAERIUSIDAE Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Hájek in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Microsporus acaroides</i> Waltl, 1838 | | N | | | | | | | |
| ADEPHAGA Schellenberg, 1806 | | | | | | | | | |
| GYRINIDAE Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| Gyrininae Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| Gyrinini Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| Hájek & Fery in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Aulonogyrus concinnus</i> (Klug, 1834) | | X | | | | | | | |
| <i>Aulonogyrus striatus</i> (Fabricius, 1792) | | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Gyrinus caspius</i> Ménétré, 1832 | H | X | | N | B | | X | B | |
| <i>Gyrinus dejeani</i> Brullé, 1832 | H | X | | | B | B | | | |
| <i>Gyrinus distinctus</i> Aubé, 1838 | | | B | | | | | | |
| <i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828 | X | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Gyrinus suffriani</i> W. Scriba, 1855 | | X | | | | | | | |
| <i>Gyrinus urinator</i> Illiger, 1807 | X | X | X | N | B | N | X | B | |
| Orectochilini Régimbart, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Orectochilus villosus villosus</i> (O.F. Müller, 1776) | | B | X | | B | | | N | |
| RHYSODIDAE Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Clinidiini R.T. Bell & J.R. Bell, 1978 | | | | | | | | | |
| Huber, Marggi & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Clinidium canaliculatum</i> (O.G. Costa, 1839) | | | | | B | X | X | B | NT |
| Omoglymmiini R.T. Bell & J.R. Bell, 1978 | | | | | | | | | |
| <i>Omoglymmius germari</i> (Ganglbauer, 1891) | X | X | | B | B | B | | N | CR |
| Rhysodini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787) | | B | | B | B | | | | CR |
| CARABIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Nebriinae Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Nebriini Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Huber in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 (Genus <i>Leistus</i> : Farkač) | | | | | | | | | |
| <i>Eurynebria complanata</i> (Linnaeus, 1767) | X | | | | | | | B | |
| <i>Leistus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | B | | | | |
| <i>Leistus fulvibarbis fulvibarbis</i> Dejean, 1826 | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Leistus parvicollis</i> Chaudoir, 1869 | H | | | | | | | | |
| <i>Leistus rufomarginatus</i> (Duftschmid, 1812) | H | | | | N | X | | B | |
| <i>Leistus spinibarbis fiorii</i> Lutshnik, 1913 [E] | B? | | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Nebria andalusia</i> Rambur, 1837 | | | | | | | | B | |
| <i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Nebria krateri krateri</i> Dejean, 1831 [E] | | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Nebria pennisii</i> Magrini, 1987 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Nebria psammodes</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | | B | N | X | X | B | |
| Notiophilini Motschulsky, 1850 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Notiophilus aestuans</i> Dejean, 1826 | | N | | N | | X | X | B | |
| <i>Notiophilus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | | B | |
| <i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779) | X | | | B | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Notiophilus geminatus</i> Dejean, 1831 | X | X | X | B | | X | X | B | |
| <i>Notiophilus germinyi</i> Fauvel, 1863 | | | | | | | | N | |
| <i>Notiophilus palustris</i> (Duftschmid, 1812) | | | | B | B | | | | |
| <i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826 | H | | | | | | B | B | |
| <i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829 | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Notiophilus substriatus</i> G.R. Waterhouse, 1833 | H | X | X | B | | X | X | B | |
| Carabinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Carabini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Calosomatina Lapouge, 1927 | | | | | | | | | |
| Häckel in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Calosoma inquisitor inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | | X | X | | |
| <i>Calosoma maderae maderae</i> (Fabricius, 1775) | X | X | | | | | | B | |
| <i>Calosoma sycophanta sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) | N | X | | N | B | X | B | B | |
| Carabina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Brezina, Huber & Marggi in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Carabus convexus convexus</i> Fabricius, 1775 | H | | | B | CK | X | CK | B | |
| <i>Carabus coriaceus coriaceus</i> Linnaeus, 1758 | H | X | X | N | CK | X | | | |
| <i>Carabus coriaceus brutianus</i> Born, 1906 [E] | | | | | | | B | B | |
| <i>Carabus granulatus aetolicus</i> Schaum, 1857 | | B | | | | | | B | |
| <i>Carabus granulatus calabricus</i> Spettoli & Vigna Taglianti, 2001 [E] | | | | | | N | | | |
| <i>Carabus lefebvrei bayardi</i> Solier, 1835 [E] | H | X | | CK | B | X | X | | |
| <i>Carabus lefebvrei lefebvrei</i> Dejean, 1826 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Carabus morbillosus alternans</i> Palliardi, 1825 [E] | | B | | | | | | B | |
| <i>Carabus preslii neumeyeri</i> Schaum, 1856 | | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Carabus rossii</i> Dejean, 1826 [E] | H | | | B | N | CK | X | B | |
| <i>Carabus violaceus picenus</i> A. Villa & G.B. Villa, 1839 | X | | X | B | CK | X | X | B | |
| Cydrini Perty, 1830 | | | | | | | | | |
| Cydrina Perty, 1830 | | | | | | | | | |
| Häckel in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Cydrus attenuatus latialis</i> Luigioni, 1922 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Cydrus italicus</i> Bonelli, 1810 | | | | N | B | B | X | B | |
| Cicindelinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Cicindelini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Cicindelina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Putehkov & Matalin in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Calomera littoralis nemoralis</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Cassolaia maura cupreothoracica</i> Korell & Cassola, 1987 | | | | | | | | B | |
| <i>Cephalota circumdata circumdata</i> (Dejean, 1822) | | B | | | | | | | |
| <i>Cicindela campestris campestris</i> Linnaeus, 1758 | X | X | X | | B | X | X | B | |
| <i>Cicindela majalis</i> Mandl, 1935 [E] | | X | | | B | | X | N | |
| <i>Cylindera arenaria arenaria</i> Fuessly, 1775 | | X | | | | | | | |
| <i>Cylindera germanica muelleri</i> (Magistretti, 1966) | X | X | | | | | | | |
| <i>Cylindera trisignata trisignata</i> (Dejean, 1822) | X | X | | | | | | | |
| <i>Myriochila melancholica melancholica</i> (Fabricius, 1798) | X | | | | | | | | |
| Loricarinae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Loricerini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Loricera pilicornis pilicornis</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | X | X | | |
| Elaphrinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Elaphrini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Goulet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Elaphrus uliginosus</i> Fabricius, 1792 | | | | | N | N | X | | |
| Omophroninae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Omophronini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Huber, Marggi & Valainis in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Omophron limbatum</i> (Fabricius, 1777) | X | X | | | N | N | B | B | |
| Scaritinae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Clivinini Rafinesque, 1815 | | | | | | | | | |
| Clivinina Rafinesque, 1815 | | | | | | | | | |
| Balkenhol in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Clivina collaris</i> (Herbst, 1784) | | N | | | | N | B | N | |
| <i>Clivina fossor fossor</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | N | X | | B | |
| <i>Clivina laevifrons</i> Chaudoir, 1842 | | N | | | | | | | |
| <i>Reicheia italica</i> Holdhaus, 1924 [E] | | | | N | B | N | N | B | |
| <i>Typhloreicheia usslaubi</i> (Saulcy, 1870) [E] | H | | | | B | | | | |
| Dyschiriini H.J. Kolbe, 1880 | | | | | | | | | |
| <i>Dyschirius apicalis</i> Putzeys, 1846 | X | X | | | | | | | B |
| <i>Dyschirius auriculatus auriculatus</i> Wollaston, 1867 | | | | | | | | | B |
| <i>Dyschirius chalybeus chalybeus</i> Putzeys, 1846 | | X | N | | | | | | N |
| <i>Dyschirius cylindricus hauseri</i> A. Fleischer, 1898 | B | | | | | | | | |
| <i>Dyschirius gracilis gracilis</i> (Heer, 1837) | | N | | | | | X | | |
| <i>Dyschirius importunus importunus</i> Schaum, 1857 | X | X | | | N | | | | B |
| <i>Dyschirius intermedius</i> Putzeys, 1846 | | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius laeviusculus</i> Putzeys, 1846 | | N | | | | | | | |
| <i>Dyschirius laticola laticola</i> Chaudoir, 1850 | X | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius minutus minutus</i> (Dejean, 1825) | | | | | | | | | B |
| <i>Dyschirius nitidus nitidus</i> (Dejean, 1825) | | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius numidicus numidicus</i> Putzeys, 1846 | X | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius parallelus ruficornis</i> Putzeys, 1846 | | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius punctatus</i> (Dejean, 1825) | | X | | | | | | | B |
| <i>Dyschirius salinus salinus</i> Schaum, 1843 | | X | | | | | | | |
| <i>Dyschirius strumosus</i> Erichson, 1837 | | N | | | | | | | |
| <i>Dyschirius substriatus substriatus</i> (Duftschmid, 1812) | | X | | | | | | | |
| Scaritini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Scaritina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Distichus planus</i> (Bonelli, 1813) | X | | | | | | | | B |
| <i>Scarites buparius</i> (Forster, 1771) | X | X | | | | | | | B |
| <i>Scarites laevigatus</i> Fabricius, 1792 | X | X | | | | | | | B |
| <i>Scarites terricola terricola</i> Bonelli, 1813 | X | X | | | | | | | B |
| Apotominae LeConte, 1853 | | | | | | | | | |
| Wrase in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Apotomus rufithorax</i> Pecchioli, 1837 | | N | B | | | | | | |
| <i>Apotomus rufus</i> (P. Rossi, 1790) | | | | | | | | | B |
| Siagoninae Bonelli, 1813 | | | | | | | | | |
| Siagonini Bonelli, 1813 | | | | | | | | | |
| Huber & Marggi in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Siagona europaea europaea</i> Dejean, 1826 | | B | | N | N | X | B | B | |
| Trechinae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Anillini Jeannel, 1937 | | | | | | | | | |
| Zaballos, Pérezgonzáles, Andújar Fernández & Giachino in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Anillus bordonii</i> Magrini & Vanni, 1993 [E] | | | | | B | | | | B |
| <i>Rhegmatoobius fiorii</i> (Ganglbauer, 1900) [E] | | | | | B | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Bembidion scapulare scapulare</i> Dejean, 1831 | | X | | | | N | | B | |
| <i>Bembidion semipunctatum</i> (Donovan, 1806) | | | | | N | | | | |
| <i>Bembidion siculum siculum</i> Dejean, 1831 [E] | | | | | B | | | B | |
| <i>Bembidion steinbuehleri steinbuehleri</i> Ganglbauer, 1891 | B | | | | | | | | |
| <i>Bembidion subfasciatum</i> Chaudoir, 1850 | X | B | | | | | | | |
| <i>Bembidion tenellum tenellum</i> Erichson, 1837 | X | N | X | N | N | N | | B | |
| <i>Bembidion testaceum testaceum</i> (Duftschmid, 1812) | | X | | | | | | | |
| <i>Bembidion tethys</i> Netolitzky, 1926 | X | N | | | B | N | | | |
| <i>Bembidion tetracolum tetracolum</i> Say, 1823 | | N | | | N | N | | N | |
| <i>Bembidion varicolor varicolor</i> (Fabricius, 1803) | | | | | | N | N | B | |
| <i>Bembidion varium</i> (A.G. Olivier, 1795) | | N | X | | N | N | | B | |
| <i>Bembidion vseteckai dissimile</i> G. Müller, 1943 | | | | | | | | B | |
| <i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821) | | X | N | N | B | | B | B | |
| <i>Sinechostictus cribrum stenacrus</i> (De Monte, 1947) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Sinechostictus dahlui</i> (Dejean, 1831) | | X | X | | B | N | X | B | |
| <i>Sinechostictus doderoi</i> (Ganglbauer, 1891) | | | | | B | | | | |
| <i>Sinechostictus elongatus</i> (Dejean, 1831) | | | | | N | | | B | |
| <i>Sinechostictus inustus</i> (Jacquelin du Val, 1857) | | | | | B | | | | |
| <i>Sinechostictus solarii</i> (G. Müller, 1918) [E] | | | | | B | | | | |
| Tachyina Motschulsky, 1862 Kopencký in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Polyderis algiricus</i> (P.H. Lucas, 1846) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Polyderis brevicornis</i> (Chaudoir, 1846) | | N | | | | | | | |
| <i>Porotachys bisulcatus</i> (Nicolai, 1822) | N | X | N | | N | N | X | B | |
| <i>Tachys bistriatus bistriatus</i> (Duftschmid, 1812) | H | X | X | N | N | N | | N | |
| <i>Tachys fulvicollis</i> (Dejean, 1831) | | X | X | B | | | | | |
| <i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828) | X | N | | | | | | B | |
| <i>Tachys scutellaris scutellaris</i> Stephens, 1828 | X | X | | N | N | | | B | |
| <i>Tachyta nana nana</i> (Gyllenhal, 1810) | H | | | | | X | B | | |
| <i>Tachyura diabrachys</i> (Kolenati, 1845) | X | X | X | B | N | N | X | B | |
| <i>Tachyura haemorrhoidalis</i> (Ponza, 1805) | X | X | X | | N | | | B | |
| <i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831) | | N | X | | | | | B | |
| <i>Tachyura sexstriata</i> (Duftschmid, 1812) | | | X | | N | X | X | B | |
| <i>Tachyura thoracica</i> (Kolenati, 1845) | | | | | N | | | N | |
| Pogonini Laporte, 1834 Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Pogonistes gracilis</i> (Dejean, 1828) | | | | | | | | B | |
| <i>Pogonus chalceus chalceus</i> (Marsham, 1802) | | B | | | | | | | |
| <i>Pogonus gilvipes</i> Dejean, 1828 | X | | | | | | | B | |
| <i>Pogonus littoralis</i> (Duftschmid, 1812) | | X | | | | | | | |
| <i>Pogonus riparius</i> Dejean, 1828 | X | X | | | | | | | |
| Trechini Bonelli, 1810 Perileptina Sloane, 1903 Belousov in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Perileptus areolatus areolatus</i> (Creutzer, 1799) | N | X | X | B | N | X | | B | |
| Trechina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Duvalius caoduroi</i> Pace, 1986 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Trechus angelae</i> Magrini, 1984 [E] | | | | | B | X | | | |
| <i>Trechus arthuri</i> P. Moravec & Lompe, 2003 [E] | | | | N | B | X | | | |
| <i>Trechus binotatus</i> Putzeys, 1870 | | | | N | B | X | | | |
| <i>Trechus obtusus obtusus</i> Erichson, 1837 | | | | B | B | X | X | N | |
| <i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781) | H | X | X | B | CK | X | X | B | |
| <i>Trechus subnotatus</i> Dejean, 1831 | | | | | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Trechodina Jeannel, 1926 | | | | | | | | | |
| <i>Thalassophilus longicornis</i> (Sturm, 1825) | | | | | | | | B | |
| Brachininae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Brachinini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Brachinina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Hrdlička in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Brachinus bayardi</i> Dejean, 1831 | | X | | | | | | | |
| <i>Brachinus brevicollis</i> Motschulsky, 1844 | | | | | | | B | | |
| <i>Brachinus crepitans</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | B | B | |
| <i>Brachinus elegans</i> Chaudoir, 1842 | H | | | | | | | | |
| <i>Brachinus exhalans</i> (P. Rossi, 1792) | X | X | | | | | | | |
| <i>Brachinus explodens</i> Duftschmid, 1812 | H | | | | B | X | X | N | |
| <i>Brachinus immaculicornis immaculicornis</i> Dejean, 1826 | | X | | B | | | B | B | |
| <i>Brachinus italicus</i> (Dejean, 1831) [E] | | X | X | N | N | N | X | B | |
| <i>Brachinus nigricornis</i> Gebler, 1830 | N | X | | N | | | | | |
| <i>Brachinus plagiatus</i> Reiche, 1868 | H | X | X | | | | | | |
| <i>Brachinus psophia</i> Audinet-Serville, 1821 | | N | | | | N | B | B | |
| <i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | N | N | X | B | | |
| Harpalinae Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Chlaeniini Brullé, 1834 | | | | | | | | | |
| Callistina Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Kirschenhofer in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Callistus lunatus lunatus</i> (Fabricius, 1775) | | | N | | | B | B | B | |
| Chlaeniina Brullé, 1834 | | | | | | | | | |
| <i>Chlaenius chrysocephalus</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | | N | N | X | B | B | |
| <i>Chlaenius circumscriptus</i> (Duftschmid, 1812) | | N | | | | | | B | |
| <i>Chlaenius decipiens</i> (L. Dufour, 1820) | H | B | | | | | B | B | |
| <i>Chlaenius festivus</i> (Panzer, 1796) | H | X | | N | N | N | | B | |
| <i>Chlaenius nigricornis</i> (Fabricius, 1787) | B | X | | | | | | B | |
| <i>Chlaenius nitidulus</i> (Schränk, 1781) | | N | | N | | | | B | |
| <i>Chlaenius olivieri</i> Crotch, 1871 | H | | | | | | X | B | |
| <i>Chlaenius spoliatus spoliatus</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | | N | N | X | N | B | |
| <i>Chlaenius terminatus</i> Dejean, 1826 | | B | | | | | | | |
| <i>Chlaenius tristis tristis</i> (Schaller, 1783) | B | B | X | | | N | | | |
| <i>Chlaenius velutinus</i> (Duftschmid, 1812) | | | X | | | X | | B | |
| <i>Chlaenius vestitus</i> (Paykull, 1790) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Drypta dentata</i> (P. Rossi, 1790) | N | X | X | N | N | | | N | |
| <i>Drypta distincta</i> (P. Rossi, 1792) | | X | | | | | | B | |
| Harpalini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Amblystomina Fauvel, 1889 | | | | | | | | | |
| Wrase in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Amblystomus metallescens</i> (Dejean, 1829) | X | X | | N | N | X | | B | |
| <i>Amblystomus niger</i> (Heer, 1841) | X | X | X | | | | | | |
| <i>Amblystomus solsky</i> Reiche, 1864 | | X | | | | | | B | |
| Anisodactylina Lacordaire, 1854 | | | | | | | | | |
| Kataev & Wrase in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Anisodactylus intermedius</i> Dejean, 1829 | | X | | | | | | | |
| <i>Anisodactylus poeciloides poeciloides</i> (Stephens, 1828) | X | N | | | | | | | |
| <i>Anisodactylus pueli bucciarellii</i> Sciaky, 1979 [E] | B | | | | B | | | | |
| <i>Anisodactylus virens virens</i> Dejean, 1829 | X | X | | | | | | | |
| <i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | N | B | N | | X | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Gynandromorphus etruscus</i> (Quensel, 1806) | | | X | | | | X | | |
| <i>Scybalicus oblongiusculus</i> (Dejean, 1829) | X | X | X | | B | X | B | | |
| Ditomina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Wrase & Kataev in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Carterus dama</i> (P. Rossi, 1792) | H | | | | | | B | B | |
| <i>Carterus fulvipes</i> (Latreille, 1817) | | | | | N | | | B | |
| <i>Carterus gilvipes</i> (Piochard de la Brulerie, 1873) | | | | | | B | | B | |
| <i>Carterus rotundicollis</i> Rambur, 1837 | N | X | | N | | X | B | B | |
| <i>Ditomis calydonius calydonius</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | | | B | | B | B | |
| <i>Ditomis tricuspis</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | | | X | B | |
| <i>Dixus clypeatus</i> (P. Rossi, 1790) | H | N | | | | X | X | B | |
| <i>Dixus obscurus</i> (Dejean, 1825) | X | N | | | | | | | |
| <i>Graniger femoralis</i> (Coquerel, 1859) | | | | | B | | | | |
| <i>Oedesis caucasicus</i> (Dejean, 1831) | | B | | | | | | | |
| <i>Oedesis villosulus</i> (Reiche, 1860) | | | | | | | | B | |
| <i>Tschitscherinellus cordatus cordatus</i> (Dejean, 1825) | | | | | | | B | | |
| Harpalina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Kataev & Wrase in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Acinopus ammophilus</i> Dejean, 1829 | | X | | | | | B | N | |
| <i>Acinopus baudii baudii</i> A. Fiori, 1913 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Acinopus megacephalus</i> (P. Rossi, 1794) | X | | | N | | X | X | B | |
| <i>Acinopus picipes</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | X | | N | | X | X | | |
| <i>Daptus vittatus</i> Fischer von Waldheim, 1823 | | B | | | | | | | |
| <i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781) | X | N | | B | B | X | X | B | |
| <i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812) | H | | | B | N | | | | |
| <i>Harpalus atratus</i> Latreille, 1804 | X | | | B | B | N | X | B | |
| <i>Harpalus attenuatus</i> Stephens, 1828 | X | X | | N | | X | X | | |
| <i>Harpalus calceatus</i> Duftschmid, 1812 | B | | | | | | | | |
| <i>Harpalus cupreus cupreus</i> Dejean, 1829 | H | | X | N | B | N | B | B | |
| <i>Harpalus decipiens</i> Dejean, 1829 | X | | | B | | X | X | B | |
| <i>Harpalus dimidiatus</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | X | N | B | X | | N | |
| <i>Harpalus distinguendus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812) | H | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Harpalus flavicornis flavicornis</i> Dejean, 1829 | H | | X | B | N | | | N | |
| <i>Harpalus griseus</i> (Panzer, 1796) | X | X | X | | | N | | B | |
| <i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812) | H | | | N | B | X | | N | |
| <i>Harpalus italicus</i> Schaum, 1860 | H | | X | | | | | | |
| <i>Harpalus litigiousus</i> Dejean, 1829 | X | | | | | | | | |
| <i>Harpalus melancholicus reicheianus</i> Kataev, 2012 | X | X | | | | X | | B | |
| <i>Harpalus oblitus oblitus</i> Dejean, 1829 | H | | | N | B | X | X | | |
| <i>Harpalus pumilus</i> Sturm, 1818 | | | | | | | X | B | |
| <i>Harpalus punctatostrigatus</i> Dejean, 1829 | | | | | N | | | | |
| <i>Harpalus pygmaeus</i> Dejean, 1829 | X | | | | | | | | |
| <i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812) | X | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Harpalus rufipalpis rufipalpis</i> Sturm, 1818 | | | | | | | B | | |
| <i>Harpalus rufipes</i> (DeGeer, 1774) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Harpalus serripes serripes</i> (Quensel, 1806) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Harpalus siculus</i> Dejean, 1829 | | | | | | | | B | |
| <i>Harpalus smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812) | | N | | N | N | | | | |
| <i>Harpalus sulphuripes sulphuripes</i> Germar, 1823 | H | N | | B | B | B | X | B | |
| <i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1796) | H | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Harpalus tenebrosus tenebrosus</i> Dejean, 1829 | H | N | X | B | | | | | |
| <i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922) | | N | X | | | | B | | |
| <i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775) | H | | | N | B | X | | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Ophonus cordatus</i> (Duftschmid, 1812) | X | | | | | X | | | |
| <i>Ophonus cribricollis</i> (Dejean, 1829) | X | | | | | | | | |
| <i>Ophonus diffinis</i> (Dejean, 1829) | X | N | | | | | | | |
| <i>Ophonus ferrugatus</i> Reitter, 1902 | | | | | | | | N | |
| <i>Ophonus franzinorum</i> Sciaky, 1987 | | N | | | | | | B | |
| <i>Ophonus incisus</i> (Dejean, 1829) | X | | | | B | | B | B | |
| <i>Ophonus jeanneli</i> Sciaky, 1987 | B | | | | N | | N | | |
| <i>Ophonus melletii melletii</i> (Heer, 1837) | | | N | B | | B | | | |
| <i>Ophonus parallelus</i> (Dejean, 1829) | | | | | | N | | | |
| <i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828 | X | N | N | | N | | X | B | |
| <i>Ophonus puncticollis</i> (Paykull, 1798) | B | | | B | | | | | |
| <i>Ophonus rotundatus</i> (Dejean, 1829) | | X | X | | N | | | B | |
| <i>Ophonus rufibarbis</i> (Fabricius, 1792) | B | | X | B | B | | B | N | |
| <i>Ophonus rupicola</i> (Sturm, 1818) | X | N | X | | B | X | B | | |
| <i>Ophonus sabulicola</i> (Panzer, 1796) | H | | X | N | | X | B | B | |
| <i>Ophonus schaubergerianus</i> (Puel, 1937) | H | | | B | | | | B | |
| <i>Ophonus similis</i> (Dejean, 1829) | B | X | | | | | | B | |
| <i>Ophonus subquadratus</i> (Dejean, 1829) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Parophonus hespericus</i> Jeanne, 1985 | N | | | N | | | | N | |
| <i>Parophonus hispanus</i> (Rambur, 1838) | | X | N | N | | | B | B | |
| <i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812) | H | N | | B | | X | B | B | |
| <i>Parophonus mendax</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | X | | | | B | | |
| <i>Parophonus planicollis</i> (Dejean, 1829) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Trichotichmus nitens</i> (Heer, 1837) | | X | N | B | B | X | X | B | |
| Stenolophina Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Jäger & Kataev in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825) | | N | | | | | | B | |
| <i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888 | | | X | | | | | N | |
| <i>Acupalpus elegans</i> (Dejean, 1829) | H | X | | | N | N | | N | |
| <i>Acupalpus exiguus</i> Dejean, 1829 | X | | X | N | N | N | | N | |
| <i>Acupalpus interstitialis</i> Reitter, 1884 | | | | | | | | N | |
| <i>Acupalpus luteatus</i> (Duftschmid, 1812) | X | N | X | | | | | | |
| <i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum, 1860) | X | X | X | B | N | N | X | N | |
| <i>Acupalpus mediterraneus</i> Csiki, 1932 | | | | | B | | | | |
| <i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1760) | H | X | X | | B | N | X | B | |
| <i>Acupalpus notatus</i> Mulsant & Rey, 1861 | X | X | | | N | N | X | B | |
| <i>Acupalpus parvulus</i> (Sturm, 1825) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Acupalpus puncticollis</i> (Coquerel, 1859) | X | | | | N | | | | |
| <i>Anthracus consputus</i> (Duftschmid, 1812) | | | | | | B | | B | |
| <i>Anthracus quarnerensis</i> (Reitter, 1884) | H | X | | | | | | | |
| <i>Anthracus transversalis</i> (Schaum, 1862) | | | | | | | | B | |
| <i>Bradycellus caucasicus</i> (Chaudoir, 1846) | | | | | | | X | B | |
| <i>Bradycellus lusitanicus</i> (Dejean, 1829) | | | N | | | | | B | |
| <i>Bradycellus verbasci</i> (Duftschmid, 1812) | X | B | X | | B | N | | B | |
| <i>Dicheirotichus chloroticus</i> (Dejean, 1829) | | | | | | | B | B | |
| <i>Stenolophus abdominalis persicus</i> Mannerheim, 1844 | | N | X | | N | X | | B | |
| <i>Stenolophus discophorus</i> (Fischer von Waldheim, 1823) | | X | X | | N | | | | |
| <i>Stenolophus marginatus</i> Dejean, 1829 | | X | | | N | X | | B | |
| <i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784) | H | N | X | B | N | N | | N | |
| <i>Stenolophus proximus</i> Dejean, 1829 | X | X | X | | | | | | |
| <i>Stenolophus skrimshiranus</i> Stephens, 1828 | X | X | X | | | | | N | |
| <i>Stenolophus teutonius</i> (Schränk, 1781) | H | X | | B | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Lebiini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Apenina G.E. Ball, 1983 | | | | | | | | | |
| Kabak in Cat. Pal. Col., vol. I, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Platytarus faminii faminii</i> (Dejean, 1826) | | X | | | | | | | |
| Cymindidina Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| <i>Cymindis axillaris axillaris</i> (Fabricius, 1794) | H | | | | B | X | X | B | |
| <i>Cymindis etrusca etrusca</i> Bassi, 1834 | | | | N | | X | X | N | |
| <i>Cymindis humeralis</i> (Geoffroy, 1785) | | | | B | N | | | | |
| <i>Cymindis miliaris</i> (Fabricius, 1801) | H | | | B | | B | X | B | |
| <i>Pseudomasoreus canigoulensis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854) | H | N | | | | | B | B | |
| Demetriadina Bates, 1886 | | | | | | | | | |
| <i>Demetrias atricapillus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Demetrias imperialis</i> (Germar, 1823) | | X | | | | | | | |
| Dromiusina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Apristus europaeus</i> Mateu, 1980 | | | | | N | | | N | |
| <i>Apristus reticulatus</i> Schaum, 1857 | | X | | | | | | | |
| <i>Apristus subaeneus</i> Chaudoir, 1846 | | | | | | | | B | |
| <i>Calodromius spilotus</i> (Illiger, 1798) | | N | | | N | | X | | |
| <i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787) | | | | N | N | X | X | | |
| <i>Dromius fenestratus</i> (Fabricius, 1794) | | | | | N | N | | | |
| <i>Dromius meridionalis</i> Dejean, 1825 | | X | | | | | | | |
| <i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | X | | N | X | X | N | |
| <i>Lionychus maritimus</i> Fairmaire, 1862 | | | | | | | | N | |
| <i>Lionychus quadrillum</i> (Duftschmid, 1812) | | | | B | N | X | X | B | |
| <i>Metadromius nanus</i> (A. Fiori, 1914) [E] | | N | X | | | | B | | |
| <i>Microlestes abeillei abeillei</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1885) | H | | | | | | | | |
| <i>Microlestes corticalis</i> (L. Dufour, 1820) | | N | X | | | | | N | |
| <i>Microlestes fissuralis</i> (Reitter, 1901) | H | N | X | N | N | N | B | B | |
| <i>Microlestes fulvibasis</i> (Reitter, 1901) | H | X | X | N | N | | | B | |
| <i>Microlestes levipennis levipennis</i> P.H. Lucas, 1846 | | | | N | | | X | B | |
| <i>Microlestes luctuosus luctuosus</i> Holdhaus, 1904 | H | X | X | N | B | N | X | B | |
| <i>Microlestes mauritanicus</i> (P.H. Lucas, 1846) | | | X | | | | | | |
| <i>Microlestes maurus maurus</i> (Sturm, 1827) | X | X | | N | B | X | X | N | |
| <i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777) | | N | X | B | | | | | |
| <i>Microlestes negrita negrita</i> (Wollaston, 1854) | H | X | | N | | | | N | |
| <i>Microlestes plagiatus</i> (Duftschmid, 1812) | | X | | N | | | | N | |
| <i>Paradromius linearis</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Paradromius longiceps</i> (Dejean, 1826) | N | B | | | | | | | |
| <i>Philorhizus crucifer confusus</i> Sciaky, 1991 | B | | X | B | B | | | | |
| <i>Philorhizus crucifer crucifer</i> (P.H. Lucas, 1846) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Philorhizus quadrisignatus</i> (Dejean, 1825) | | B | | | | X | | B | |
| <i>Syntomus foveatus</i> (Geoffroy, 1785) | | | | | B | | | | |
| <i>Syntomus impressus impressus</i> (Dejean, 1825) | X | N | | | | | B | B | |
| <i>Syntomus obscuroguttatus</i> (Duftschmid, 1812) | X | X | X | N | N | N | B | B | |
| <i>Syntomus silensis</i> (A. Fiori, 1899) [E] | | | | | | | X | B | |
| <i>Syntomus truncatellus</i> (Linnaeus, 1760) | | | | | B | | | | |
| Lebiina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Lebia cruxminor cruxminor</i> (Linnaeus, 1758) | H | | X | | B | X | X | B | |
| <i>Lebia cyanocephala cyanocephala</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Lebia fulvicollis thoracica</i> Hoppe & Hornschuh, 1825 | | X | | | | | B | B | |
| <i>Lebia humeralis</i> Dejean, 1825 | H | X | | N | N | X | X | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Lebia lepida</i> Brullé, 1834 | | X | | | | | | | |
| <i>Lebia marginata</i> (Geoffroy, 1785) | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Lebia scapularis scapularis</i> (Geoffroy, 1785) | X | X | | | B | X | X | B | |
| <i>Lebia trimaculata</i> (Villers, 1789) | H | | | | | X | X | | |
| Licinini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Licinina Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Huber & Marggi in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798) | | | | | | N | B | | |
| <i>Badister collaris</i> Motschulsky, 1844 | | | | N | | | | | |
| <i>Badister meridionalis</i> Puel, 1925 | B | | X | | | B | | | |
| <i>Licinus cassideus cassideus</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | | X | | | |
| <i>Licinus italicus</i> Puel, 1925 [E] | | | | | B | X | | | |
| <i>Licinus punctatulus granulatus</i> Dejean, 1826 | | | | | | | | B | |
| <i>Licinus silphoides</i> (P. Rossi, 1790) | B | X | | B | N | X | B | B | |
| Masoreini Chaudoir, 1871 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Masoreus wetterhallii wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813) | X | | | | | | B | B | |
| Odacanthini Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1766) | | X | | | | | | | |
| Oodini LaFerté-Sénéctère, 1851 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Oodes gracilis</i> A. Villa & G. B. Villa, 1833 | X | X | | | | | | | |
| <i>Oodes helopioides helopioides</i> (Fabricius, 1792) | | N | | | | | | | |
| Panagaecini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Häckel & Kirschenhofer in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Panagaeus bipustulatus</i> (Fabricius, 1775) | H | | | | | X | | B | |
| <i>Panagaeus cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758) | | X | X | | | | | | |
| Platynini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Schmidt in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Agonum duftschmidti</i> J. Schmidt, 1994 | | X | X | B | N | | X | | |
| <i>Agonum emarginatum</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | N | N | | | | |
| <i>Agonum longicorne</i> Chaudoir, 1846 | X | | | N | | | | | |
| <i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812) | | N | X | | | N | X | | |
| <i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | | X | X | N | |
| <i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784) | | | | B | N | X | X | | |
| <i>Agonum nigrum</i> Dejean, 1828 | X | X | X | | | | X | B | |
| <i>Agonum numidicum</i> (P.H. Lucas, 1846) | X | X | | | | | | N | |
| <i>Agonum permoestum</i> Puel, 1938 | | N | | N | N | N | B | | |
| <i>Agonum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| <i>Agonum sordidum</i> Dejean, 1828 | H | B | | | N | | | B | |
| <i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828 | | X | | | N | | | N | |
| <i>Agonum tulliae</i> Mazzei & Brandmayr, 2017 | | | | | | | B | | |
| <i>Agonum versutum</i> Sturm, 1824 | | | | N | N | B | | | |
| <i>Agonum viridicupreum viridicupreum</i> (Goeze, 1777) | X | | | B | B | X | X | | |
| <i>Anchomenus dorsalis dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763) | H | | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Atranus ruficollis</i> (Gautier des Cottés, 1858) | | X | | | | | | | |
| <i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790) | | | | | | | X | | |
| <i>Olisthopus fuscatus</i> Dejean, 1828 | H | X | | N | N | | | B | |
| <i>Olisthopus glabricollis</i> (Germar, 1817) | H | | | | | X | | | |
| <i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784) | | | X | | | | | | |
| <i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796) | X | X | N | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Pterostichini Bonelli, 1810 | | | | | | | | | |
| Bousquet in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Abax parallelepipedus curtulus</i> (Fairmaire, 1856) [E] | X | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Pedius inquinatus</i> (Sturm, 1824) | | X | | | | | | | |
| <i>Percus bilineatus</i> (Dejean, 1828) [E] | H | X | | CK | B | X | X | N | |
| <i>Poecilus cupreus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | B | B | N | X | X | B | |
| <i>Poecilus cursorius cursorius</i> (Dejean, 1828) | H | X | | | | | | | |
| <i>Poecilus gisellae gisellae</i> (Csiki, 1930) | | | | | | | | B | |
| <i>Poecilus koyi viaticus</i> (Dejean, 1828) | | | | | | CK | | | |
| <i>Poecilus nitidus</i> (Dejean, 1828) | H | B | | | | | | | |
| <i>Poecilus pantanellii</i> (A. Fiori, 1903) [E] | | B | | B | | | B | B | |
| <i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824) | | | N | N | | | | | |
| <i>Pterostichus anthracinus biimpresus</i> (Küster, 1853) | | X | | | | N | | | |
| <i>Pterostichus apenninus</i> (Dejean, 1831) | X | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Pterostichus cursor</i> (Dejean, 1828) | H | X | X | B | N | N | | | |
| <i>Pterostichus dubius amarei</i> Ganglbauer, 1907 [E] | | | | N | N | X | X | | |
| <i>Pterostichus elongatus</i> (Duftschmid, 1812) | H | N | | | | | | | |
| <i>Pterostichus focarilei</i> Casale & Giachino, 1985 [E] | | | | | B | X | | | |
| <i>Pterostichus gracilis giordanii</i> Bucciarelli & Sopracordevole, 1958 | H | X | X | | | | | | |
| <i>Pterostichus impressicollis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854) | | | | | B | | X | | |
| <i>Pterostichus macer macer</i> (Marsham, 1802) | | | | B | | | | | |
| <i>Pterostichus melas italicus</i> (Dejean, 1828) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Pterostichus micans</i> Heer, 1838 | | | | B | B | X | | | |
| <i>Pterostichus niger niger</i> (Schaller, 1783) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Pterostichus nigrita nigrita</i> (Paykull, 1790) | X | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Pterostichus ovoideus mainardii</i> Straneo, 1934 [E] | | | | | | B | | | |
| <i>Pterostichus quadrifoveolatus</i> Letzner, 1852 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Pterostichus ruffoi</i> Sciaky, 1984 [E] | | | | | | | X | B | |
| <i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797) | | | | N | N | X | X | | |
| <i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796) | | N | X | | N | | CK | N | |
| <i>Stomis pumicatus pumicatus</i> (Panzer, 1796) | H | | X | | B | X | | B | |
| Sphodrini Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Atranopsina Baehr, 1982 | | | | | | | | | |
| Hovorka in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Platyderus neapolitanus</i> (Reiche, 1855) [E] | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Platyderus paganettii</i> Guéorguiev, 2009 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Platyderus vignai</i> Guéorguiev, 2009 [E] | B | | | | | | | N | |
| Calathina Laporte, 1834 | | | | | | | | | |
| Hovorka in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Calathus ambiguus ambiguus</i> (Paykull, 1790) | | N | | | | | | | |
| <i>Calathus cinctus</i> Motschulsky, 1850 | B | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Calathus circumseptus</i> Germar, 1823 | H | X | | | | | | | |
| <i>Calathus erratus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827) | | | | | N | | | | |
| <i>Calathus focarilei</i> Schatzmayr, 1947 [E] | | | | | N | | | | |
| <i>Calathus fracassii fracassii</i> Heyden, 1908 [E] | | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Calathus fuscipes punctipennis</i> Germar, 1823 | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Calathus melanocephalus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | N | B | X | X | N | |
| <i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812) | | | | B | | | B | B | |
| <i>Calathus montivagus</i> Dejean, 1831 [E] | H | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Calathus pirazzolii</i> Putzeys, 1873 [E] | | | | | | N | | | |
| <i>Calathus rotundicollis</i> Dejean, 1828 | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Calathus sirenensis</i> D'Amore Fracassi, 1908 [E] | | | | | B | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Sphodrina Laporte, 1834 Casale in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Laemostenus acutangulus</i> (L.W. Schaufuss, 1862) [E] | | | | | | B | B | | |
| <i>Laemostenus algerinus algerinus</i> (Gory, 1833) | | | | | | | | B | |
| <i>Laemostenus barbarus</i> (P.H. Lucas, 1846) | | | | | | | | B | |
| <i>Laemostenus cimmerius cimmerius</i> (Fischer von Waldheim, 1823) | H | B | | B | N | N | B | | |
| <i>Laemostenus complanatus</i> (Dejean, 1828) | | | | | | | | B | |
| <i>Laemostenus venustus</i> (Dejean, 1828) | B | X | | | | X | X | | |
| <i>Sphodrus leucophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | | | | | B | |
| Synuchina Lindroth, 1956 Hovorka in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Synuchus vivalis vivalis</i> (Illiger, 1798) | X | | | | | X | X | ! | |
| Zabrini Bonelli, 1810 Amarina C. Zimmermann, 1832 Hieke in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Amara aenea</i> (DeGeer, 1774) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Amara anthobia</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833 | H | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790) | H | N | X | B | N | X | B | B | |
| <i>Amara aulica</i> (Panzer, 1796) | | | | | | B | X | B | |
| <i>Amara concinna</i> C. Zimmermann, 1832 | | | | | B | | | | |
| <i>Amara consularis</i> (Duftschmid, 1812) | H | | | | | | | | |
| <i>Amara cursitans</i> C. Zimmermann, 1832 | | N | | | | | | | |
| <i>Amara curta</i> Dejean, 1828 | | | | | B | | | B | |
| <i>Amara eurynota</i> (Panzer, 1796) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Amara famelica</i> C. Zimmermann, 1832 | | | | | B | | | B | |
| <i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812) | X | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Amara fulvipes</i> (Audinet-Serville, 1821) | | | | | | | X | | |
| <i>Amara kulti</i> Fassati, 1947 | | | | | | | | B | |
| <i>Amara lucida</i> (Duftschmid, 1812) | H | | | B | | X | | | |
| <i>Amara lunicollis</i> Schiödte, 1837 | | | | | | | X | | |
| <i>Amara montana</i> Dejean, 1828 | | X | | | N | | | B | |
| <i>Amara nitida</i> Sturm, 1825 | | | | | N | | X | | |
| <i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | B | B | X | | B | |
| <i>Amara praetermissa</i> (C.R. Sahlberg, 1827) | | | | | | X | | | |
| <i>Amara rufipes</i> Dejean, 1828 | B | | | | | | X | | |
| <i>Amara sicula</i> Dejean, 1831 [E] | X | | | | B | X | X | B | |
| <i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810) | X | X | | | | | X | N | |
| Zabrina Bonelli, 1810 Serrano & Andújar in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Zabrus costae</i> Heyden, 1891 [E] | | | | N | B | X | | | |
| <i>Zabrus ignavus ignavus</i> Csiki, 1907 | | | | B | | | | | |
| <i>Zabrus orsinii</i> Dejean, 1831 [E] | | | | N | | X | | | |
| <i>Zabrus tenebrioides tenebrioides</i> (Goeze, 1777) | X | X | | | | X | | | |
| Zuphiini Bonelli, 1810 Zuphiina Bonelli, 1810 Huber & Marggi in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Parazuphium chevrolatii chevrolatii</i> (Laporte, 1833) | | B | | | | | | B | |
| <i>Polisticus connexus</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | | | | | | | |
| <i>Zuphium olens</i> (P. Rossi, 1790) | X | N | | | | | | B | |
| HALIPLIDAE Aubé, 1836 van Vondel in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Haliplus flavicollis</i> Sturm, 1834 | | X | | | | | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Haliphus guttatus</i> Aubé, 1836 | X | X | | | B | | X | N | |
| <i>Haliphus lineatocollis</i> (Marsham, 1802) | H | X | X | B | B | N | X | B | |
| <i>Haliphus mucronatus</i> Stephens, 1828 | H | X | | | B | B | | N | |
| <i>Haliphus obliquus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | N | B | X | X | | |
| <i>Haliphus ruficollis</i> (DeGeer, 1774) | H | X | X | N | B | X | X | | |
| <i>Haliphus variegatus</i> Sturm, 1834 | X | X | | | | | | N | |
| <i>Pelodytes caesus</i> (Duftschmid, 1805) | B | X | | N | | | | N | |
| <i>Pelodytes rotundatus</i> (Aubé, 1836) | X | X | X | | B | N | | | |
| NOTERIDAE C.G. Thomson, 1860 | | | | | | | | | |
| Noterinae C.G. Thomson, 1860 | | | | | | | | | |
| Noterini C.G. Thomson, 1860 | | | | | | | | | |
| Hájek in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Noterus clavicornis</i> (DeGeer, 1774) | H | X | X | N | B | X | X | N | |
| <i>Noterus crassicornis</i> (O.F. Müller, 1776) | | X | | | | | X | | |
| HYGROBIIDAE Régimbart, 1879 | | | | | | | | | |
| Hájek in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius, 1775) | X | B | | | B | X | | | |
| DYTISCIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Agabinae J. Thomson, 1867 | | | | | | | | | |
| Agabini J. Thomson, 1867 | | | | | | | | | |
| Hájek in Cat. Pal. Col., vol. 1, 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Agabus biguttatus</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | X | | | B | X | X | B | |
| <i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Agabus brunneus</i> (Fabricius, 1798) | H | X | | B | B | | X | | |
| <i>Agabus congener</i> (Thunberg, 1794) | | | | | | | X | | |
| <i>Agabus conspersus</i> (Marsham, 1802) | H | X | | | B | | X | N | |
| <i>Agabus didymus</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Agabus dilatatus</i> (Brullé, 1832) | | | | | B | | | B | |
| <i>Agabus guttatus guttatus</i> (Paykull, 1798) | | | | | B | X | X | B | |
| <i>Agabus nebulosus</i> (Forster, 1771) | X | X | X | N | B | X | X | N | |
| <i>Agabus paludosus</i> (Fabricius, 1801) | X | | | N | B | X | X | | |
| <i>Ilybius ater</i> (DeGeer, 1774) | X | | | | | X | X | | |
| <i>Ilybius chalconatus</i> (Panzer, 1796) | B | | X | | B | X | X | B | |
| <i>Ilybius fuliginosus fuliginosus</i> (Fabricius, 1792) | | X | X | N | B | X | X | | |
| <i>Ilybius lagabrunensis</i> Schizzerotto & Fery, 1990 [E] | | | | | B | B | | | |
| <i>Ilybius pederzani</i> Fery & Nilsson, 1993 [E] | | B | N | | B | | | B | |
| <i>Ilybius pseudoneglectus</i> Franciscolo, 1972 | B | B | | | | | | | |
| <i>Ilybius quadriguttatus</i> Lacordaire, 1835 | | X | | | | | | | |
| Colymbetinae Erichson, 1837 | | | | | | | | | |
| Colymbetini Erichson, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | B | X | X | N | |
| <i>Meladema coriacea</i> Laporte, 1835 | N | | | | B | | X | B | |
| <i>Melanodytes pustulatus</i> (P. Rossi, 1792) | | X | | | | | | N | |
| <i>Rhantus suturalis</i> (W.S. Macleay, 1825) | X | X | X | B | B | | X | B | |
| Copelatinae Branden, 1885 | | | | | | | | | |
| Copelatini Branden, 1885 | | | | | | | | | |
| <i>Liopterus haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787) | | X | X | | | | | B | |
| Cybistrinae Sharp, 1880 | | | | | | | | | |
| Cybistrini Sharp, 1880 | | | | | | | | | |
| <i>Cybister lateralimarginalis lateralimarginalis</i> (DeGeer, 1774) | H | X | X | | | N | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cybister tripunctatus africanus</i> Laporte, 1834 | | X | | | | B | | B | |
| Dytiscinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Acilini J. Thomson, 1867 | | | | | | | | | |
| <i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | N | B | X | | B | |
| <i>Graphoderus cinereus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | B | | | | |
| Dytiscini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Dytiscus circumflexus</i> Fabricius, 1801 | X | X | | | B | | X | B | |
| <i>Dytiscus marginalis marginalis</i> Linnaeus, 1758 | | | X | B | B | X | X | N | |
| <i>Dytiscus mutinensis</i> Branden, 1885 | | X | | | | | | | |
| Eretini Crotch, 1873 | | | | | | | | | |
| <i>Eretes griseus</i> (Fabricius, 1781) | | | | | | | | B | |
| Hydaticini Sharp, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Hydaticus leander</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | | | | | N | |
| <i>Hydaticus seminiger</i> (DeGeer, 1774) | | X | | | | | | | |
| Hydroporinae Aubé, 1836 | | | | | | | | | |
| Bidessini Sharp, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Bidessus calabricus</i> Guignot, 1957 | X | X | | | B | X | | B | |
| <i>Bidessus delicatulus</i> (Schaum, 1844) | | | X | | B | N | | B | |
| <i>Bidessus goudotii</i> (Laporte, 1835) | | | | | | | | B | |
| <i>Bidessus muelleri</i> Zimmermann, 1927 | | X | | | | | | | |
| <i>Bidessus pumilus</i> (Aubé, 1838) | | X | | | | | | | |
| <i>Bidessus unistriatus</i> (Goeze, 1777) | | | | | | N | | | |
| <i>Hydroglyphus geminus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Hydroglyphus signatellus</i> (Klug, 1834) | H | | | | | | | B | |
| <i>Yola bicarinata bicarinata</i> (Latreille, 1804) | X | X | | | B | | | N | |
| Hydroporini Aubé, 1836 | | | | | | | | | |
| Deronectina Galewski, 1994 | | | | | | | | | |
| <i>Boreonectes griseostriatus griseostriatus</i> (DeGeer, 1774) | | | | | B | X | X | | |
| <i>Deronectes angelinii</i> Fery & Brancucci, 1997 [E] | | | | | | | B | | |
| <i>Deronectes aubei aubei</i> (Mulsant, 1843) | | | | | | | | B | |
| <i>Deronectes moestus inconspicuum</i> (Leprieur, 1876) | B | | | | B | X | X | B | |
| <i>Deronectes semirufus</i> (Germar, 1844) | | | | | B | B | B | B | |
| <i>Nebrioporus canaliculatus</i> (Lacordaire, 1835) | | X | | | B | B | B | | |
| <i>Nebrioporus ceresyi</i> (Aubé, 1838) | B | X | | | | | | N | |
| <i>Nebrioporus fenestratus</i> (Germar, 1838) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Nebrioporus luctuosus</i> (Aubé, 1838) | | X | | | B | B | X | | |
| <i>Nebrioporus sansii</i> (Aubé, 1838) | | X | | | B | X | | B | |
| <i>Nectoporus sanmarkii sanmarkii</i> (C.R. Sahlberg, 1826) | | | | | | | X | | |
| <i>Oreodytes meridionalis</i> Binaghi & Sanfilippo, 1971 [E] | | | | | | | X | | |
| <i>Scarodytes halensis</i> (Fabricius, 1787) | X | B | X | | B | X | B | B | |
| <i>Scarodytes pederzani</i> Angelini, 1973 | | | | | | B | X | | |
| <i>Scarodytes ruffoi</i> Franciscolo, 1961 [E] | | | | | B | X | | | |
| <i>Stictotarsus procerus</i> (Aubé, 1838) | | | | | B | | | | |
| Hydroporina Aubé, 1836 | | | | | | | | | |
| <i>Graptodytes bilineatus</i> (Sturm, 1835) | | X | | | | | | | |
| <i>Graptodytes flavipes</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | | | | N | X | X | | |
| <i>Graptodytes fractus</i> (Sharp, 1882) | | | | | B | B | | | |
| <i>Graptodytes ignotus</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | | | | | | | B | |
| <i>Graptodytes varius</i> (Aubé, 1838) | | X | | | B | X | B | B | |
| <i>Graptodytes veterator veterator</i> (Zimmermann, 1918) | | X | X | | | | | B | |
| <i>Hydroporus analis</i> Aubé, 1838 | | | | | B | X | X | | |
| <i>Hydroporus apenninus</i> Pederzani & Rocchi, 2005 [E] | | | | | | B | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Hydroporus discretus discretus</i> Fairmaire & C.N.F. Brisout, 1859 | | | | | B | X | X | B | |
| <i>Hydroporus jonicus jonicus</i> L. Miller, 1862 | H | X | | | | | | | |
| <i>Hydroporus limbatus</i> Aubé, 1838 | X | | | | | | | B | |
| <i>Hydroporus marginatus</i> (Duftschmid, 1805) | | | | | B | | | B | |
| <i>Hydroporus memnonius</i> Nicolai, 1822 | H | X | X | | B | X | X | N | |
| <i>Hydroporus nigrita</i> (Fabricius, 1792) | | | | | B | X | X | | |
| <i>Hydroporus obsoletus</i> Aubé, 1838 | | | | | B | X | X | B | |
| <i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1760) | | | X | | B | X | X | | |
| <i>Hydroporus planus</i> (Fabricius, 1782) | X | X | | | B | X | | B | |
| <i>Hydroporus pubescens</i> (Gyllenhal, 1808) | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Hydroporus tessellatus</i> (Drapiez, 1819) | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Porhydrus lineatus</i> (Fabricius, 1775) | | X | | | | X | | B | |
| <i>Porhydrus obliquesignatus</i> (Bielz, 1852) | B | | | | B | | X | | |
| <i>Stictonectes optatus</i> (Seidlitz, 1887) | | | | | B | | | B | |
| Hydrovatini Sharp, 1880 | | | | | | | | | |
| <i>Hydrovatus cuspidatus</i> (Kunze, 1818) | H | X | | | | | | B | |
| Hygrotini Portevin, 1929 | | | | | | | | | |
| <i>Hygrotus confluens</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | B | | | N | |
| <i>Hygrotus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783) | | N | | | | | | | |
| <i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777) | B | X | X | N | B | X | X | N | |
| <i>Hygrotus parallellogrammus</i> (Ahrens, 1812) | B | X | | | | | | | |
| Hyhydrini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Hyhydrus anatolicus</i> Guignot, 1957 | | X | | | | | | | |
| <i>Hyhydrus aubei</i> Ganglbauer, 1891 | B | X | X | | B | | X | N | |
| Laccophilinae Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Laccophilini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Laccophilus hyalinus</i> (DeGeer, 1774) | X | X | N | | B | | B | B | |
| <i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | B | | X | X | N | |
| <i>Laccophilus poecilus</i> Klug, 1834 | H | X | | B | | N | N | N | |
| POLYPHAGA Emery, 1886 | | | | | | | | | |
| STAPHYLINIFORMIA Lameere, 1900 | | | | | | | | | |
| HYDROPHILOIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| HYDROPHILIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Hydrophilinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Berosini Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| Prokin, Przewoźny & Ryndevich in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835 | H | X | X | N | CK | N | | B | |
| <i>Berosus hispanicus</i> Küster, 1847 | X | X | | | | | | B | |
| <i>Berosus jaechi</i> Schödl, 1991 | B | X | | | | | | | |
| <i>Berosus luridus</i> (Linnaeus, 1760) | | X | | | | N | | | |
| <i>Berosus signaticollis</i> (Charpentier, 1825) | X | X | | | | X | X | | |
| Laccobiini Houlbert, 1922 | | | | | | | | | |
| <i>Laccobius albescens</i> Rottenberg, 1874 | | B | | B | | N | X | B | |
| <i>Laccobius alternus</i> Motschulsky, 1855 | | X | | | CK | | X | B | |
| <i>Laccobius bipunctatus</i> (Fabricius, 1775) | H | | | | | | X | | |
| <i>Laccobius gracilis gracilis</i> Motschulsky, 1855 | | X | | | | CK | X | B | |
| <i>Laccobius minutus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | B | | | X | | |
| <i>Laccobius neapolitanus</i> Rottenberg, 1874 | | X | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Laccobius obscuratus</i> Rottenberg, 1874 | X | | | | B | X | X | B | |
| <i>Laccobius revelierei</i> Perris, 1864 | | N | | | | | X | | |
| <i>Laccobius simulatrix</i> d'Orchymont, 1932 | | X | | | CK | | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Laccobius sinuatus sinuatus</i> Motschulsky, 1849 | | | X | | | | | | |
| <i>Paracymus aeneus</i> (Germar, 1824) | H | X | | | | | | CK | |
| <i>Paracymus scutellaris</i> (Rosenhauer, 1856) | | X | | | | | | | |
| Hydrobiusini Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| <i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758) | | X | X | | | X | X | | |
| <i>Limnoxenus niger</i> (Gmelin, 1790) | | X | X | N | | N | | | |
| Hydrophilini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Hydrochara caraboides</i> (Linnaeus, 1758) | N | X | X | | CK | N | | | |
| <i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | | | | | N | |
| Chaetarhriinae Bedel, 1881 | | | | | | | | | |
| Anacaenini M. Hansen, 1991 | | | | | | | | | |
| <i>Anacaena bipustulata</i> (Marsham, 1802) | | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Anacaena globulus</i> (Paykull, 1798) | | | | N | | X | X | N | |
| <i>Anacaena limbata</i> (Fabricius, 1792) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Chaetarhria seminulum</i> (Herbst, 1797) | | | | | | | | N | |
| Enochrinae Short & Fikáček, 2013 | | | | | | | | | |
| <i>Cymbiodyta marginella</i> (Fabricius, 1792) | | X | | | | | | | |
| <i>Enochrus affinis</i> (Thunberg, 1794) | | | | N | | | | | |
| <i>Enochrus ater</i> (Kuwert, 1888) | | | | | | | | B | |
| <i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | | | | | CK | |
| <i>Enochrus calabricus</i> Ferro, 1986 [E] | | | | | | | X | | |
| <i>Enochrus fuscipennis</i> (C.G. Thomson, 1884) | | | | | | | X | | |
| <i>Enochrus halophilus</i> (Bedel, 1879) | H | B | | | | | | | |
| <i>Enochrus melanocephalus</i> (A.G. Olivier, 1793) | | X | | | | | | | |
| <i>Enochrus ochropterus</i> (Marsham, 1802) | | | | | | B | | | |
| <i>Enochrus politus</i> (Küster, 1849) | | X | | | | | | B | |
| <i>Enochrus quadripunctatus</i> (Herbst, 1797) | | X | X | | N | X | X | | |
| <i>Enochrus testaceus</i> (Fabricius, 1801) | H | | X | | | | | | |
| Acidocerinae Zaitzev, 1908 | | | | | | | | | |
| <i>Chasmogenus livornicus</i> (Kuwert, 1890) | | X | | | | | | | |
| <i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771) | X | X | X | B | N | X | X | CK | |
| <i>Helochares obscurus</i> (O.F. Müller, 1776) | | | X | | CK | | | | |
| Sphaeridiinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Coelostomatini L. Heyden, 1891 | | | | | | | | | |
| <i>Coelostoma hispanicum</i> (Küster, 1848) | N | X | N | | N | | | CK | |
| <i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775) | | X | X | N | | X | X | N | |
| <i>Dactylosternum abdominale</i> (Fabricius, 1792) | | | | | | N | | N | |
| Megasternini Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| <i>Cercyon granarius</i> Erichson, 1837 | | | | | | | | N | |
| <i>Cercyon haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775) | H | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Cercyon impressus</i> (Sturm, 1807) | | | X | | | | | | |
| <i>Cercyon laminatus</i> Sharp, 1873 | | | X | | | | | | |
| <i>Cercyon marinus</i> C.G. Thomson, 1853 | | | | | | | | CK | |
| <i>Cercyon nigriceps</i> (Marsham, 1802) | | | | | | N | X | N | |
| <i>Cercyon obsoletus</i> (Gyllenhal, 1808) | H | X | | | | | X | | |
| <i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger, 1801) | | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Cercyon quisquilius</i> (Linnaeus, 1760) | | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Cercyon subsulcatus</i> Rey, 1885 | | | | | | | | CK | |
| <i>Cercyon terminatus</i> (Marsham, 1802) | | X | | | | | | | |
| <i>Cercyon tristis</i> (Illiger, 1801) | H | | | N | | | X | N | |
| <i>Cercyon unipunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | | | |
| <i>Cercyon ustulatus</i> (Preysslner, 1790) | | | | | | B | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cryptopleurum crenatum</i> (Kugelann, 1794) | | | X | | | | | | |
| <i>Cryptopleurum minutum</i> (Fabricius, 1775) | X | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp, 1884 | | | CK | | | | | | |
| <i>Megasternum concinnum</i> (Marsham, 1802) | H | B | X | N | CK | X | X | CK | |
| Sphaeridiini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781 | H | X | X | | N | X | X | CK | |
| <i>Sphaeridium lunatum</i> Fabricius, 1792 | X | N | | | | CK | CK | CK | |
| <i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Sphaeridium substriatum</i> Faldermann, 1838 | B | X | X | N | N | X | X | | |
| HELOPHORIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Fikáček, Angus, Gentili, Jia & Minoshima in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Helophorus aequalis</i> J. Thomson, 1868 | | | | | | | B | | |
| <i>Helophorus alternans</i> Gené, 1836 | H | CK | | N | N | | | CK | |
| <i>Helophorus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | N | N | B | X | X | N | |
| <i>Helophorus asperatus</i> Rey, 1885 | | | | | | X | | | |
| <i>Helophorus brevipalpis brevipalpis</i> Bedel, 1881 | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Helophorus discrepans</i> Rey, 1885 | | | | | | X | B | | |
| <i>Helophorus dorsalis</i> (Marsham, 1802) | H | X | X | | | N | | | |
| <i>Helophorus flavipes</i> Fabricius, 1792 | CK | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Helophorus fulgidicollis</i> Motschulsky, 1860 | B | | | | | | | | |
| <i>Helophorus glacialis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833 | | | | | | X | | | |
| <i>Helophorus granularis</i> (Linnaeus, 1760) | X | CK | | | | X | X | | |
| <i>Helophorus griseus</i> Herbst, 1793 | CK | | | | | X | | | |
| <i>Helophorus illustris</i> Sharp, 1916 | CK | X | | | | | | | |
| <i>Helophorus longitarsis</i> Wollaston, 1864 | X | B | | | | X | X | | |
| <i>Helophorus milleri</i> Kuwert, 1886 | CK | X | X | N | | X | X | CK | |
| <i>Helophorus minutus</i> Fabricius, 1775 | | CK | | N | | X | X | | |
| <i>Helophorus porculus</i> Bedel, 1881 | | N | X | | | | | ! | |
| <i>Helophorus rufipes</i> (Bosc, 1791) | H | CK | | N | | X | | | |
| HYDROCHIDAE C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Fikáček, Angus, Gentili, Jia & Minoshima in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Hydrochus angustatus</i> Germar, 1824 | | X | | | | X | | | |
| <i>Hydrochus flavipennis</i> Küster, 1852 | CK | B | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Hydrochus grandicollis</i> Kiesenwetter, 1870 | | | | | | X | X | | |
| GEORISSIDAE Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Fikáček & Przewoźny in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Georissus costatus</i> Laporte, 1840 | | | | | | B | | CK | |
| <i>Georissus crenulatus</i> (P. Rossi, 1794) | | X | | | CK | | | CK | |
| <i>Georissus laesicollis</i> Germar, 1832 | | CK | | | | B | | CK | |
| HISTERIDAE Gyllenhal, 1808 | | | | | | | | | |
| Abraeinae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Abraeini W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Lackner, Mazur & Newton in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Abraeus granulum</i> Erichson, 1839 | CK | | | | CK | X | | CK | LC |
| <i>Abraeus perpusillus</i> (Marsham, 1802) | B | X | | N | CK | X | | CK | LC |
| <i>Chaetabraeus globulus</i> (Creutzer, 1799) | H | X | | | N | | | | |
| <i>Chaetabraeus lucidus</i> (Peyerimhoff, 1917) | | | | | | N | | B | |
| Acritini Wenzel, 1944 | | | | | | | | | |
| <i>Acritus homoeopathicus</i> Wollaston, 1857 | H | | | | | | | CK | NT |
| <i>Acritus italicus</i> Reitter, 1904 | H | CK | X | CK | CK | CK | X | B | |
| <i>Acritus minutus</i> (Herbst, 1791) | H | CK | | | CK | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Acritus nigricornis</i> (Hoffmann, 1803) | X | CK | | N | | CK | X | CK | |
| <i>Aeletes atomarius</i> (Aubé, 1842) | | X | | CK | | CK | | CK | LC |
| <i>Halacritus punctum</i> (Aubé, 1842) | CK | | | CK | | | | | LC |
| Plegaderini Portevin, 1929 | | | | | | | | | |
| <i>Eubrachiium hispidulum</i> (Bremer-Wolf, 1855) | B | | | | | CK | | | |
| <i>Plegaderus dissectus</i> Erichson, 1839 | X | X | | | | CK | X | CK | LC |
| <i>Plegaderus otti</i> Marseul, 1856 | X | X | | | N | | X | | VU |
| <i>Plegaderus sanatus gobanzi</i> G. Müller, 1903 | | | | | | | CK | | CR |
| <i>Plegaderus saucius</i> Erichson, 1834 | | | | | | | X | CK | VU |
| Dendrophilinae Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| Anapleini Olexa, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Bacanimus consobrinus</i> (Aubé, 1850) | | | | | | CK | | | CR |
| Dendrophilini Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Dendrophilus punctatus punctatus</i> (Herbst, 1791) | | CK | | | | | | B | LC |
| <i>Kissister minimus</i> (Laporte, 1840) | H | X | X | N | CK | X | X | CK | |
| Paromalini Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Carcinops pumilio</i> (Erichson, 1834) | X | X | | | N | X | X | | |
| <i>Paromalus filum</i> Reitter, 1884 | CK | CK | | | CK | CK | | | VU |
| <i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1791) | H | X | X | N | CK | X | X | B | LC |
| <i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1791) | CK | CK | | N | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Platylomalus complanatus</i> (Panzer, 1797) | CK | X | | | B | X | X | B | LC |
| Haeteriinae Marseul, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Haetaerius ferrugineus</i> (A.G. Olivier, 1789) | H | | | CK | CK | X | X | | |
| Histerinae Gyllenhal, 1808 | | | | | | | | | |
| Histerini Gyllenhal, 1808 | | | | | | | | | |
| <i>Atholus bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | CK | | CK | CK | |
| <i>Atholus corvinus</i> (Germar, 1817) | X | | | | | | X | | |
| <i>Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus</i> (Schrank, 1781) | H | X | X | N | CK | X | X | B | |
| <i>Atholus scutellaris</i> (Erichson, 1834) | B | | | | | | | | |
| <i>Atholus siculus</i> (Tournier, 1869) | CK | | | | | | | | |
| <i>Hister bissexstriatus</i> Fabricius, 1801 | | | | | B | | | CK | |
| <i>Hister capsirensis</i> Auzat, 1922 | | | | | CK | | X | CK | |
| <i>Hister funestes</i> Erichson, 1834 | CK | | | | | | CK | | |
| <i>Hister helluo</i> Truqui, 1852 | | X | | | | CK | | B | |
| <i>Hister illigeri illigeri</i> Duftschmid, 1805 | H | X | X | N | CK | X | X | B | |
| <i>Hister lugubris</i> Truqui, 1852 | | | CK | | | | | | |
| <i>Hister mediterraneus</i> Lundgren, 1991 | N | | | | | | | | |
| <i>Hister moerens</i> Erichson, 1834 | B | | | | CK | CK | | CK | |
| <i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758 | H | X | X | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Hister quadrinotatus quadrinotatus</i> L.G. Scriba, 1790 | H | | | | | | | | |
| <i>Hister teter</i> Truqui, 1852 | X | CK | | CK | CK | X | X | | |
| <i>Hister unicolor unicolor</i> Linnaeus, 1758 | X | X | | | CK | CK | X | CK | |
| <i>Margarinotus brunneus</i> (Fabricius, 1775) | X | X | X | | CK | | CK | CK | |
| <i>Margarinotus carbonarius carbonarius</i> (Hoffmann, 1803) | X | | | | | X | | B | |
| <i>Margarinotus ignobilis</i> (Marseul, 1854) | X | B | | | N | X | | | |
| <i>Margarinotus merdarius</i> (Hoffmann, 1803) | | | | | | CK | | | LC |
| <i>Margarinotus neglectus</i> (Germar, 1813) | X | | | | CK | X | X | CK | |
| <i>Margarinotus obscurus</i> (Kugelann, 1792) | H | | | B | CK | | X | CK | |
| <i>Margarinotus punctiventer</i> (Marseul, 1854) | X | | | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Margarinotus purpurascens</i> (Herbst, 1791) | H | X | | CK | CK | X | | | |
| <i>Margarinotus striola succicola</i> (C.G. Thomson, 1862) | | | | | CK | X | X | B | NT |
| <i>Margarinotus ventralis</i> (Marseul, 1854) | B | | | N | CK | X | X | CK | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Merohister ariasi</i> (Marseul, 1864) | CK | | | | CK | | | | EN |
| <i>Pachylister inaequalis</i> (A.G. Olivier, 1789) | X | CK | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Pactolinus major</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | | | | | | B | |
| Platysomatini Bickhardt, 1914 | | | | | | | | | |
| <i>Eurosomides minor</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | | | CK | X | X | | |
| <i>Platysoma angustatum</i> (Hoffmann, 1803) | | | | | | | CK | | VU |
| <i>Platysoma compressum</i> (Herbst, 1783) | H | | | | CK | X | CK | B | LC |
| <i>Platysoma elongatum elongatum</i> (Thunberg, 1787) | B | X | | N | | X | X | B | LC |
| <i>Platysoma filiforme</i> Erichson, 1834 | X | | | | | | X | | NT |
| <i>Platysoma lineare</i> Erichson, 1834 | CK | | | | | | X | CK | VU |
| Onthophilinae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| <i>Onthophilus affinis</i> L. Redtenbacher, 1847 | X | | | | | | | | |
| <i>Onthophilus punctatus cicatricosus</i> Reitter, 1884 | | CK | | | | | | | |
| <i>Onthophilus punctatus punctatus</i> (O.F. Müller, 1776) | H | X | | | CK | N | X | CK | |
| <i>Onthophilus striatus striatus</i> (Forster, 1771) | H | X | X | CK | CK | X | B | B | |
| Saprininae C.É. Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Chalcionellus aemulus</i> (Illiger, 1807) | CK | X | | | CK | | | CK | |
| <i>Chalcionellus decemstriatus decemstriatus</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | X | | CK | CK | CK | B | |
| <i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917 | | | | | CK | | | ! | |
| <i>Gnathoncus communis</i> (Marseul, 1862) | | CK | | | B | CK | | | |
| <i>Gnathoncus namnetensis</i> (Marseul, 1862) | | | | | CK | CK | | B | |
| <i>Gnathoncus rotundatus</i> (Kugelann, 1792) | | CK | | | | | | | LC |
| <i>Hypocacculus metallescens</i> (Erichson, 1834) | X | | | | | | | CK | |
| <i>Hypocacculus spretulus</i> (Erichson, 1834) | | | | | | | | B | |
| <i>Hypocaccus brasiliensis</i> (Paykull, 1811) | X | X | | | | | X | CK | |
| <i>Hypocaccus dimidiatus dimidiatus</i> (Illiger, 1807) | X | X | | | CK | | | CK | |
| <i>Hypocaccus rubripes</i> (Erichson, 1834) | X | X | | | | | | | |
| <i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798) | CK | X | | | CK | CK | X | CK | |
| <i>Pholioxenus schatzmayri</i> (G. Müller, 1910) | H | | | | | | | | |
| <i>Saprinus acuminatus acuminatus</i> (Fabricius, 1798) | H | X | | | CK | CK | X | CK | |
| <i>Saprinus aegialius</i> Reitter, 1884 | X | X | | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Saprinus aeneus</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | | CK | | |
| <i>Saprinus caeruleus caeruleus</i> (Hoffmann, 1803) | X | X | | | CK | | | | |
| <i>Saprinus calatravensis</i> Fuente, 1899 | CK | CK | | | CK | X | CK | | |
| <i>Saprinus chalcites</i> (Illiger, 1807) | H | X | | | CK | | | | |
| <i>Saprinus deterius</i> (Illiger, 1807) | CK | X | | N | CK | X | X | | |
| <i>Saprinus furvus</i> Erichson, 1834 | CK | X | | N | CK | X | | | |
| <i>Saprinus georgicus</i> Marseul, 1862 | X | X | | | | | | CK | |
| <i>Saprinus godet</i> (Brullé, 1832) | CK | | | | CK | | | | |
| <i>Saprinus immundus</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | CK | | X? | | | |
| <i>Saprinus lautus lautus</i> Erichson, 1839 | | | | | N | B | | | |
| <i>Saprinus maculatus</i> (P. Rossi, 1792) | B | | | | CK | | | | |
| <i>Saprinus planiusculus</i> Motschulsky, 1849 | | | | | CK | N | CK | | |
| <i>Saprinus politus politus</i> (Brahm, 1790) | H | X | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Saprinus semistriatus</i> (L.G. Scriba, 1790) | H | | | | CK | X | X | | |
| <i>Saprinus subnitescens</i> Bickhardt, 1909 | X | | X | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Saprinus tenuistrius sparsutus</i> Solsky, 1876 | | | | | CK | X | B | | |
| Tribalinae Bickhardt, 1914 | | | | | | | | | |
| <i>Epierus comptus</i> Erichson, 1834 | H | X | | N | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Pseudepierus italicus</i> (Paykull, 1811) | X | X | | N | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Tribalus scaphidiformis</i> (Illiger, 1807) | | | | | | CK | | CK | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| STAPHYLINOIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| Hydraeninae Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| Hydraenini Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| Jäch & Skale in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Hydraena alia</i> d'Orchymont, 1934 [E] | | | | | | CK | | X | |
| <i>Hydraena angulosa</i> Mulsant, 1844 | | | | | | B | | | |
| <i>Hydraena assimilis</i> Rey, 1885 | | | | | | | X | X | CK |
| <i>Hydraena devillei</i> Ganglbauer, 1901 | | | | | | N | X | X | B |
| <i>Hydraena heterogyna</i> Bedel, 1898 | | | | B | | B | | | |
| <i>Hydraena imperatrix</i> Kniz, 1919 [E] | | | | | | CK | X | X | B |
| <i>Hydraena minutissima</i> Stephens, 1829 | | | | | | | CK | CK | CK |
| <i>Hydraena pygmaea pygmaea</i> G.R. Waterhouse, 1833 | | | | | | | | X | CK |
| <i>Hydraena sicula</i> Kiesenwetter, 1849 [E] | | | | | | | | | B |
| <i>Hydraena similis</i> d'Orchymont, 1930 [E] | | | X | | | CK | CK | X | B |
| <i>Hydraena solaris</i> Pretner, 1930 [E] | | | | | | B | | | |
| <i>Hydraena</i> sp.cfr. <i>sanfilippo</i> i Audisio & De Biase, 1995 [E] | | | | | | | | ! | |
| <i>Hydraena spinipes</i> Baudi di Selve, 1882 [E] | | | | | CK | CK | CK | X | N |
| <i>Hydraena subimpressa</i> Rey, 1885 | | | X | | | CK | CK | X | B |
| <i>Hydraena subirregularis</i> Pic, 1918 [E] | | | | | | | | X | B |
| <i>Hydraena truncata</i> Rey, 1885 | | | X | | | B | X | X | B |
| Limnebiini Mulsant, 1844 | | | | | | | | | |
| <i>Limnebius calabricus</i> Jäch, 1993 [E] | X | | | | | | CK | X | CK |
| <i>Limnebius furcatus</i> Baudi di Selve, 1872 | X | X | N | | | | X | X | |
| <i>Limnebius nitiduloides</i> Baudi di Selve, 1872 | | | | | | CK | X | X | |
| <i>Limnebius nitidus</i> (Marsham, 1802) | | | | | | | X | | |
| <i>Limnebius oblongus</i> Rey, 1883 | | | | | | N | | | |
| <i>Limnebius papposus</i> Mulsant, 1844 | | | | | | | X | X | |
| <i>Limnebius perparvulus</i> Rey, 1884 | | | | | | | | | B |
| Ochthebiinae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Aulacochthebius exaratus</i> Mulsant, 1844 | | N | X | | | | | | |
| <i>Ochthebius adriaticus adriaticus</i> Reitter, 1886 | B | | | | | | B | | B |
| <i>Ochthebius basilicatus</i> A. Fiori, 1915 [E] | | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius brevicollis</i> Baudi di Selve, 1864 | B | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius coreyraeus</i> Jäch, 1990 | B | CK | | CK | B | | | | |
| <i>Ochthebius crenulatus</i> Mulsant & Rey, 1850 | | | | N | B | CK | | | B |
| <i>Ochthebius dentifer</i> Rey, 1885 | | | | | | | | | B |
| <i>Ochthebius difficilis</i> Mulsant, 1844 | | CK | | N | CK | X | X | | N |
| <i>Ochthebius dilatatus</i> Stephens, 1829 | H | X | X | | N | CK | | | B |
| <i>Ochthebius gagliardii</i> d'Orchymont, 1940 [E] | | X | | | | | | | |
| <i>Ochthebius impressipennis</i> Rey, 1886 | B | | | | | N | | | |
| <i>Ochthebius lanuginosus</i> Reiche & Saulcy, 1856 | B | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius latinorum</i> (Ieniștea, 1988) [E] | | | | | | | | | B |
| <i>Ochthebius mediterraneus</i> (Ieniștea, 1988) | | N | | | B | | | | B |
| <i>Ochthebius minimus</i> (Fabricius, 1792) | | X | X | | | | | | |
| <i>Ochthebius nobilis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1835 | CK | | | | | | CK | | B |
| <i>Ochthebius opacus</i> Baudi di Selve, 1882 | | | | | B | N | | | B |
| <i>Ochthebius pilosus</i> Waltl, 1835 | | | | N | | | | | |
| <i>Ochthebius punctatus</i> Stephens, 1829 | H | X | | | | | | | |
| <i>Ochthebius quadricollis</i> Mulsant, 1844 | | | | | | | | | B |
| <i>Ochthebius quadrifossulatus</i> Waltl, 1835 | | | | | B | | | | B |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Ochthebius ragusae</i> Kuwert, 1887 | | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Ochthebius siculus</i> Kuwert, 1887 | | | | | | | | CK | |
| <i>Ochthebius subinteger</i> Mulsant & Rey, 1861 | CK | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius subpictus subpictus</i> Wollaston, 1857 | CK | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius tacapasensis tacapasensis</i> Ferro, 1983 | | | | | | | | B | |
| <i>Ochthebius urbanelliae</i> Audisio, Trizzino & De Biase, 2010 | B | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius virgula</i> Ferro, 1986 [E] | B | | | | | CK | | | |
| <i>Ochthebius viridescens</i> Ienișteea, 1988 | CK | | | | | | | | |
| <i>Ochthebius viridis viridis</i> Peyron, 1858 | | X | X | | | | | | |
| PTILIIDAE Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Nossidiinae Sörensson & Delgado, 2019 | | | | | | | | | |
| Sörensson in Cat. Pal. Col. Vol. 2, 2015; Sörensson & Delgado, 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Nossidium flachi</i> Ganglbauer, 1898 | B | | | | B | | | | DD |
| <i>Nossidium pilosellum</i> (Marsham, 1802) | B | X | | N | B | B | N | B | DD |
| Ptiliinae Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Actidiini Portevin, 1929 | | | | | | | | | |
| <i>Actidium coarctatum</i> (Haliday, 1855) | | N | | | | | | | DD |
| Ptiliini Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Millidium minutissimum</i> (Weber & Mohr, 1804) | | X | | | | | | | |
| <i>Ptiliola kunzei</i> (Heer, 1841) | X | X | | | | | | N | DD |
| <i>Ptiliolium africanum</i> Peyerimhoff, 1917 | | | | B | B | | | B | |
| <i>Ptiliolium caledonicum</i> (Sharp, 1871) | H | | | | | | | | DD |
| <i>Ptiliolium fuscum</i> (Erichson, 1845) | | X | | | | | | N | DD |
| <i>Ptiliolium hopffgarteni</i> (Flach, 1888) | | | | N | B | | | B | DD |
| <i>Ptiliolium marginatum</i> (Aubé, 1850) | X | | X | | B | X | | N | DD |
| <i>Ptiliolium oedipus</i> (Flach, 1886) | | | | | B | | | B | DD |
| <i>Ptiliolium schwarzi</i> (Flach, 1887) | | | | B | B | B | | B | DD |
| <i>Ptiliolium spencei</i> (Allibert, 1844) | | | | N | B | | | | DD |
| <i>Ptilium caesum</i> Erichson, 1845 | H | | | | | | | | DD |
| <i>Ptilium exaratum</i> (Allibert, 1844) | X | | | | | | | | DD |
| <i>Ptilium tenue</i> Kraatz, 1858 | X | | B | | | | | | DD |
| Ptenidiini Flach, 1889 | | | | | | | | | |
| <i>Ptenidium brenskei</i> Flach, 1887 | | | | | | | | B | DD |
| <i>Ptenidium fuscicorne</i> Erichson, 1845 | | B | | | | | | B | DD |
| <i>Ptenidium intermedium</i> Wankowicz, 1869 | | | B | | | | | B | DD |
| <i>Ptenidium laevigatum</i> Erichson, 1845 | H | X | | | N | X | X | N | DD |
| <i>Ptenidium longicorne</i> Fuss, 1868 | | | | | | | | B | DD |
| <i>Ptenidium nitidum</i> (Heer, 1841) | | X | | | | | | B | DD |
| <i>Ptenidium pusillum</i> (Gyllenhal, 1808) | H | X | B | N | | N | N | B | DD |
| <i>Ptenidium turgidum</i> C.G. Thomson, 1855 | X | X | | | | X | | N | DD |
| Ptinellini Reitter, 1906 | | | | | | | | | |
| <i>Microptilium pulchellum</i> (Allibert, 1844) | | | B | | | | | | |
| <i>Pteryx ganglbaueri</i> Erichson, 1909 [E] | | | | | | | | B | NT |
| <i>Pteryx suturalis</i> (Heer, 1841) | X | | | N | B | X | X | B | DD |
| <i>Ptinella aptera</i> (Guérin-Méneville, 1839) | | X | | | | | | | DD |
| <i>Ptinella denticollis</i> (Fairmaire, 1858) | | | | | B | | | | DD |
| <i>Ptinella limbata</i> (Heer, 1841) | | | | | | | X | | DD |
| <i>Ptinella mekura</i> Kubota, 1943 | | | | | B | | | | DD |
| Acrotrichini Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| Nephanina Portevin, 1929 | | | | | | | | | |
| <i>Nephanes titan</i> (Newman, 1834) | X | X | | | | N | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Acrotrichina Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Acrotrichis arnoldi</i> Rosskothén, 1935 | | | | | | | | | B |
| <i>Acrotrichis atomaria</i> (DeGeer, 1774) | H | B | B | N | B | B | N | B | |
| <i>Acrotrichis danica</i> Sundt, 1958 | | | | | | | | | B |
| <i>Acrotrichis dispar</i> (A. Matthews, 1865) | | | | | | B | | | |
| <i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793) | B | | X | B | B | B | N | B | |
| <i>Acrotrichis grandicollis</i> (Mannerheim, 1844) | B | X | X | B | B | B | | N | |
| <i>Acrotrichis intermedia</i> (Gillmeister, 1845) | H | B | X | B | B | B | B | B | |
| <i>Acrotrichis montandonii</i> (Allibert, 1844) | X | | | | B | X | X | B | |
| <i>Acrotrichis pumila</i> (Erichson, 1845) | | N | | | | | | | |
| <i>Acrotrichis rosskotheni</i> Sundt, 1971 | B | B | | B | B | B | B | B | |
| <i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841) | | | X | | B | N | N | N | |
| <i>Acrotrichis sitkaensis</i> (Motschulsky, 1845) | | | | | N | X | | | |
| <i>Acrotrichis thoracica</i> (Waltl, 1838) | | B | X | | | | | | |
| AGYRTIDAE C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Agyrtinae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Růžička in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Agyrtes bicolor</i> Laporte, 1840 | | | | | | N | | N | |
| LEIODIDAE Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Cholevinae Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Anemadini Hatch, 1928 | | | | | | | | | |
| Anemadina Hatch, 1928 | | | | | | | | | |
| Perreau in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Anemadus acicularis</i> (Kraatz, 1852) | H | X | CK | B | B | CK | | | |
| <i>Anemadus italicus</i> (Zoiá, 1990) [E] | | | CK | X | B | B | B | B | |
| <i>Anemadus strigosus strigosus</i> (Kraatz, 1852) | | | X | | CK | B | X | X | CK |
| <i>Speonemadus orchesioides</i> (Fairmaire, 1879) | | | CK | | | | | B | |
| Cholevini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Catopina Chaudoir, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Catops coracinus</i> Kellner, 1846 | X | CK | | | CK | | | | |
| <i>Catops fuliginosus</i> Erichson, 1837 | CK | | | CK | CK | X | X | N | |
| <i>Catops fuscus fuscoides</i> Reitter, 1909 | X | X | | | CK | | | | |
| <i>Catops grandicollis</i> Erichson, 1837 | | | CK | N | B | N | | | |
| <i>Catops kirbyi kirbyi</i> (Spence, 1815) | | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Catops nigricans</i> (Spence, 1813) | H | | CK | N | CK | X | X | B | |
| <i>Catops nigriclavus</i> Gerhardt, 1900 | | N | | | B | | | | |
| <i>Catops nitidicollis</i> Kraatz, 1856 | X | | | | | | | | |
| <i>Catops picipes</i> (Fabricius, 1787) | | | | CK | | N | | | |
| <i>Catops subfuscus subfuscus</i> Kellner, 1846 | | | X | B | B | N | | CK | |
| <i>Catops tristis tristis</i> (Panzer, 1794) | | | X | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Catops ventricosus rotundatus</i> Szymczakowski, 1963 | | | | | CK | | | CK | |
| <i>Dreposcia umbrina</i> (Erichson, 1837) | | | | | CK | CK | | | |
| <i>Sciodrepoides watsoni watsoni</i> (Spence, 1815) | X | X | | B | B | X | X | B | |
| Cholevina Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Catopsimorphus orientalis orientalis</i> Aubé, 1850 | H | X | | CK | | | | N | |
| <i>Choleva cisteloides cisteloides</i> (Frölich, 1799) | H | | | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Choleva garganona</i> Reitter, 1913 [E] | X | | | CK | CK | CK | | CK | |
| <i>Choleva oblonga menozzii</i> Jeannel, 1923 [E] | H | | | | | CK | | | |
| <i>Choleva reitteri</i> Petri, 1915 | | | | CK | CK | | | B | |
| <i>Choleva sturmi</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | H | | X | CK | CK | N | | CK | |
| <i>Nargus badius badius</i> (Sturm, 1839) | H | X | X | CK | CK | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Nargus brunneus</i> (Sturm, 1839) | | | | | CK | | | CK | |
| <i>Nargus velox velox</i> (Spence, 1813) | X | X | X | | CK | X | X | CK | |
| <i>Nargus wilkini</i> (Spence, 1813) | | | CK | CK | CK | X | CK | B | |
| Leptodirini Lacordaire, 1854 | | | | | | | | | |
| Bathysciina Horn, 1880 | | | | | | | | | |
| <i>Phaneropella lesinae</i> (Reitter, 1881) | B | | | | | | | | |
| Pholeuina Reitter, 1886 | | | | | | | | | |
| <i>Bathysciola ruffoi</i> Tamanini, 1955 [E] | | B | CK | | N | X | | | |
| Ptomaphagini Jeannel, 1911 | | | | | | | | | |
| Ptomaphagina Jeannel, 1911 | | | | | | | | | |
| <i>Ptomophagus divaricatus</i> Jeannel, 1934 | | | | B | | | | B | |
| <i>Ptomophagus pius pius</i> (Scidlitz, 1887) [E] | | | | CK | CK | CK | | | |
| Coloninae Horn, 1880 | | | | | | | | | |
| <i>Colon affine</i> Sturm, 1839 | H | | | | | | | | |
| <i>Colon bidentatum</i> (C.R. Sahlberg, 1822) | | | | | | N | | | |
| <i>Colon fuscicornis</i> Kraatz, 1852 | H | | | | | | | | |
| <i>Colon griseum</i> Czwalina, 1881 | | | | | N | X | | N | |
| Leiodinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Agathidiini Westwood, 1838 | | | | | | | | | |
| <i>Agathidium badium</i> Erichson, 1845 | H | X | X | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium brisouti</i> Reitter, 1884 | X | N | | N | | N | X | B | DD |
| <i>Agathidium dentatum dentatum</i> Mulsant & Rey, 1861 | | N | | | N | N | | B | LC |
| <i>Agathidium laevigatum</i> Reitter, 1904 | | N | | N | N | | | | LC |
| <i>Agathidium laevigatum laevigatum</i> Erichson, 1845 | H | | | N | N | N | | | LC |
| <i>Agathidium mandibulare</i> Sturm, 1807 | X | | | | | X | X | N | LC |
| <i>Agathidium marginatum</i> Sturm, 1807 | | | | | N | X | | | LC |
| <i>Agathidium montemurroi</i> Angelini & De Marzo, 1985 | | X | | | | X | X | B | VU |
| <i>Agathidium nigrinum</i> Sturm, 1807 | H | N | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | N | X | | B | LC |
| <i>Agathidium nudum</i> C. Hampe, 1870 | X | B | | | | X | X | B | DD |
| <i>Agathidium obenbergeri</i> Hlisenkovský, 1964 [E] | | X | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium paganettianum</i> Hlisenkovský, 1964 [E] | B | | | | | N | X | B | LC |
| <i>Agathidium pisanum</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1872 | | N | X | | N | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium plagiatum</i> (Gyllenhal, 1810) | X | X | | | | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium rotundatum paganettii</i> Reitter, 1908 [E] | | N | | | N | X | X | B | LC |
| <i>Agathidium seminulum</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | | N | X | | B | LC |
| <i>Agathidium varians varians</i> Beck, 1817 | X | X | | N | | | | B | LC |
| <i>Amphicyllis globiformis</i> (C.R. Sahlberg, 1833) | H | N | | | | | X | | LC |
| <i>Amphicyllis globus</i> (Fabricius, 1792) | | N | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Anisotoma castanea castanea</i> (Herbst, 1791) | X | | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Anisotoma glabra</i> (Fabricius, 1787) | X | | | | | X | X | N | VU |
| <i>Anisotoma humeralis</i> (Herbst, 1791) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Anisotoma orbicularis</i> (Herbst, 1791) | H | | | N | | X | X | | LC |
| Leiodini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Leiodes badia</i> (Sturm, 1807) | | X | | N | | X | X | N | |
| <i>Leiodes brunnea</i> (Sturm, 1807) | H | | | | CK | | | | |
| <i>Leiodes calcarata</i> (Erichson, 1845) | H | | X | | | X | | | |
| <i>Leiodes cinnamomea</i> (Panzer, 1793) | | | | | N | | | | |
| <i>Leiodes flavicornis</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1884) | | X | | | | | | B | |
| <i>Leiodes litura</i> Stephens, 1835 | | | | | | | | B | |
| <i>Leiodes longipes</i> (W.L.E. Schmidt, 1841) | | | | | | X | | | |
| <i>Leiodes macropus</i> (Rye, 1873) | | | | | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Phyllodrepoidea crenata</i> (Ganglbauer, 1895) | X | | | | CK | | | | NT |
| Coryphiini Jakobson, 1908 | | | | | | | | | |
| <i>Boreaphilus velox</i> (Heer, 1839) | H | | N | CK | B | CK | | B | |
| <i>Coryphium angusticolle</i> Stephens, 1834 | | | | | CK | CK | | B | |
| Eusphalerini Hatch, 1957 | | | | | | | | | |
| <i>Eusphalerum atrum</i> (Heer, 1839) | H | | | CK | CK | | | | |
| <i>Eusphalerum bargaglii</i> (Luze, 1910) | X | | | B | CK | X | | CK | |
| <i>Eusphalerum baudii</i> (A. Fiori, 1894) [E] | X | X | | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Eusphalerum bivittatum</i> (Eppelsheim, 1887) [E] | | CK | | | CK | X | X | B | |
| <i>Eusphalerum calabrum</i> Zanetti, 1980 [E] | | | | | B | B | B | CK | |
| <i>Eusphalerum cribrellum</i> (Fauvel, 1900) [E] | | | | | CK | X | X | CK | |
| <i>Eusphalerum italicum italicum</i> (Koch, 1938) [E] | B | | | N | | | | | |
| <i>Eusphalerum martinae</i> Zanetti, 2004 [E] | | | | B | | | | | |
| <i>Eusphalerum primulae</i> (Stephens, 1834) | | | | CK | | | | | |
| <i>Eusphalerum rectangulum</i> (Baudi di Selve, 1870) | | CK | | | | X | CK | | |
| <i>Eusphalerum ruffoi</i> (Scheerpeltz, 1956) [E] | | | | B | B | X | | | |
| <i>Eusphalerum schatzmayri</i> (Koch, 1938) [E] | | | | | B | X | B | | |
| <i>Eusphalerum signatum angulatum</i> (Luze, 1911) [E] | | | | | CK | X | X | CK | |
| <i>Eusphalerum stussineri</i> (Bernhauer, 1909) [E] | | X | | B | CK | X | X | | |
| <i>Eusphalerum viertli</i> (Ganglbauer, 1895) | | | | | CK | CK | | | |
| Omalini W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Acrolocha amabilis</i> (Heer, 1841) | | | | | CK | X | | B | |
| <i>Acrolocha daccordii</i> Zanetti, 1979 [E] | | | CK | | B | CK | CK | | |
| <i>Acrolocha sulcula</i> (Stephens, 1834) | | | | | B | CK | | | |
| <i>Dropephylla ioptera</i> (Stephens, 1834) | | | | | B | N | | | LC |
| <i>Dropephylla vilis</i> (Erichson, 1840) | | | | | | | CK | CK | NT |
| <i>Hapalaraea pygmaea</i> (Paykull, 1800) | | X | | | | CK | | | VU |
| <i>Omalium caesum</i> Gravenhorst, 1806 | H | | CK | CK | CK | N | CK | B | |
| <i>Omalium cinnamomeum</i> Kraatz, 1857 | H | X | | CK | CK | N | CK | B | |
| <i>Omalium excavatum</i> Stephens, 1834 | | | | N | CK | X | CK | B | |
| <i>Omalium italicum</i> Bernhauer, 1902 | H | CK | | CK | CK | CK | CK | B | |
| <i>Omalium rivulare</i> (Paykull, 1789) | H | | | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Omalium rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880 | CK | | CK | CK | CK | CK | CK | CK | |
| <i>Paraphloeostiba gayndahensis</i> (W.S. Macleay, 1873) | N | CK | X | B | CK | CK | CK | CK | |
| <i>Phloeonomus minimus</i> (Erichson, 1839) | | | | | CK | CK | | | VU |
| <i>Phloeonomus punctipennis</i> J. Thomson, 1867 | CK | | | | CK | CK | CK | | LC |
| <i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806) | X | CK | | | CK | X | X | | LC |
| <i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792) | | | N | | CK | CK | | | LC |
| <i>Phyllodrepa angelinii</i> Zanetti, 2009 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Phyllodrepa floralis</i> (Paykull, 1789) | | | | CK | CK | X | X | | |
| <i>Phyllodrepa melanocephala pollinensis</i> Scheerpeltz, 1956 [E] | | | | | CK | X | X | | VU |
| <i>Phyllodrepa nigra</i> (Gravenhorst, 1806) | X | X | | | CK | B | | | VU |
| <i>Phyllodrepa salicis</i> (Gyllenhal, 1810) | X | | | | | | X | | VU |
| <i>Xylodromus affinis</i> (Gerhardt, 1877) | H | X | X | CK | CK | X | | | |
| <i>Xylodromus depressus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | N | | N | X | | | |
| <i>Xylodromus testaceus</i> (Erichson, 1840) | CK | | | CK | CK | CK | N | CK | |
| <i>Xylostiba bosnica</i> (Bernhauer, 1902) | | X | | | CK | | | | VU |
| Proteininae Erichson, 1839 | | | | | | | | | |
| Anepiini Steel, 1966 | | | | | | | | | |
| <i>Megarthritis bellevoeyi</i> Saulcy, 1862 | X | X | | | N | N | | N | |
| <i>Megarthritis depressus</i> (Paykull, 1789) | H | | | | | | | | |
| <i>Megarthritis prosseni</i> Schatzmayr, 1904 | | | | | N | N | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Metopsia similis</i> Zerche, 1998 | H | N | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Proteinus angelinii</i> Dauphin, 1999 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840 | | X | N | | | X | X | N | |
| <i>Proteinus brachypterus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | N | | N | X | X | N | |
| <i>Proteinus cremulatus</i> Pandellé, 1867 | | | | | | | X | | |
| <i>Proteinus ovalis</i> Stephens, 1834 | | | | | N | | | | |
| Micropeplinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Micropeplus calabricus</i> Reitter, 1907 [E] | | | | | | | | N | |
| <i>Micropeplus fulvus fulvus</i> Erichson, 1840 | H | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Micropeplus latus</i> C. Hampe, 1861 | | | | | | X | N | | |
| <i>Micropeplus marietti</i> Jacquelin du Val, 1857 | | | X | | N | | X | | |
| <i>Micropeplus porcatus</i> (Paykull, 1789) | H | | | | | | | | |
| <i>Micropeplus staphylinoides</i> (Marsham, 1802) | H | N | N | | N | N | | N | |
| Dasycerinae Reitter, 1887 | | | | | | | | | |
| <i>Dasycerus sulcatus</i> Brongniart, 1800 | | | | | N | N | X | X | B LC |
| Pselaphinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Batrisitae Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Batrisini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Batrisina Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Löbl & Besuchet in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Batrisodes adnexus</i> (C. Hampe, 1863) | X | X | | | | X | X | B | LC |
| <i>Batrisodes delaporti</i> (Aubé, 1833) | X | | | | | | | | NT |
| <i>Batrisodes oculatus</i> (Aubé, 1833) | X | X | | | | N | | B | LC |
| <i>Batrisodes venustus</i> (Reichenbach, 1816) | X | X | | | | X | X | B | LC |
| <i>Batrisus formicarius</i> Aubé, 1833 | X | | | | | | | B | VU |
| Clavigerini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Apoderigerina Jeannel, 1954 | | | | | | | | | |
| <i>Claviger apenninus</i> Baudi di Selve, 1870 [E] | X | X | | | CK | N | X | CK | |
| Euplectini Streubel, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Euplectus bonvouloiri narentinus</i> Reitter, 1882 | CK | X | | | CK | CK | | B | LC |
| <i>Euplectus bonvouloiri rosae</i> Raffray, 1910 | | B | | | | | ! | | LC |
| <i>Euplectus brunneus</i> Grimmer, 1841 | X | X | | N | | X | X | B | NT |
| <i>Euplectus corsicus</i> Guillebeau, 1888 | H | | | | | | | B | LC |
| <i>Euplectus karstenii</i> (Reichenbach, 1816) | X | X | | CK | | X | | | LC |
| <i>Euplectus kirbyi hummleri</i> Reitter, 1906 | H | X | | N | CK | X | X | B | LC |
| <i>Euplectus piceus lucanus</i> Meggiolaro, 1966 [E] | | | | | B | | | | CR |
| <i>Euplectus theryi</i> Guillebeau, 1894 | | CK | | | CK | CK | | B | NT |
| <i>Euplectus tholini</i> Guillebeau, 1888 | X | X | | | | | | B | VU |
| <i>Euplectus verticalis</i> Reitter, 1884 | | | | | | | | B | NT |
| Mayetiini Winkler, 1925 | | | | | | | | | |
| <i>Mayetia garganica</i> Pace, 1975 [E] | X | | | | | | | | |
| Trichonychini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Bibloporina O. Park, 1951 | | | | | | | | | |
| <i>Amauronyx maerkelii</i> (Aubé, 1844) | | X | | | | | | B | NT |
| <i>Aphilia crassipes</i> (Raffray, 1908) | | | | | B | | | B | |
| <i>Biblopectus ambiguus</i> (Reichenbach, 1816) | | | | | | | | B | |
| <i>Biblopectus delhermi</i> Guillebeau, 1888 | | CK | CK | | | | | | |
| <i>Biblopectus limatus</i> Normand, 1939 | | CK | | | | | | B | |
| <i>Biblopectus obtusus</i> Guillebeau, 1888 | | | X | | | | | | |
| <i>Biblopectus pusillus</i> (Denny, 1825) | | CK | | | | | | | |
| <i>Biblopectus tenebrosus</i> (Reitter, 1880) | | | | | | | | B | |
| <i>Bibloporus bicolor devillei</i> Jeannel, 1950 | | | | | CK | X | | B | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I., Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category | |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|---|----------------|--------------|------------|---------------|----|
| <i>Bibloporus mayeti</i> Guillebeau, 1888 | ! | | | | CK | | | NT | |
| <i>Bibloporus minutus</i> Raffray, 1914 | CK | | | | | | B | NT | |
| <i>Bibloporus ultimus</i> Guillebeau, 1892 | ! | | | | CK | X | B | NT | |
| <i>Pseudoplectus perplexus</i> (Jacquelin du Val, 1854) | | CK | | | | | B | | |
| <i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816) | H | N | | | | X | | NT | |
| <i>Trimium besucheti</i> Sabella, 1989 [E] | | | | | | | B | VU | |
| <i>Trimium brevicorne</i> (Reichenbach, 1816) | | | | CK | CK | ! | | LC | |
| <i>Trimium minimum</i> Doderò, 1900 | | X | | | | | B | NT | |
| <i>Trimium paganettii</i> Reitter, 1906 [E] | | | | | CK | ! | B | VU | |
| <i>Trimium zoufali</i> Krauss, 1900 [E] | | | | | CK | | B | LC | |
| Trichonychini taxa incertae sedis | | | | | | | | | |
| <i>Meliceria sulciventris</i> (Guillebeau, 1888) | CK | B | | | CK | | B | VU | |
| <i>Plectophloeus fischeri</i> (Aubé, 1833) | | | | | CK | CK | B | LC | |
| <i>Plectophloeus nitidus</i> (Fairmaire, 1858) | | | | | | | B | LC | |
| <i>Plectophloeus nubigena bosnicus</i> Besuchet, 1964 | | | | | CK | N | CK | B | VU |
| Faronini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Faronus aubei</i> P.H. Lucas, 1854 | | | | | | | B | | |
| <i>Faronus lafertei</i> Aubé, 1844 | H | | | CK | | | B | | |
| <i>Faronus stolzi</i> W. Blattný & C. Blattný, 1914 [E] | | | | | | | B | | |
| Brachyglutini Raffray, 1904 | | | | | | | | | |
| Brachyglutina Raffray, 1904 | | | | | | | | | |
| <i>Brachygluta abrupta</i> Doderò, 1919 | X | X | | | | | | | |
| <i>Brachygluta angelinii</i> Sabella, 1997 [E] | | | B | | | | | | |
| <i>Brachygluta appennina</i> (Saulcy, 1876) | | CK | X | | CK | X | X | B | |
| <i>Brachygluta aubei</i> (Tournier, 1868) | | | | | | | | B | |
| <i>Brachygluta fossulata</i> (Reichenbach, 1816) | | ! | | CK | CK | CK | | | |
| <i>Brachygluta foveola foveola</i> (Motschulsky, 1840) | X | X | X | N | | X | X | B | |
| <i>Brachygluta furcata</i> (Motschulsky, 1835) | | | X | | | | | | |
| <i>Brachygluta galathea</i> (Saulcy, 1876) [E] | | X | | | | | | B | |
| <i>Brachygluta guillemardi</i> (Saulcy, 1876) | | | X | | | | | | |
| <i>Brachygluta helferi helferi</i> (Schmidt-Göbel, 1836) | X | X | ! | N | | X | X | B | |
| <i>Brachygluta hipponensis</i> (Saulcy, 1876) | | CK | | | | | | B | |
| <i>Brachygluta lefebvrei lefebvrei</i> (Aubé, 1833) | CK | | X | | | | | | |
| <i>Brachygluta numidica</i> (Saulcy, 1876) | | | | | | CK | | | |
| <i>Brachygluta pandellei</i> (Saulcy, 1876) | | | | | | | B | | |
| <i>Brachygluta perforata</i> (Aubé, 1833) | X | X | X | | CK | N | | | |
| <i>Brachygluta ragusae</i> (Saulcy, 1876) | H | X | | N | CK | X | | B | |
| <i>Brachygluta tibialis</i> (Aubé, 1844) | B | | | | | | | | |
| <i>Brachygluta trigonoprocta</i> (Ganglbauer, 1895) | | X | X | | | CK | | | |
| <i>Fagniezia impressa</i> (Panzer, 1803) | | X | | | | | | | |
| <i>Reichenbachia chevrieri</i> (Aubé, 1844) | X | | | | | ! | | B | |
| <i>Reichenbachia nigriventris</i> (Schaum, 1859) | X | X | | | | | | B | |
| <i>Rybaxis longicornis</i> (Leach, 1817) | X | X | X | CK | CK | N | | B | |
| <i>Trissemus antennatus antennatus</i> (Aubé, 1833) | | X | CK | CK | CK | | | B | |
| <i>Trissemus olivieri</i> (Raffray, 1871) | N | N | X | N | N | | | B | |
| Bythinini Raffray, 1890 | | | | | | | | | |
| <i>Bryaxis chevrolati</i> (Aubé, 1833) | | CK | | | CK | | | | |
| <i>Bryaxis curtisi orientalis</i> (Karaman, 1952) | | | | | B | X | X | B | VU |
| <i>Bryaxis italicus</i> (Baudi di Selve, 1870) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Bryaxis paganettii</i> (W. Blattný & C. Blattný, 1914) [E] | | | | N | B | X | X | B | |
| <i>Bryaxis pedator</i> (Reitter, 1882) [E] | | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Bryaxis picteti meridionalis</i> (Machulka, 1932) [E] | | X | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Bryaxis porzenna</i> (Reitter, 1882) | | | | | B | ! | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Bryaxis samniticus</i> W. Blattný & C. Blattný, 1914 [E] | X | X | | N | B | X | X | | |
| <i>Tychobythinus andreinii</i> (Dodero, 1919) [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Tychobythinus glabratus</i> (Rye, 1870) | H | B | | | B | CK | | B | |
| <i>Tychobythinus gularis</i> (Dodero, 1919) [E] | | | X | | B | | | | |
| Tychini Raffray, 1904 | | | | | | | | | |
| <i>Tychus angelinii</i> Sabella & Poggi, 1997 [E] | | | B | | CK | | | B | |
| <i>Tychus corsicus spissatus</i> Rey, 1888 | | | X | | CK | | | | |
| <i>Tychus dalmatinus</i> Reitter, 1880 | | X | | | | | | | |
| <i>Tychus florentinus</i> Reitter, 1884 [E] | | | | | CK | | | | |
| <i>Tychus jacquelinii</i> Boieldieu, 1859 | H | | | | | | | B | |
| <i>Tychus lucanus</i> Sabella & Poggi, 1997 [E] | | | | | CK | | | | |
| <i>Tychus normandi</i> Jeannel, 1950 | | | | CK | CK | CK | | B | |
| <i>Tychus pullus</i> Kiesenwetter, 1858 | X | X | X | | | | | | |
| Ctenistini C.É. Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Ctenistes palpalis</i> Reichenbach, 1816 | | | X | | | | | | |
| Pselaphini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Pselaphogenius aspromontanus</i> (Reitter, 1910) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Pselaphogenius calabrus</i> (Reitter, 1910) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Pselaphogenius lucanicus</i> Besuchet, 1964 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Pselaphogenius neapolitanus</i> (Besuchet, 1964) [E] | | | | B | CK | CK | | | |
| <i>Pselaphus parvus</i> Karaman, 1940 | H | X | X | N | CK | N | | | |
| Tyrini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Tyrina Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Tyrus micronatus micronatus</i> (Panzer, 1805) | X | X | | | | CK | X | B | NT |
| Phloeocharinae Erichson, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Phloeocharis subtilissima</i> Mannerheim, 1830 | | | N | N | | N | N | N | LC |
| Tachyporinae W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| Mycetoporini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Bolitobius cingulatus</i> Mannerheim, 1830 | H | | | | | N | | | |
| <i>Bryophacis rufus</i> (Erichson, 1839) | | | | | N | X | | | |
| <i>Bryoporus cernuus</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | | N | | | | |
| <i>Bryoporus multipunctus</i> C. Hampe, 1867 | | | | | N | | | | |
| <i>Carphacis striatus</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | | | | N | N | N | N | |
| <i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin, 1847) | | | N | | N | N | | B | |
| <i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | X | N | N | N | | N | |
| <i>Lordithon exoletus</i> (Erichson, 1839) | H | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1760) | H | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Lordithon thoracicus thoracicus</i> (Fabricius, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Lordithon trimaculatus</i> (Fabricius, 1792) | N | X | | | | N | | | |
| <i>Mycetoporus altaicus</i> Luze, 1901 | | | | | | X | | | |
| <i>Mycetoporus angularis</i> Mulsant & Rey, 1853 | H | | | | | | | | |
| <i>Mycetoporus bauduerei</i> Mulsant & Rey, 1875 | H | N | | | | | | | |
| <i>Mycetoporus brucki</i> (Pandellé, 1869) | | | | | | X | | | |
| <i>Mycetoporus confinis</i> Rey, 1883 | | | | | N | | | N | |
| <i>Mycetoporus eppelsheimianus</i> Fagel, 1968 | | | | | N | N | N | | |
| <i>Mycetoporus forticornis</i> Fauvel, 1875 | H | | | | | | | | |
| <i>Mycetoporus glaber glaber</i> (Sperk, 1835) | | | | | | | | B | |
| <i>Mycetoporus longulus</i> Mannerheim, 1830 | | | | | | X | | | |
| <i>Mycetoporus macrocephalus</i> Bernhauer, 1917 | H | | | | N | X | | B | |
| <i>Mycetoporus mulsanti</i> Ganglbauer, 1895 | H | | | | N | X | | | |
| <i>Mycetoporus nigricollis</i> Stephens, 1835 | H | X | X | | | N | | N | |
| <i>Mycetoporus piceolus</i> Rey, 1883 | H | | | | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Mycetoporus punctus</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | N | N | X | | N | |
| <i>Mycetoporus reichei</i> (Pandellé, 1869) | H | | | | N | | | N | |
| <i>Mycetoporus rufescens</i> (Stephens, 1832) | H | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Mycetoporus silvaticus</i> Jablokoff-Khnzorian, 1962 | | | | | B | | | B | |
| <i>Mycetoporus solidicornis</i> Wollaston, 1864 | | X | | N | | | | | |
| <i>Parabolitobius inclinans</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | | N | X | X | | |
| Tachyporini W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767) | | X | X | N | | X | X | | |
| <i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802) | N | N | | | | | | | NT |
| <i>Sepedophilus bipustulatus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | | | | X | X | | NT |
| <i>Sepedophilus immaculatus</i> (Stephens, 1832) | | X | X | N | | | | | LC |
| <i>Sepedophilus littoreus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | | | | |
| <i>Sepedophilus lusitanicus</i> Hammond, 1973 | | X | X | | | X | X | | NT |
| <i>Sepedophilus marshami</i> (Stephens, 1832) | | | X | | N | | | | LC |
| <i>Sepedophilus nigripennis</i> (Stephens, 1832) | H | X | X | | N | | | B | |
| <i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1792) | | X | | | N | N | N | N | LC |
| <i>Tachinus flavolimbatus</i> Pandellé, 1869 | H | X | | | | | | N | |
| <i>Tachinus humeralis humeralis</i> Gravenhorst, 1802 | X | | N | N | N | X | X | N | |
| <i>Tachinus marginellus angelinii</i> Schülke, 1996 [E] | X | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | N | | | |
| <i>Tachinus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | X | N | N | X | X | | |
| <i>Tachyporus abner</i> Sauley, 1865 | | | | | N | | X | N | |
| <i>Tachyporus atriceps</i> Stephens, 1832 | X | | | | | | | | |
| <i>Tachyporus caucasicus</i> Kolenati, 1846 | | | | | N | | | N | |
| <i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | N | N | | X | X | | |
| <i>Tachyporus dispar</i> (Paykull, 1789) | | | | | N | | | | |
| <i>Tachyporus formosus</i> A. Matthew, 1838 | | X | | | | | | B | |
| <i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775) | X | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst, 1806 | H | | X | N | | X | X | B | |
| <i>Tachyporus scitulus</i> Erichson, 1839 | | | | | N | | | | |
| <i>Tachyporus solutus</i> Erichson, 1839 | H | X | X | N | N | X | | B | |
| Trichophyinae J. Thomson, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Trichophya pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810) | H | | | | N | X | X | N | |
| Habrocerinae Mulsant & Rey, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Habrocerus pisidicus</i> Korge, 1971 | B | | | | N | | | | |
| Aleocharinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Aleocharini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Aleocharina Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Aleochara bilineata</i> Gyllenhal, 1810 | | X | | | | | | B | |
| <i>Aleochara binotata</i> Kraatz, 1856 | | | | | N | | | | |
| <i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1760) | H | X | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Aleochara brevipennis</i> Gravenhorst, 1806 | | | N | | | | | | |
| <i>Aleochara crassa</i> Baudi di Selve, 1848 | | | | | | | | B | |
| <i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777) | X | X | | N | | X | X | | |
| <i>Aleochara diversa</i> (J. Sahlberg, 1876) | | | | | | | | B? | |
| <i>Aleochara finebris</i> Wollaston, 1864 | | | | | | X | X | N | |
| <i>Aleochara grisea</i> Kraatz, 1856 | | X | | | | | | | |
| <i>Aleochara haemoptera</i> Kraatz, 1858 | | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Aleochara hummleri</i> Bernhauer, 1914 [E] | | | | | | | N | | |
| <i>Aleochara intricata</i> Mannerheim, 1830 | H | | X | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Aleochara lanuginosa</i> Gravenhorst, 1802 | H | | | | N | N | | B | |
| <i>Aleochara lata</i> Gravenhorst, 1802 | | | | | N | | | | |
| <i>Aleochara laticornis</i> Kraatz, 1856 | H | | | | | | | N | |
| <i>Aleochara maculata</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | H | | | | | | | | |
| <i>Aleochara milleri</i> Kraatz, 1862 | | | | | N | | | | |
| <i>Aleochara moesta</i> Gravenhorst, 1802 | | X | | | | | | | |
| <i>Aleochara puberula</i> Klug, 1832 | | | | | | | | N | |
| <i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839 | X | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Aleochara spissicornis</i> Erichson, 1839 | H | | | | | | | | |
| <i>Aleochara stichai</i> Likovský, 1965 | | | | | N | N | | | |
| <i>Aleochara tristis</i> Gravenhorst, 1806 | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Aleochara verna</i> Say, 1833 | | | | | | | | N | |
| <i>Amarochara bomairei</i> (Fauvel, 1865) | H | | | | B | | | | |
| <i>Tinotus morion</i> (Gravenhorst, 1802) | | X | | | | | N | N | |
| Athetini Casey, 1910 | | | | | | | | | |
| Athetina Casey, 1910 | | | | | | | | | |
| <i>Acrotona aterrima</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | | | | | N | |
| <i>Acrotona benicki</i> (Allen, 1940) | | N | | | | | | | |
| <i>Acrotona muscorum</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1860) | X | | | | N | | | B | |
| <i>Acrotona nigerrima</i> (Aubé, 1850) | | | | | N | | | | |
| <i>Acrotona parens</i> (Mulsant & Rey, 1852) | H | | | | | | | B | |
| <i>Acrotona parvula</i> (Mannerheim, 1830) | H | | | | | | | | |
| <i>Acrotona piceorufa</i> (Mulsant & Rey, 1873) | | | | | | N | | N | |
| <i>Acrotona pygmaea</i> (Gravenhorst, 1802) | | | N | | | | | B | |
| <i>Alianta incana</i> (Erichson, 1837) | | N | | | | | | | |
| <i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802) | H | | X | | N | | | | |
| <i>Amischa forcipata</i> Mulsant & Rey, 1873 | | | | | | | | N | |
| <i>Atheta aeneicollis</i> (Sharp, 1869) cf. | | | X | | N | N | | N | |
| <i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832) | H | X | | | | | | | |
| <i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810) | H | | | | N | | | | |
| <i>Atheta benickiella</i> Brundin, 1948 | | | | | | | | N | |
| <i>Atheta britanniae</i> Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Atheta burlei</i> Tronquet, 1999 | | | | | | | | B | |
| <i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1830) | H | N | | N | | X | | B | |
| <i>Atheta celata</i> (Erichson, 1837) | | | | | | | | B | |
| <i>Atheta clientula</i> (Erichson, 1839) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856) | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta corvina</i> (J. Thomson, 1856) | N | | | | | | | | |
| <i>Atheta crassicornis</i> (Fabricius, 1792) | H | | | N | N | | | B | |
| <i>Atheta dadopora</i> J. Thomson, 1867 | | | | | | N | | N | |
| <i>Atheta elongatula</i> (Gravenhorst, 1802) | | X | | | | | | | |
| <i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806) | H | | | | | N | | | |
| <i>Atheta gagatina</i> (Baudi di Selve, 1848) | H | X | | | N | N | | | |
| <i>Atheta harwoodi</i> B.S. Williams, 1930 | | | | | | N | | B | |
| <i>Atheta hybrida</i> Sharp, 1869 | | | | | N | N | | | |
| <i>Atheta hygrotopora</i> (Kraatz, 1856) | | | | | | X | N | B | |
| <i>Atheta hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850) | | | | | | | | N | |
| <i>Atheta incognita</i> (Sharp, 1869) | | N | | | N | N | | | |
| <i>Atheta intermedia</i> (J. Thomson, 1852) | | | | | | | X | | |
| <i>Atheta laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852) | H | | | | | | | | |
| <i>Atheta laevicauda</i> J. Sahlberg, 1876 | | | | | N | | | N | |
| <i>Atheta laticollis</i> (Stephens, 1832) | | | | | N | N | | | |
| <i>Atheta leonhardi</i> Bernhauer, 1911 | | | | N | | X | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Atheta liliputana</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1860 | | | | | | N | | | |
| <i>Atheta longicornis</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | N | N | N | N | | B | |
| <i>Atheta marcida</i> (Erichson, 1837) | | | | | N | | X | | |
| <i>Atheta melanaria</i> (Mannerheim, 1830) | H | | | | | | | | |
| <i>Atheta melanocera</i> (J. Thomson, 1856) | H | X | | | | | | | |
| <i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856) | | | | | | N | | | |
| <i>Atheta nigrifulva</i> (Gravenhorst, 1802) | H | | | | N | N | N | N | |
| <i>Atheta oblita</i> (Erichson, 1839) | | N | N | | N | | | N | |
| <i>Atheta orbata</i> (Erichson, 1837) | | N | X | N | | | | B | |
| <i>Atheta orphana</i> (Erichson, 1837) | | X | | | | | | B | |
| <i>Atheta palleola</i> (Erichson, 1837) | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta pallidicornis</i> (J. Thomson, 1856) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Atheta palustris</i> (Kiesenwetter, 1844) | H | | | | N | | | B | |
| <i>Atheta parca</i> (Mulsant & Rey, 1873) | | | | | | | | N | |
| <i>Atheta picipes</i> (J. Thomson, 1856) | H | | | | N | | X | N | LC |
| <i>Atheta pilicornis</i> (J. Thomson, 1852) | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta putrida</i> (Kraatz, 1856) | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839) | H | | N | | N | | | N | |
| <i>Atheta scapularis</i> (C.R. Sahlberg, 1831) | | | X | | | | | N | |
| <i>Atheta taxiceroides</i> Munster, 1932 | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta testaceipes</i> (Heer, 1839) | H | X | N | | | | | | |
| <i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856) | H | X | | N | N | N | X | N | |
| <i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856) | H | | | | N | N | X | B | |
| <i>Atheta vaga</i> (Heer, 1839) | | | | | N | | | | |
| <i>Atheta volans</i> (W. Scriba, 1859) | | | N | | | | | | |
| <i>Dinaraea linearis</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | | | | | | | NT |
| <i>Hydrosmeeta delicatissima</i> (Bernhauer, 1908) | | | | | | | | B | |
| <i>Lioghuta alpestris</i> (Heer, 1839) | | | | | | X | N | N | |
| <i>Lioghuta longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802) | H | | X | B | N | X | N | B | |
| <i>Lioghuta wuesthoffi</i> (G. Benick, 1938) | | | | | N | N | | | |
| <i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830) | | X | X | N | | X | | B | |
| <i>Ousipalia caesula</i> (Erichson, 1839) | | X | | | | | | | |
| Thamiaracina Fenyés, 1921 | | | | | | | | | |
| <i>Thamiaraea cinnamomea</i> (Gravenhorst, 1802) | | X | N | | N | | | B | LC |
| <i>Thamiaraea hospita</i> (Märkel, 1844) | | X | | | N | N | | | LC |
| Autaliini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Autalia impressa</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | X | | N | N | N | | B | |
| <i>Autalia longicornis</i> Scheerpeltz, 1947 | N | X | N | | N | N | N | B | |
| <i>Autalia puncticollis</i> Sharp, 1864 | | | | | | N | | | |
| <i>Autalia rivularis</i> (Gravenhorst, 1802) | H | | | | | N | N | | |
| Falagriini Mulsant & Rey, 1873 | | | | | | | | | |
| <i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | N | N | N | N | N | N | |
| <i>Falagria splendens</i> Kraatz, 1858 | | X | X | | | N | | | |
| <i>Falagria sulcatula</i> (Gravenhorst, 1806) | | X | X | | | | | | |
| <i>Falagrioma thoracica</i> (Stephens, 1832) | | | N | N | N | N | | B | |
| Geostibini Seevers, 1978 | | | | | | | | | |
| <i>Alevonota crypticola</i> (Pace, 1977) | | | | | B | | | | |
| <i>Alevonota egregia</i> (Rye, 1876) | | | | | | B | | | |
| <i>Alevonota gracilentia</i> (Erichson, 1839) | H | B | | | | | | | |
| <i>Alevonota rufotestacea</i> (Kraatz, 1856) | B | | | | N | | | B | |
| <i>Aloconota gregaria</i> (Erichson, 1839) | | X | N | | N | N | N | N | |
| <i>Aloconota insecta</i> (J. Thomson, 1856) | H | | | | | | | N | |
| <i>Aloconota planifrons</i> (G.R. Waterhouse, 1863) | | | | | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832) | | | | N | N | X | | B | |
| <i>Callicerus atricollis</i> (Aubé, 1850) | H | X | N | | | | | | |
| <i>Callicerus rigidicornis</i> (Erichson, 1839) | | | | | | | | N | |
| <i>Earota reyi</i> (Kiesenwetter, 1850) | | | | | N | X | | B | |
| <i>Geostiba aspromontana</i> Pace, 1977 | | | | | | | | B | |
| <i>Geostiba focarilei</i> (Scheerpeltz, 1956) [E] | | | | | | X | | | |
| <i>Geostiba garganica</i> Pace, 2002 [E] | B | | | | | | | | |
| <i>Geostiba leonhardi</i> (Bernhauer, 1908) [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Geostiba lucana</i> Pace, 2002 [E] | | | | B | | | | | |
| <i>Geostiba tamaninii</i> (Scheerpeltz, 1956) [E] | | | | | | X | | | |
| Homalotini Heer, 1839 | | | | | | | | | |
| Bolitocharina C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Bolitochara bella</i> Märkel, 1844 | H | X | | N | N | B | | B | |
| <i>Bolitochara obliqua</i> Erichson, 1837 | H | | | | | X | X | | LC |
| <i>Bolitochara tecta</i> Assing, 2014 | | | | N | B | X | | B | CR |
| <i>Caloderina hierosolymitana</i> (Saulcy, 1865) | H | | | | | X | | N | |
| <i>Euryusa optabilis</i> Heer, 1839 | X | | | | | X | X | | LC |
| <i>Leptusa fuliginosa</i> (Aubé, 1850) | | | | | | N | | | VU |
| <i>Leptusa fumida</i> (Erichson, 1839) | | | | | N | CK | | | LC |
| <i>Leptusa kochiana aspromontana</i> Pace, 1977 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Leptusa kochiana kochiana</i> Bernhauer, 1936 [E] | | | | | CK | X | | | |
| <i>Leptusa pulchella</i> (Mannerheim, 1830) | | | | | N | X | | B | LC |
| <i>Leptusa ruficollis</i> (Erichson, 1839) | H | | | N | N | B | B | N | LC |
| <i>Leptusa salernitana</i> Pace, 1979 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Leptusa secreta</i> Bernhauer, 1900 | | | | | | CK | | B | |
| Gyrophaenina Kraatz, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Agaricochara latissima</i> (Stephens, 1832) | H | | | | | | | | |
| <i>Gyrophaena affinis</i> Mannerheim, 1830 | X | X | | | | | | | |
| <i>Gyrophaena bihamata</i> J. Thomson, 1867 | H | | | | | | | | |
| <i>Gyrophaena congrua</i> Erichson, 1837 | | | | | | X | | | |
| <i>Gyrophaena joyioides</i> Wüsthoff, 1937 | | N | N | | | | | N | |
| <i>Gyrophaena lucidula</i> Erichson, 1837 | | | N | | | | | | |
| <i>Gyrophaena manca</i> Erichson, 1839 | | X | | | | | | | |
| <i>Gyrophaena muensteri</i> A. Strand, 1935 | X | | | | | | | | |
| <i>Gyrophaena nitidula</i> (Gyllenhal, 1810) | | | | | N | | | | |
| <i>Gyrophaena poweri</i> Crotch, 1867 | | X | | | | | | | |
| Homalotina Heer, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Anomognathus cuspidatus</i> (Erichson, 1839) | H | X | | | | | | | LC |
| <i>Homalota plana</i> (Gyllenhal, 1810) | | X | | | | | | | LC |
| Hypocyphini Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| <i>Cypha longicornis</i> (Paykull, 1800) | H | X | X | N | N | N | | N | |
| <i>Cypha ovulum</i> (Heer, 1839) | | | | | | | N | | |
| <i>Cypha seminulum</i> (Erichson, 1839) | | | | | | | | N | |
| <i>Cypha spathulata</i> Assing, 2007 | ! | | ! | | | | | ! | |
| <i>Cypha tarsalis</i> (Luze, 1902) | | | | | | N | | | |
| <i>Holobus apicatus</i> (Erichson, 1837) | | | | | | | | N | |
| <i>Holobus flavicornis</i> (Lacordaire, 1835) | H | | N | | N | | | | |
| <i>Oligota inflata</i> (Mannerheim, 1830) | | X | | | | | | | |
| <i>Oligota muensteri latior</i> Kapp, 2019 | | B | | | B | | | B | |
| <i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858 | | | | | N | | | | |
| <i>Oligota punctulata</i> Heer, 1839 | | | N | | | | | | |
| <i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806) | | | X | | | N | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Lomechusini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Myrmedoniina J. Thomson, 1867 | | | | | | | | | |
| <i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787) | | | X | | | N | | | |
| <i>Drusilla italica</i> (Bernhauer, 1903) [E] | | X | | N | N | X | | B | |
| <i>Myrmoecia rigida</i> (Erichson, 1839) | | | X | | | | | | |
| <i>Pella cognata</i> (Märkel, 1842) | H | | | | | | | | |
| <i>Pella funesta</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | | N | | | | |
| <i>Pella humeralis</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | | N | | | N | |
| <i>Pella laticollis</i> (Märkel, 1844) | H | | X | | | | | | |
| <i>Pella ruficollis</i> (Grimm, 1845) | X | X | | | | | | | |
| <i>Pella similis</i> (Märkel, 1844) | H | | | | | | | | |
| <i>Zyras collaris</i> (Paykull, 1800) | H | | | | | | | N | |
| <i>Zyras fulgidus</i> (Gravenhorst, 1806) | H | | | | N | | | | |
| Myllaenini Ganglbauer, 1895 | | | | | | | | | |
| <i>Myllaena brevicornis</i> (A.H. Matthews, 1838) | | | | | | N | | | |
| <i>Myllaena intermedia</i> Erichson, 1837 | | N | X | | N | N | | N | |
| Oxypodini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Dinardina Mulsant & Rey, 1873 | | | | | | | | | |
| <i>Homoeusa acuminata</i> (Märkel, 1842) | H | N | | | | | | | |
| Meoticina SeEVERS, 1978 | | | | | | | | | |
| <i>Meotica exilis</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | N | | X | | N | |
| Microglottina FenyEs, 1918 | | | | | | | | | |
| <i>Crataraea suturalis</i> (Mannerheim, 1830) | X | | | | | X | X | | |
| <i>Haploglossa gentilis</i> (Märkel, 1844) | | | | | N | | | | |
| <i>Haploglossa marginalis</i> (Gravenhorst, 1806) | | | | | N | | | | |
| <i>Haploglossa picipennis</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | | | N | |
| <i>Haploglossa villosula</i> (Stephens, 1832) | | | | | N | N | | | |
| Oxypodina C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Calodera aethiops</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | | | | N | |
| <i>Calodera ligula</i> Assing, 1996 | | | N | | | | | B | |
| <i>Calodera nigrita</i> Mannerheim, 1830 | | | | | | | | N | |
| <i>Cousya defecta</i> (Mulsant & Rey, 1875) | H | | | | | | | | |
| <i>Cousya longitarsis</i> (J. Thomson, 1867) | | X | | | | | | | |
| <i>Cousya nigrata</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1856) | H | | | | | | | | |
| <i>Dexiogyra corticina</i> (Erichson, 1837) | | X | | | | | | N | LC |
| <i>Euryalaea murina</i> (Erichson, 1839) | | | | | | N | | | |
| <i>Ocalea badia</i> Erichson, 1837 | H | | | | | | | | |
| <i>Ocalea pollinensis</i> Scheerpeltz, 1956 | | | | | | X | | | |
| <i>Oxypoda abdominalis</i> (Mannerheim, 1830) | | | | | N | N | | N | |
| <i>Oxypoda alternans</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Oxypoda annularis</i> (Mannerheim, 1830) | | | | N | N | N | | N | |
| <i>Oxypoda brevicornis</i> (Stephens, 1832) | N | | X? | N | N | N | | N | |
| <i>Oxypoda carbonaria</i> (Heer, 1841) | | | N | | | | | | |
| <i>Oxypoda doderoi</i> Bernhauer, 1902 | | | | | | | | B | |
| <i>Oxypoda ferruginea</i> Erichson, 1839 | H | | | | | | | | |
| <i>Oxypoda formosa</i> Kraatz, 1856 | X | | N | | N | X | | B | |
| <i>Oxypoda fusina</i> Mulsant & Rey, 1875 | X | | | | B | B | | | |
| <i>Oxypoda haemorrhoea</i> (Mannerheim, 1830) | | | | | | | | N | |
| <i>Oxypoda induta</i> Mulsant & Rey, 1861 | H | | | | | | | | |
| <i>Oxypoda lurida</i> Wollaston, 1857 | H | | | | | | | | |
| <i>Oxypoda nova</i> Bernhauer, 1902 | | | | | | | | B | |
| <i>Oxypoda opaca</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | X | N | N | N | | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Oxypoda togata</i> Erichson, 1837 | | | N | | | | | | |
| <i>Oxypoda vittata</i> Märkel, 1842 | H | | | N | | N | | B | |
| <i>Tetralaucopora longitarsis</i> (Erichson, 1839) | | N | | | N | | | B | |
| Phloeoporina C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | | | | X | X | | LC |
| <i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830) | H | | | | | | X | | LC |
| Phytosini J. Thomson, 1867 | | | | | | | | | |
| <i>Phytosus spinifer</i> Curtis, 1838 | X | | | | | | | | |
| Placusini Mulsant & Rey, 1871 | | | | | | | | | |
| <i>Placusa adscita</i> Erichson, 1839 | | | | | N | | | | NT |
| <i>Placusa atrata</i> (Mannerheim, 1830) | H | | | | | | | | LC |
| <i>Placusa complanata</i> Erichson, 1839 | | | | | | | X | | LC |
| <i>Placusa pumilio</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | | | N | | N | LC |
| Pronomacini Mulsant & Rey, 1873 | | | | | | | | | |
| <i>Pronomaea picea</i> Heer, 1841 | | | | | | | | B | |
| Tachyusini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Dilacra luteipes</i> (Erichson, 1837) | | X | | | | | | | |
| <i>Gnypeta carbonaria</i> (Mannerheim, 1830) | | | X | | | | | | |
| <i>Gnypeta rubrior</i> Tottenham, 1939 | | N | | | | | | B | |
| <i>Ischnopoda umbratica</i> (Erichson, 1837) | | | | | | | | B | |
| <i>Tachyusa balteata</i> Erichson, 1839 | | | | | | N | | | |
| <i>Tachyusa coarctata</i> Erichson, 1837 | | X | | | N | | | B | |
| <i>Tachyusa objecta</i> Mulsant & Rey, 1870 | | | | | | X | | | |
| Taxicerini Lohse, 1989 | | | | | | | | | |
| <i>Taxicera deplanata</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | | B | | | | |
| Scaphidiinae Latreille, 1806 | | | | | | | | | |
| Scaphiini Achard, 1924 | | | | | | | | | |
| Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Scaphium immaculatum</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | | | N | X | X | N | NT |
| Scaphidiini Latreille, 1806 | | | | | | | | | |
| <i>Scaphidium quadrimaculatum</i> A.G. Olivier, 1790 | H | X | | N | N | X | X | N | NT |
| Scaphisomatini Casey, 1894 | | | | | | | | | |
| <i>Baeocera nobilis nobilis</i> Reitter, 1884 | N | | | | | N | | N | VU |
| <i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | | | | LC |
| <i>Scaphisoma boleti boleti</i> (Panzer, 1793) | N | X | | N | N | X | N | N | |
| <i>Scaphisoma boreale</i> Lundblad, 1952 | X | | | | | X | X | N | NT |
| <i>Scaphisoma flavonotatum</i> Pic, 1905 | N | N | | | | N | | | |
| <i>Scaphisoma italicum</i> Tamanini, 1955 | X | X | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Scaphisoma loebli</i> Tamanini, 1969 | | X | | | | N | | | NT |
| <i>Scaphisoma obenbergeri</i> Löbl, 1963 | | | | | | N | | | NT |
| <i>Scaphisoma subalpinum subalpinum</i> Reitter, 1880 | X | | | N | | B | | | LC |
| Piestinae Erichson, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Siagonium humerale</i> Germar, 1836 | H | | | | | | | | NT |
| Thoracophorina Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Thoracophorus corticinus</i> Motschulsky, 1837 | B | | | | | | | | |
| Oxytelinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Blediini Adam, 2001 | | | | | | | | | |
| <i>Bledius atricapillus</i> (Germar, 1825) | | X | | | | | | | |
| <i>Bledius cribricollis</i> Heer, 1839 | | N | | | | | | | |
| <i>Bledius fossor</i> Heer, 1839 | | | | | | X | | B | |
| <i>Bledius frater</i> Kraatz, 1857 | | X | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Bledius furcatus</i> (A.G. Olivier, 1811) | | X | | | N | | | B | |
| <i>Bledius gallicus</i> (Gravenhorst, 1806) | | | N | | | | | | |
| <i>Bledius graellsii graellsii</i> Fauvel, 1865 | | X | | | | | | | |
| <i>Bledius heterocerus</i> Eppelsheim, 1889 | | N | | | | | | | |
| <i>Bledius lohsei</i> Schülke, 2011 | | X | | | | | | | |
| <i>Bledius minor doderoi</i> Bondroit, 1912 | X | | | | | | | | |
| <i>Bledius minor minor</i> Mulsant & Rey, 1878 | | X | | | N | | | | |
| <i>Bledius occidentalis</i> Bondroit, 1907 | | | | | | | | N | |
| <i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784) | | X | | | | | | | |
| <i>Bledius tristis</i> Erichson, 1840 | X | | | | | | | | |
| <i>Bledius unicornis</i> (Germar, 1825) | | X | | | | | | N | |
| <i>Bledius verres</i> Erichson, 1840 | | X | | | | | | B | |
| Deleasteriini Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | N | X | | N | |
| Oxytelini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839) | X | X | | | | N | | B | |
| <i>Anotylus intricatus</i> (Erichson, 1840) | X | | X | | N | | | N | |
| <i>Anotylus inustus</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | X | N | N | X | N | B | |
| <i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | X | | N | X | X | B | |
| <i>Anotylus pumilus</i> (Erichson, 1839) | | | X | | | | | B | |
| <i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775) | X | X | X | | N | X | X | N | |
| <i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Anotylus speculifrons</i> (Kraatz, 1857) | H | N | | | N | | | N | |
| <i>Anotylus tetracarlinatus</i> (Block, 1799) | H | | X | | N | N | | B | |
| <i>Oxytelus laqueatus</i> (Marsham, 1802) | | X | | | N | | | | |
| <i>Oxytelus migrator</i> Fauvel, 1904 | | | | | N | | | | |
| <i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | | X | N | N | |
| <i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806 | | X | X | | | | | | |
| <i>Platystethus alutaceus</i> J. Thomson, 1861 | | | N | | | N | | | |
| <i>Platystethus arenarius</i> (Geoffroy, 1785) | | | | | N | | | B | |
| <i>Platystethus burlei</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1862 | | | N | | | | | | |
| <i>Platystethus cornutus cornutus</i> (Gravenhorst, 1802) | | X | X | | | | | B | |
| <i>Platystethus degener</i> Mulsant & Rey, 1878 | | | N | N | | N | | N | |
| <i>Platystethus nitens</i> (C.R. Sahlberg, 1832) | H | X | N | N | N | X | X | N | |
| <i>Platystethus spinosus</i> Erichson, 1840 | H | X | X | | | | | | |
| Planeustomini Jacquelin du Val, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Planeustomus cephalotes</i> (Erichson, 1840) | | X | | | | | | | |
| <i>Planeustomus elegantulus</i> (Kraatz, 1857) | | | X | | | | | | |
| Thinobiini J. Sahlberg, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Carpelimus bilineatus</i> Stephens, 1834 | | X | X | | | | | | |
| <i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | X | N | N | | | B | |
| <i>Carpelimus despectus</i> (Baudi di Selve, 1870) | | X | | | N | | | | |
| <i>Carpelimus exiguus</i> (Erichson, 1839) | | X | N | | | | | N | |
| <i>Carpelimus foveolatus</i> (C.R. Sahlberg, 1832) | | X | | | | | | | |
| <i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830) | | | X | | N | | | | |
| <i>Carpelimus nigrita anthracinus</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | X | N | | | | | | |
| <i>Carpelimus nitidus</i> (Baudi di Selve, 1848) | | | X | | | | | | |
| <i>Carpelimus obesus</i> (Kiesenwetter, 1844) | | | X | N | | | | N | |
| <i>Carpelimus politus politus</i> (Kiesenwetter, 1850) | | X | | | | | | B | |
| <i>Carpelimus pusillus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | | | | | |
| <i>Carpelimus rivularis</i> (Motschulsky, 1860) | H | X | | N | N | | | B | |
| <i>Thinodromus arcuatus</i> (Stephens, 1834) | | | | | | N | | N | |
| <i>Thinodromus hirticollis</i> Mulsant & Rey, 1878 | | X | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Scydmaeninae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Cephenniitae Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Cephenniini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Vit & Besuchet in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Cephennum apicale apicale</i> Reitter, 1882 [E] | X | | | | N | N | X | N | |
| <i>Cephennum romanum</i> W. Blattný & C. Blattný, 1914 [E] | X | | | | | | | B | |
| <i>Cephennum garganicum</i> Pace, 1977 [E] | X | | | | | | | | |
| Eutheini Casey, 1897 | | | | | | | | | |
| Vit in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Eutheia formicetorum</i> Reitter, 1882 | X | X | | | N | N | | N | |
| <i>Eutheia schaumii</i> Kiesenwetter, 1858 | H | N | | | | | | | |
| <i>Euthiconus conicicollis</i> (Fairmaire, 1855) | X | | | | | X | | N | |
| Scydmaenitae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Chevrolatiini Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| Vit in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Chevrolatia insignis</i> Jacquelin du Val, 1850 | H | X | X | | | | | | N |
| Cyrtoscydmini L.W. Schaufuss, 1889 | | | | | | | | | |
| Davies in Cat. Pal. Col., vol. 2, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Euconmus campestris</i> L.W. Schaufuss, 1866 | | B | | | | | | | N |
| <i>Euconmus claviger claviger</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) | | X | | | | | | | |
| <i>Euconmus denticornis</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) | | B | | | | | | | N |
| <i>Euconmus fimetarius</i> (Chaudoir, 1845) | X | X | | | | | | | N |
| <i>Euconmus hirticollis</i> (Illiger, 1798) | X | X | | | | | | | |
| <i>Euconmus intrusus intrusus</i> (Schaum, 1844) | | B | | | | | | | |
| <i>Euconmus italicus</i> Reitter, 1911 [E] | | | | | | N | | | |
| <i>Euconmus maklinii</i> (Mannerheim, 1844) | | X | | | | | | | |
| <i>Euconmus oblongus oblongus</i> (Sturm, 1838) | | | | N | N | N | | | N |
| <i>Euconmus pubicollis</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) | | | | N | N | N | | | |
| <i>Euconmus rutilipennis</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) | | | | | N | | | | |
| <i>Euconmus wetterhalli</i> (Gyllenhal, 1813) | X | X | | | | | | | |
| <i>Microscydmus minimus</i> (Chaudoir, 1845) | | | | | N | | | | |
| <i>Microscydmus nanus</i> (Schaum, 1844) | B | X | | | | X | B | B | |
| <i>Neuraphes angulatus</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) | H | | X | | | X | X | N | |
| <i>Neuraphes fiorii</i> Reitter, 1887 | X | N | | N | N | N | | | |
| <i>Neuraphes planiceps</i> Reitter, 1884 [E] | | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Neuraphes plicicollis plicicollis</i> (Reitter, 1880) | | | | | N | | | | |
| <i>Neuraphes rubicundus</i> (Schaum, 1841) | H? | | | | | | | | |
| <i>Neuraphes ruthenus</i> Machulka, 1925 | | | | | B | | | | |
| <i>Neuraphes stussineri</i> Reitter, 1891 [E] | | | | | | | X | | |
| <i>Neuraphes talparum</i> Lokay, 1920 | | | | | | | | | N |
| <i>Scydmoraphes angelinii</i> Castellini, 1987 [E] | | | | | B | N | N | | |
| <i>Scydmoraphes diutius</i> Castellini, 1987 [E] | | | B | B | B | B | B | B | |
| <i>Scydmoraphes geticus</i> (Saulcy, 1877) | | X | | | N | | | | |
| <i>Scydmoraphes helvolus</i> (Schaum, 1844) | | | | | N | N | X | N | |
| <i>Scydmoraphes leptocerus</i> (Reitter, 1882) | | | | B | B | | N | | |
| <i>Scydmoraphes panormitanus</i> (Ragusa, 1892) [E] | | | | | | | | | N |
| <i>Scydmoraphes romanus</i> Franz, 1961 [E] | | | | | | | | | N |
| <i>Scydmoraphes sparshalli</i> (Denny, 1825) | X | X | | | B | B | B | B | |
| <i>Scydmoraphes tarsalis</i> Machulka, 1930 [E] | | N | | | N | N | | B | |
| <i>Stenichnus apulicus</i> (Pic, 1902) [E] | | | N | | N | N | | B | |
| <i>Stenichnus damryi hilfi</i> Holdhaus, 1915 | H | | | | N | N | N | | |
| <i>Stenichnus egregius</i> Holdhaus, 1915 [E] | | | | | N | X | | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Staphylininae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Othiini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Atrecus affinis</i> (Paykull, 1789) | | | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Atrecus ardeanus</i> Ciceroni, 1990 [E] | | | | | B | B | B | | EN |
| <i>Atrecus longiceps</i> (Fauvel, 1873) | | | | | | N | | | LC |
| <i>Othius laeviusculus</i> Stephens, 1833 | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Othius lapidicola</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848 | N | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777) | H | | | N | N | N | | | |
| Staphylinini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Amblyopinina Seevers, 1944 | | | | | | | | | |
| <i>Heterothops binotatus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | | | | | | | |
| <i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860 | H | | | | | X | X | | |
| <i>Heterothops praeivius</i> Erichson, 1839 | | X | X | | | N | | N | |
| Philonthina Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Bisnius fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | | | | X | | B | |
| <i>Cafius xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806) | X | X | | | | | | | |
| <i>Erichsonius cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | B | | | | | |
| <i>Erichsonius signaticornis</i> (Mulsant & Rey, 1853) | | | | | | N | | | |
| <i>Erichsonius subopacus</i> (Hochhuth, 1851) | | X | | | | | | | |
| <i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835) | | X | | | | | | | |
| <i>Gabrius doderoi</i> Gridelli, 1920 | B | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Gabrius femoralis</i> (Hochhuth, 1851) | H | | | N | N | N | | | |
| <i>Gabrius nigrifulus</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati, 1846) | X | | | | | | X | | |
| <i>Gabrius sexualis</i> Smetana, 1954 | | | X | | N | X | | N | |
| <i>Gabrius splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Gabronthus maritimus</i> (Motschulsky, 1858) | X | X | | | N | N | | N | |
| <i>Neobisnius lathrobiooides</i> (Baudi di Selve, 1848) | | | X | B | | | | B | |
| <i>Neobisnius procerulus procerulus</i> (Gravenhorst, 1806) | | | X | | | | | | |
| <i>Orthidus cribratus</i> (Erichson, 1840) | X | X | | | | | | | |
| <i>Philonthus albipes</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | | | | | |
| <i>Philonthus atratus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | | X | | B | |
| <i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802) | H | N | | | | | | B | |
| <i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832 | H | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Philonthus confinis</i> A. Strand, 1941 | | | X | | N | | | N | |
| <i>Philonthus coprophilus</i> Jarrige, 1949 | | | X | | | X | X | | |
| <i>Philonthus corruscus</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | X | | | X | | | |
| <i>Philonthus cruentatus</i> (Gmelin, 1790) | | X | | | | | X | | |
| <i>Philonthus debilis</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | | N | N | N | X | B | |
| <i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | | N | N | X | X | | |
| <i>Philonthus dimidiatipennis</i> Erichson, 1840 | | | | | N | | | | |
| <i>Philonthus ebeninus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | | | | X | | | |
| <i>Philonthus fenestratus</i> Fauvel, 1872 | X | X | | | | X | X | | |
| <i>Philonthus frigidus</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848 | | | | | | X | | | |
| <i>Philonthus fumarius</i> (Gravenhorst, 1806) | | | X | | | X | | | |
| <i>Philonthus gagates</i> Mulsant & Rey, 1876 | | | | | | | X | | |
| <i>Philonthus intermedius</i> (Lacordaire, 1835) | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Philonthus jurgans</i> Tottenham, 1937 | | X | | N | | X | X | | |
| <i>Philonthus laminatus</i> (Creutzer, 1799) | X | | | | N | X | | B | |
| <i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832 | | X | | | | | | | |
| <i>Philonthus micans</i> (Gravenhorst, 1802) | H | X | X | N | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Philonthus nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Philonthus oblitus</i> Jarrige, 1951 | | B | | | | | | | |
| <i>Philonthus paganettii</i> Linke, 1915 [E] | | | | | | | X | B | |
| <i>Philonthus parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | X | | N | N | | | |
| <i>Philonthus politus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Philonthus punctus punctus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | N | | | | | |
| <i>Philonthus quisquiliarius quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810) | | N | X | B | N | N | X | N | |
| <i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874 | | | X | N | | X | X | B | |
| <i>Philonthus rubripennis</i> Stephens, 1832 | | | | | N | | | | |
| <i>Philonthus rufimanus rufimanus</i> Erichson, 1840 | | | | | N | | X | B | |
| <i>Philonthus sanguinolentus</i> (Gravenhorst, 1802) | | | X | | | | | | |
| <i>Philonthus spinipes kabardensis</i> (Bolov & Kryzhanovskij, 1969) | | | | | N | | | | |
| <i>Philonthus splendens splendens</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | | | | |
| <i>Philonthus succicola</i> C.G. Thomson, 1860 | | X | | N | N | | | B | |
| <i>Philonthus tenuicornis</i> Mulsant & Rey, 1853 | | X | | | | | | B | |
| <i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | X | | N | N | | B | |
| <i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789) | | | | | | X | X | | |
| <i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802) | H | N | | | | | | | |
| Quediina Kraatz, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Acylophorus glaberrimus</i> (Herbst, 1784) | | | X | | | | | | |
| <i>Euryporus aeneiventris</i> P.H. Lucas, 1849 | | | | | | | | B | |
| <i>Euryporus picipes</i> (Paykull, 1800) | X | | | | | | | | |
| <i>Quedius abietum</i> Kiesenwetter, 1858 | | | | | B | X | X | B | VU |
| <i>Quedius aetolicus</i> Kraatz, 1858 | | | | | | N | | | VU |
| <i>Quedius aspromontanus</i> Bernhauer, 1908 | X | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Quedius boops boops</i> (Gravenhorst, 1802) | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Quedius bruttius</i> Zanetti, 1977 [E] | | | | | | X | X | B | |
| <i>Quedius cinctus</i> (Paykull, 1790) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Quedius crassus</i> Fairmaire, 1860 | | | | | N | | | | |
| <i>Quedius cruentus</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Quedius curtippemis</i> Bernhauer, 1908 | B | | X | N | N | | | | |
| <i>Quedius curtus</i> Erichson, 1840 | | | | | | X | | | |
| <i>Quedius cyanescens</i> Mulsant & Rey, 1876 | | | | | | | | N | |
| <i>Quedius dilatatus</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | | | |
| <i>Quedius dubius dubius</i> (Heer, 1839) | | | | | | X | X | | |
| <i>Quedius fulgidus fulgidus</i> (Fabricius, 1792) | | | | B | B | X | | | |
| <i>Quedius fumatus</i> (Stephens, 1833) | H | X | | N | N | N | N | B | |
| <i>Quedius humeralis</i> Stephens, 1832 | B | | | | N | X | | N | |
| <i>Quedius invreae</i> Gridelli, 1924 | | | X | | N | | | | |
| <i>Quedius italicus</i> Gridelli, 1925 | | | | | | X | | N | |
| <i>Quedius latialis</i> Gridelli, 1924 [E] | X | | | | N | X | B | | |
| <i>Quedius latinus</i> Gridelli, 1938 | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Quedius levicollis</i> (Brullé, 1832) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Quedius lucidulus</i> Erichson, 1839 | | | | | | | | B | |
| <i>Quedius masoni</i> Zanetti, 1992 | B | B | | B | B | B | B | B | |
| <i>Quedius meridiocarpaticus</i> Smetana, 1958 | | | N | | | | | | |
| <i>Quedius mesomelinus silensis</i> Fiori, 1894 [E] | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Quedius molochinus</i> (Gravenhorst, 1806) | X | | | | | | | | |
| <i>Quedius nemoralis nemoralis</i> Baudi di Selve, 1848 | | X | | | | X | X | B | |
| <i>Quedius nigriceps</i> Kraatz, 1857 | | | | | N | N | X? | | |
| <i>Quedius nigrocaeruleus</i> Fauvel, 1876 | | | N | B | N | X | X | N | |
| <i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833) | | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Quedius obscuripennis</i> Bernhauer, 1901 | X | | | | N | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Quedius ochripennis</i> (Ménétriés, 1832) | H | X | | B | N | X | | N | |
| <i>Quedius pallipes</i> P.H. Lucas, 1846 | X | X | X | N | | N | | B | |
| <i>Quedius paradisiarius</i> (Heer, 1839) | | | | | | X | | | |
| <i>Quedius picipes</i> (Mannerheim, 1830) | H | | N | B | N | X | | B | |
| <i>Quedius reitteri</i> Gridelli, 1925 | | | | | | N | | | |
| <i>Quedius satanas</i> Bernhauer, 1899 | X | | | | | | | | |
| <i>Quedius scintillans</i> (Gravenhorst, 1806) | H | X | | | | X | X | B | |
| <i>Quedius semiaeneus</i> (Stephens, 1833) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Quedius semiobscurus</i> (Marsham, 1802) | H | | | | | N | | N | |
| <i>Quedius suturalis suturalis</i> Kiesenwetter, 1845 | | | | | N | N | | | |
| <i>Quedius truncicola</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856 | | | | | | X | | | VU |
| <i>Quedius umbrinus</i> Erichson, 1839 | | | | | N | | | | |
| Staphylinina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Creophilus maxillosus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | N | X | X | N | |
| <i>Dinothenarus flavocephalus flavocephalus</i> (Goeze, 1777) | | | | B | B | B | | | |
| <i>Dinothenarus fossor</i> (Scopoli, 1771) | | | | | | B | X | | |
| <i>Dinothenarus pubescens pubescens</i> (DeGeer, 1774) | | | | | | | B | | |
| <i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | | B | N | B | B | |
| <i>Ocypus fortunatarum</i> Wollaston, 1871 | B | | | | | | | B | |
| <i>Ocypus fulvipennis</i> Erichson, 1840 | B | | | | B | X | B | B | |
| <i>Ocypus italicus</i> (Aragona, 1830) [E] | H | X | N | B | B | X | X | B | |
| <i>Ocypus mus</i> (Brullé, 1832) | B | | | | B | N | X | B | |
| <i>Ocypus nitens nitens</i> (Schrank, 1781) | B | X | | N | N | B | B | B | |
| <i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764) | H | X | N | N | B | X | X | B | |
| <i>Ocypus ophthalmicus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763) | H | X | | N | B | X | CK | B | |
| <i>Ocypus picipennis picipennis</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | CK | X | | | |
| <i>Ocypus sericeicollis</i> (Ménétriés, 1832) | H | N | | B | B | B | B | B | |
| <i>Ontholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | B | X | X | N | |
| <i>Platydracus flavopunctatus</i> (Latreille, 1804) | | | | | CK | B | | | |
| <i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763) | | B | X | | | | | | |
| <i>Platydracus stercorarius stercorarius</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | CK | | | N | B | | | |
| <i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelms, 1798 | X | X | | | N | | | B | |
| <i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851 | | B | X | | | B | B | B | |
| <i>Tasgius falcifer falcifer</i> (Nordmann, 1837) | | X | | N | B | N | | B | |
| <i>Tasgius globulifer globulifer</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Tasgius morsitans</i> (P. Rossi, 1790) | X | B | | N | N | X | B | B | |
| <i>Tasgius pedator pedator</i> (Gravenhorst, 1802) | X | | | | | B | | B | |
| <i>Tasgius winkleri</i> (Bernhauer, 1906) | B | X | | B | | N | | B | |
| Tanygnathina Reitter, 1909 | | | | | | | | | |
| <i>Astrapaeus ulmi</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | | N | | | N | |
| <i>Quedionuchus plagiatius</i> (Mannerheim, 1843) | | | | | | N | | | LC |
| Xantholinini Erichson, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Gauropterus fulgidus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | N | | N | N | | B | |
| <i>Gyrohypnus angustatus</i> Stephens, 1833 | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Gyrohypnus fracticornis</i> (O.F. Müller, 1776) | | X | X | N | | X | X | | |
| <i>Gyrohypnus punctulatus</i> (Paykull, 1789) | H | | | | | X | | B | |
| <i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895) | | N | | | | | X | | LC |
| <i>Leptacinus batychnus</i> (Gyllenhal, 1827) | | X | X | | B | | | N | |
| <i>Leptacinus intermedius</i> Donisthorpe, 1936 | | N | X | | N | N | | N | |
| <i>Leptacinus othioides</i> Baudi di Selve, 1870 | X | | X | | | | | | |
| <i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833) | | | B | | | | | B | |
| <i>Megalinus glabratus</i> (Gravenhorst, 1802) | X | X | | | N | N | | B | |
| <i>Nudobius collaris</i> (Erichson, 1839) | | | | | | | X | | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827) | X | X | X | N | | N | | B | |
| <i>Stenistoderus cephalotes cephalotes</i> (Kraatz, 1858) | | | | | | | B | | |
| <i>Stenistoderus nothus</i> (Erichson, 1839) | H | X | X | | | | | N | |
| <i>Vulda garganica</i> (Bernhauer, 1908) [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Vulda sbordonii</i> Pace, 1979 [E] | X | | | | | | | | |
| <i>Xantholinus appennincola</i> Steel, 1946 | | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Xantholinus audrasi</i> Coiffait, 1956 | | | X | | | | | | |
| <i>Xantholinus cerrutii</i> Coiffait, 1964 [E] | | | | | | B | | | |
| <i>Xantholinus elegans</i> (A.G. Olivier, 1795) | | | | | | X | | | |
| <i>Xantholinus graecus</i> Kraatz, 1858 | | | | | | | | B | |
| <i>Xantholinus linearis linearis</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | | X | | N | N | | B | |
| <i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839 | | | X | B | | | | | |
| <i>Xantholinus proceroides</i> Coiffait, 1971 [E] | X | N | X | N | N | N | | B | |
| <i>Xantholinus rufipennis</i> Erichson, 1839 | B | | | | | | | B | |
| SCARABAEIFORMIA Crowson, 1960 | | | | | | | | | |
| SCARABAEOIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| GEOTRUPIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Bolboceratinae Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| Odonteini Shokhin, 2007 | | | | | | | | | |
| Král, Löbl & Nikolajev in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772) | | B | | | | | | | |
| Geotrupinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Enoplotrupini Paulian, 1945 | | | | | | | | | |
| Nikolajev, Král & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Typhaeus typhoeus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | | | X | X | B | |
| Geotrupini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Anoplotrupes stercorosus</i> (L.G. Scriba, 1791) | X | | | N | | | X | B | |
| <i>Geotrupes mutator</i> (Marsham, 1802) | | | | | | | | N | |
| <i>Geotrupes spiniger</i> (Marsham, 1802) | H | X | X | | N | X | X | N | |
| <i>Jekelius brullei brullei</i> (Jekel, 1866) | H | | | | | | | | |
| <i>Jekelius intermedius</i> (O.G. Costa, 1839) | B | X | | N | N | N | | B | |
| <i>Sericotrupes niger</i> (Marsham, 1802) | H | B | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Trypocopris pyrenaicus cyanicolor</i> (Capra, 1930) [E] | | | | B | N | N | X | | |
| <i>Trypocopris pyrenaicus splendens</i> (Heer, 1841) | H | | | | | | | | |
| <i>Trypocopris vernalis apenninicus</i> Mariani, 1958 [E] | | | | N | N | X | X | B | |
| TROGIDAE W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Troginae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Pittino & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Trox litoralis</i> Pittino, 1991 | | B | | | | | | | |
| <i>Trox niger</i> P. Rossi, 1792 | H | X | | | N | X | | N | |
| LUCANIDAE Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Aesalinae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Aesalini W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Bartolozzi, Sprecher-Uebersax & Bezděk, in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Aesalus scarabaeoides meridionalis</i> Bartolozzi, 1989 [E] | | B | | | | | | | CR |
| Sinodendriini LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758) | B | X | | N | B | X | X | B | LC |
| Lucaninae Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Dorcini Parry, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | B | CK | X | X | B | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Esymus merdarius</i> (Fabricius, 1775) | H | | | B | N | B | X | B | |
| <i>Esymus pusillus pusillus</i> (Herbst, 1789) | H | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Eudolus quadriguttatus</i> (Herbst, 1783) | B | X | | | | N | | B | |
| <i>Euheptaulacus carinatus carinatus</i> (Germar, 1824) | X | | | | N | X | X | B | |
| <i>Euorodalus paracoenosus</i> (Balthasar & Hrubant, 1960) | X | | | | | | X | B | |
| <i>Euorodalus tersus</i> (Erichson, 1848) | | X | | | | | | B | |
| <i>Labarrus lividus</i> (A.G. Olivier, 1789) | X | X | | | | CK | | B | |
| <i>Limarus zenkeri</i> (Germar, 1813) | X | | | B | | X | X | B | |
| <i>Liothorax niger</i> (Illiger, 1798) | | | | | B | X | X | N | |
| <i>Loraphodius suarius</i> (Faldermann, 1835) | | | | | | N | | | |
| <i>Mecynodes striatulus</i> (Waltl, 1835) | N | | | | | | | B | |
| <i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799) | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790) | H | | N | N | N | N | X | B | |
| <i>Melinopterus reyi</i> (Reitter, 1892) | | | | | B | B | | B | |
| <i>Melinopterus sphaelatus sphaelatus</i> (Panzer, 1798) | | | | | N | X | X | B | |
| <i>Melinopterus stolzi</i> (Reitter, 1906) | | | | B | N | | | | |
| <i>Neagolius schlumbergeri samniticus</i> (J. Daniel, 1902) [E] | | | | | | X | | | |
| <i>Nialus varians</i> (Duftschmid, 1805) | H | X | X | N | | | | B | |
| <i>Nimbus contaminatus</i> (Herbst, 1783) | | | | N | | X | X | | |
| <i>Nimbus johnsoni</i> (Baraud, 1976) | | | | | N | | | N | |
| <i>Nimbus obliteratedus</i> (Panzer, 1823) | H | | | N | N | N | X | B | |
| <i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Oxyomus sylvestris</i> (Scopoli, 1763) | | N | | | | | | B | |
| <i>Parammoecius corvinus</i> (Erichson, 1848) | | | | N | | X | X | N | |
| <i>Phalacrothothus biguttatus</i> (Germar, 1824) | | B | | B | | | | B | |
| <i>Phalacrothothus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1760) | X | | | B | B | | X | B | |
| <i>Plagiogonus arenarius</i> (A.G. Olivier, 1789) | B | | | | | | | B | |
| <i>Planolinoides borealis</i> (Gyllenhal, 1827) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Planolinus fasciatus</i> (A.G. Olivier, 1789) | H | | | B | | X | X | | |
| <i>Pseudacrossus suffertus</i> (A. Schmidt, 1916) | B | | | | B | | X | B | |
| <i>Sigorus porcus</i> (Fabricius, 1792) | | | | | N | X | X | B | |
| <i>Subrinus sturmi</i> (Harold, 1870) | H | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Teuchestes fossor</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | X | X | | |
| <i>Trichonotulus serofa</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | | N | | | B | |
| <i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798) | H | | | B | N | X | N | B | |
| Psammodiini Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| Psammodiina Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| Racovič, Král & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Brindalus porcicollis</i> (Illiger, 1803) | X | X | | | | | | N | |
| <i>Psammodius asper</i> (Fabricius, 1775) | | X | | | | | | | |
| <i>Psammodius basalis</i> (Mulsant & Rey, 1870) | X | | | | | | | B | |
| <i>Psammodius laevipennis</i> A. Costa, 1844 | | X | | | | | | B | |
| <i>Psammodius nocturnus</i> Reitter, 1892 | X | | | | | | | | |
| <i>Psammodius pierottii</i> Pittino, 1979 | B | X | | | | | | | |
| Rhyssemina Pittino & Mariani, 1986 | | | | | | | | | |
| <i>Pleurophorus caesus</i> (Panzer, 1796) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Pleurophorus mediterranicus</i> Pittino & Mariani, 1986 | | B | | | | | | | |
| <i>Rhyssemus annaedicatus</i> Pierotti, 1980 | | B | | | B | | | N | |
| <i>Rhyssemus germanus</i> (Linnaeus, 1767) s.l. | N | X | | | | | | N | |
| <i>Rhyssemus parallelus</i> Reitter, 1892 | X | X | | | | | | N | |
| <i>Rhyssemus sulcatus</i> (A.G. Olivier, 1789) | B | | | | | | | | |
| <i>Trichiorhyssemus dalmatinus</i> Petrovitz, 1967 | | B | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Scarabaeinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Coprini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Král & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Copris hispanus cavolinii</i> (V. Petagna, 1792) | X | X | X | | N | | | N | |
| <i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | N | X | | N | |
| <i>Copris umbilicatus</i> Abeille de Perrin, 1901 | B | | | | N | X | | | |
| Gymnopleurini Lacordaire, 1856 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Gymnopleurus flagellatus flagellatus</i> (Fabricius, 1787) | | B | | | | | X | B | |
| <i>Gymnopleurus geoffroyi</i> (Fuessly, 1775) | X | X | | N | | X | | | |
| <i>Gymnopleurus mopsus mopsus</i> (Pallas, 1781) | X | X | | | N | X | | B | |
| <i>Gymnopleurus sturmii</i> (W.S. Macleay, 1821) | H | X | N | | N | X | | B | |
| Oniticellini H.J. Kolbe, 1905 | | | | | | | | | |
| Oniticellina H.J. Kolbe, 1905 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Euoniticellus intermedius</i> (Reiche, 1850) | | | | | | | X | | |
| <i>Euoniticellus pallipes</i> (Fabricius, 1781) | | X | | | N | | | N | |
| Onitini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Bubas bison</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | | | | | N | |
| <i>Cheironitis furcifera</i> (P. Rossi, 1792) | B | B | | N | N | X | | B | |
| <i>Cheironitis irroratus</i> (P. Rossi, 1790) | | X | | | | | B | B | |
| Onthophagini Burmeister, 1846 | | | | | | | | | |
| Ziani & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Euonthophagus amyntas amyntas</i> (A.G. Olivier, 1789) | H | | | | N | X | | B | |
| <i>Onthophagus andalusicus andalusicus</i> Waltl, 1835 | B | B | | | | | | B | |
| <i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783) | B | X | | | N | N | | | |
| <i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyßler, 1790) | H | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Onthophagus furcatus</i> (Fabricius, 1781) | B | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Onthophagus grossepunctatus</i> Reitter, 1905 | H | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763) | | B | | | | X | X | B | |
| <i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953 | | X | | B | N | X | X | | |
| <i>Onthophagus lemur</i> (Fabricius, 1781) | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Onthophagus maki</i> (Illiger, 1803) | X | | | | N | X | | B | |
| <i>Onthophagus opacicollis</i> Reitter, 1892 | B | X | | N | N | X | X | CK | |
| <i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | | | | | B | |
| <i>Onthophagus ruficapillus</i> Brullé, 1832 | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Onthophagus semicornis</i> (Panzer, 1798) | | | | | B | | | | |
| <i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759) | B | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781) | H | X | | N | | X | X | | |
| Scarabacini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Král & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Ateuchetus semipunctatus</i> (Fabricius, 1792) | X | X | | | | X | X | B | |
| <i>Ateuchetus variolosus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Scarabaeus sacer</i> Linnaeus, 1758 | H | X | | | | | | B | |
| <i>Scarabaeus typhon</i> (Fischer von Waldheim, 1823) | H | X | | N | B | X | X | B | |
| Sisyphini Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Sisyphus schaefferi schaefferi</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Orphninae Erichson, 1847 | | | | | | | | | |
| Orphnini Erichson, 1847 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Chaetonyx robustus italicus</i> Mariani, 1946 [E] | H | | | B | | | X | | |
| Melolonthinae Leach, 1819 | | | | | | | | | |
| Hopliini Latreille, 1829 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Hoplia argentea</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | X | | | | N | X | X | | |
| <i>Hoplia meridiana</i> Uliana, Liberto & Leo, 2017 [E] | | X | | | | | | | |
| <i>Hoplia minuta</i> (Panzer, 1789) [E] | | X | | N | N | X | | B | |
| <i>Hoplia paganettii</i> G. Müller, 1907 [E] | | | | | | | | B | |
| Melolonthini Leach, 1819 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Anoxia matutinalis matutinalis</i> Laporte, 1832 | X | X | X | | | N | X | B | |
| <i>Anoxia orientalis</i> (Krynicky, 1832) | | | | | | | | B | |
| <i>Anoxia scutellaris scutellaris</i> Mulsant, 1842 | | B | | | B | X | | | |
| <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | B | |
| <i>Melolontha pectoralis</i> Megerle von Mühlfeld, 1812 | H | | X | B | | N | X | B | |
| <i>Polyphylla fullo fullo</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | B | X | | B | |
| Pachypodini Erichson, 1840 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Pachypus candidae</i> (V. Petagna, 1787) | | X | | | | | | B | |
| Rhizotrogini Burmeister, 1855 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Amadotrogus quercanum</i> (Burmeister, 1855) | | B | | | | | X | | |
| <i>Amphimallon assimile</i> (Herbst, 1790) | H | X | | | | | X | N | |
| <i>Amphimallon fuscum</i> (Scopoli, 1786) | | | | | B | X | X | | |
| <i>Amphimallon javeti</i> Stierlin, 1864 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Amphimallon ochraceum</i> Knoch, 1801 | | | | | | N | B | | |
| <i>Amphimallon pseudomajale</i> Sabatinelli, 1977 [E] | | | | | | | X | | |
| <i>Amphimallon solstitialis solstitialis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Amphimallon vitalei</i> Luigioni, 1932 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Firminus ciliatus vexillis</i> (Reitter, 1902) [E] | H | X | | | | | X | | |
| <i>Haplidia etrusca</i> (Kraatz, 1882) [E] | X | X | | | | | | | |
| <i>Haplidia transversa transversa</i> (Fabricius, 1801) | X | | | | | | | | |
| <i>Holochelus fraxinicola</i> (Hagenbach, 1825) | H | | | | | | | | |
| <i>Rhizotrogus aestivus</i> (A.G. Olivier, 1789) | | | | | N | X | X | B | |
| Sericini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Ahrens & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Omalopia ruricola nicolasi</i> (Baraud, 1965) | | | | | N | X | X | | |
| <i>Triodontella nitidula</i> (P. Rossi, 1790) | | X | | | N | | | B | |
| Rutelinae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Zorn & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Anisoplia monticola marginata</i> Kraatz, 1883 [E] | | | | | | | X | B | |
| <i>Anisoplia monticola monticola</i> Erichson, 1847 | | B | | N | N | X | | | |
| <i>Anisoplia sabatinellii</i> Baraud, 1991 [E] | B | | | | | | B | | |
| <i>Anisoplia tempestiva</i> Erichson, 1847 | H | X | | N | | X | X | | |
| <i>Anomala ausonia</i> Erichson, 1847 | X | X | | | N | | | B | |
| <i>Exomala leonii</i> (Luigioni, 1932) [E] | | | | | | B | | | |
| <i>Mimela junii calabrica</i> Machatschke, 1957 [E] | | X | | B | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Dynastinae W.S. Macleay, 1819 | | | | | | | | | |
| Oryctini Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| Krell & Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Oryctes nasicornis corniculatus</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833 | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| Pentodontini Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| <i>Calicnemis latreillii</i> Laporte, 1832 | | B | | | | | | B | VU |
| <i>Pentodon bidens punctatus</i> (Villers, 1789) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllognathus excavatus</i> (Forster, 1771) | B | X | | | | N | | N | |
| Cetoniinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Cetoniini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Cetoniina Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Bezděk in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Aethiessa floralis squamosa</i> (Gory & Percheron, 1833) [E] | | | | | | | | B | NT |
| <i>Cetonia aurata pisana</i> Heer, 1841 | H | X | X | B | N | X | X | B | LC |
| <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Protaetia affinis affinis</i> (Andersch, 1797) | X | B | | | | | | | LC |
| <i>Protaetia cuprea cuprea</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | | N | | X | B | LC |
| <i>Protaetia morio morio</i> (Fabricius, 1781) | H | X | X | N | N | X | | | |
| <i>Protaetia speciosissima</i> (Scopoli, 1786) | X | | | | N | | | N | LC |
| <i>Protaetia squamosa crassicollis</i> Burmeister, 1842 [E] | B | | | | | | | B | VU |
| <i>Tropinota hirta hirta</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Tropinota squalida squalida</i> (Scopoli, 1783) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| Osmodermatini Schenkling, 1922 | | | | | | | | | |
| <i>Osmoderma italicum</i> Sparacio, 2001 [E] | | | | | | B | B | B | CK EN |
| Trichiini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Trichiina Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Gnorimus nobilis nobilis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | N | X | X | B | NT |
| <i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | | B | N | B | | VU |
| <i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | X | | | LC |
| <i>Trichius gallicus gallicus</i> Dejean, 1821 | | | | N | N | X | X | B | LC |
| Valgini Mulsant, 1842 | | | | | | | | | |
| <i>Valgus hemipterus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | B | N | X | X | N | LC |
| ELATERIFORMIA Crowson, 1960 | | | | | | | | | |
| SCIRTOIDEA Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| EUCINETIDAE Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818) | | X | X | | | X | X | N | |
| <i>Nycteus hopffgarteni prospector</i> Vit, 1985 | | | | | | | B | B | |
| CLAMBIDAE Fischer von Waldheim, 1821 | | | | | | | | | |
| Calyptomerinae Crowson, 1955 | | | | | | | | | |
| Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Calyptomerus dubius</i> (Marsham, 1802) | H | X | | | | | X | B | LC |
| Clambinae Fischer von Waldheim, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Clambus caucasicus</i> Endrödy-Younga, 1960 | | | | | | N | | | DD |
| <i>Clambus dux dux</i> Endrödy-Younga, 1960 | | X | X | N | | N | | | LC |
| <i>Clambus hayekae</i> Endrödy-Younga, 1960 | | N | | | | | | | DD |
| <i>Clambus minutus complicans</i> Wollaston, 1864 | | | | | | | | B | LC |
| <i>Clambus minutus minutus</i> (Sturm, 1807) | H | X | X | N | | N | X | | LC |
| <i>Clambus nigrellus</i> Reitter, 1914 | | | | | | | | N | DD |
| <i>Clambus nigriclavus</i> Stephens, 1835 | | | X | | | N | | | DD |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Clambus pallidulus pallidulus</i> Reitter, 1911 | X | N | | | N | X | | B | LC |
| <i>Clambus pubescens</i> L. Redtenbacher, 1847 | | | X | | | | | | LC |
| <i>Clambus punctulum</i> (L. Beck, 1817) | X | N | | | N | N | | | LC |
| <i>Loricaster testaceus pumilus</i> Reitter, 1884 | X | N | | N | N | X | X | N | LC |
| SCIRTIDAE Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Scirtinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Klausnitzer in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Contacyphon coarctatus</i> (Paykull, 1799) | H | X | | N | N | N | X | N | |
| <i>Contacyphon laevipennis</i> (Tournier, 1868) | | X | N | N | N | | | | |
| <i>Contacyphon ochraceus ochraceus</i> (Stephens, 1830) | | N | | N | | N | | N | |
| <i>Contacyphon padi</i> (Linnaeus, 1758) | H | N | X | | | | | | |
| <i>Contacyphon palmi</i> (Nyholm, 1948) | | | | | N | X | | N | |
| <i>Contacyphon palustris</i> (C.G. Thomson, 1855) | | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Contacyphon unguiculatus</i> Nyholm, 1949 [E] | | | X | | | X | X | | |
| <i>Contacyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787) | H | | | | | | | | |
| <i>Elodes angelinii</i> (Klausnitzer, 1987) [E] | | | | | B | B | X | | |
| <i>Elodes denticulatus</i> (Klausnitzer, 1973) [E] | | | | N | N | N | X | N | |
| <i>Elodes minutus</i> (Linnaeus, 1767) | | X | | | | | | | |
| <i>Hydrocyphon deflexicollis</i> (P.W.J. Müller, 1821) | | | | | | | | N | |
| <i>Hydrocyphon hydrocyphonoides</i> (Tournier, 1868) | | N | | | | | | B | |
| <i>Microcara pilosula</i> Reitter, 1911 [E] | | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Odeles marginata</i> (Fabricius, 1798) | | | | | | | X | | |
| <i>Prionocyphon serricornis</i> (P.W.J. Müller, 1821) | | N | | | N | | | | NT |
| <i>Scirtes hemisphaericus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | | | | |
| <i>Scirtes orbicularis</i> (Panzer, 1793) | H | | | | | | | | |
| DASCILLOIDEA Guérin-Ménéville, 1843 | | | | | | | | | |
| DASCILLIDAE Guérin-Ménéville, 1843 | | | | | | | | | |
| Dascillinae Guérin-Ménéville, 1843 | | | | | | | | | |
| Dascillini Guérin-Ménéville, 1843 | | | | | | | | | |
| Hájek in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Dascillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758) | | B | | | B | X | X | B | |
| BUPRESTOIDEA Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| BUPRESTIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Polycestinae Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Acmaeoderini Kerremans, 1893 | | | | | | | | | |
| Volkovitch in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Acmaeodera bipunctata bipunctata</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | | X | X | CK | LC |
| <i>Acmaeodera crinita crinita</i> Gory, 1840 | | X | | | B | B | CK | | EN |
| <i>Acmaeodera octodecimguttata quattuordecimpunctata</i> (Villers, 1789) | | | | | B | B | CK | | VU |
| <i>Acmaeodera pilosellae pilosellae</i> (Bonelli, 1812) | H | X | | | B | X | X | B | LC |
| <i>Acmaeodera quadrifasciata quadrifasciata</i> (P. Rossi, 1790) | | B | | | B | X | | | LC |
| <i>Acmaeodera tassii</i> Schaefer, 1965 [E] | X | | | | B | X | X | | VU |
| <i>Acmaeoderella adpersula adpersula</i> (Illiger, 1803) | X | X | | | B | B | B | B | LC |
| <i>Acmaeoderella circassica</i> (Reitter, 1890) | B | B | | | | B | B | B | |
| <i>Acmaeoderella discoidea</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | N | N | B | X | | |
| <i>Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | H | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Acmaeoderella lanuginosa lanuginosa</i> (Gyllenhal, 1817) | ! | X | | | | ! | | B | |
| <i>Acmaeoderella perroti franzinii</i> Curletti & Magnani, 1987 | | B | | | N | ! | | N | |
| <i>Acmaeoderella virgulata</i> (Illiger, 1803) | H | X | | | | N | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Ptosimini Kerremans, 1903 | | | | | | | | | |
| <i>Ptosima undecimmaculata undecimmaculata</i> (Herbst, 1784) | H | X | | B | B | X | | B | LC |
| Chrysochroinae Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Chalcophorini Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Chalcophora intermedia intermedia</i> (Rey, 1890) | | | | | | | X | | EN |
| <i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Chalcophorella fabricii</i> (P. Rossi, 1794) | B | B | | B | B | B | B | B | VU |
| Dicercini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Capnodis cariosa cariosa</i> (Pallas, 1776) | H | X | | | | B | | B | LC |
| <i>Capnodis miliaris miliaris</i> (Klug, 1829) | | X | | | | B | B | B | VU |
| <i>Capnodis tenebricosa tenebricosa</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | | | B | B | | N | |
| <i>Capnodis tenebrionis</i> (Linnaeus, 1760) | H | X | X | N | B | B | | N | LC |
| <i>Cyphosoma euphraticum insulare</i> (Kiesenwetter, 1858) | | B | | | | | | | NT |
| <i>Dicerca aenea aenea</i> (Linnaeus, 1760) | X | X | | | B | N | B | B | LC |
| <i>Dicerca alni</i> (Fischer von Waldheim, 1824) | X | B | | B | ! | X | X | B | NT |
| <i>Dicerca herolinensis</i> (Herbst, 1779) | | B | | | | | | | NT |
| <i>Perotis lugubris lugubris</i> (Fabricius, 1777) | H | | | | | | | | LC |
| <i>Perotis lugubris meridionalis</i> Izzillo & Sparacio, 2011 [E] | | B | | | | | | | NT |
| Poecilnotini Jakobson, 1913 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Lamprodila decipiens decipiens</i> (Gebler, 1847) | | B | | | B | B | | | LC |
| <i>Lamprodila festiva festiva</i> (Linnaeus, 1767) | | B | | | | | | B | LC |
| <i>Lamprodila mirifica mirifica</i> (Mulsant, 1855) | | X | | | B | | | B | LC |
| <i>Lamprodila solieri</i> (Laporte & Gory, 1837) | | X | | | | | | | CR |
| <i>Poecilnota variolosa variolosa</i> (Paykull, 1799) | | X | | | | B | X | | LC |
| Sphenopterini Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Kalashian in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Sphenoptera antiqua antiqua</i> (Illiger, 1803) | | B | | | ! | X | B | | |
| <i>Sphenoptera barbarica</i> (Gmelin, 1790) | | B | | | | B | B | B | |
| <i>Sphenoptera gemmata gemmata</i> (A.G. Olivier, 1790) | | B | | | B | B | | | |
| <i>Sphenoptera laportei</i> E. Saunders, 1871 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Sphenoptera rauca</i> (Fabricius, 1787) | | B | | | | B | | B | |
| Buprestinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Anthaxiini Gory & Laporte, 1839 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Anthaxia anatolica anatolica</i> Chevrolat, 1838 | X | X | | | | N | | | |
| <i>Anthaxia cichorii</i> (A.G. Olivier, 1790) | | B | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia confusa confusa</i> Gory, 1841 | B | B | | | B | | X | N | LC |
| <i>Anthaxia croesus</i> (Villers, 1789) | H | B | | | B | X | | B | LC |
| <i>Anthaxia cyanescens</i> Gory, 1841 | | B | | | B | X | | | LC |
| <i>Anthaxia dimidiata</i> (Thunberg, 1789) | H | X | | | | N | | B | LC |
| <i>Anthaxia fulgurans</i> (Schränk, 1789) | | B | | B | B | X | X | N | LC |
| <i>Anthaxia godeti</i> Gory & Laporte, 1839 | | | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia hackeri</i> J. Frivaldszky, 1884 | | B | | | B | | | | CR |
| <i>Anthaxia helvetica apennina</i> Obenberger, 1938 [E] | | | | | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia hungarica hungarica</i> (Scopoli, 1772) | H | X | X | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia hypomelaena</i> (Illiger, 1803) | X | B | N | B | B | X | | N | |
| <i>Anthaxia istriana</i> Rosenhauer, 1847 | | | | | | B | X | | LC |
| <i>Anthaxia kochi</i> Obenberger, 1938 [E] | | | | | | B | X | X | B |
| <i>Anthaxia liae</i> Gobbi, 1983 [E] | | | | | ! | B | X | B | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Anthaxia lucens</i> Küster, 1852 | H | | | | | B | | B | LC |
| <i>Anthaxia manca</i> (Linnaeus, 1767) | X | B | | | B | | B | | LC |
| <i>Anthaxia mendizabali</i> Cobos, 1965 | X | B | | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia millefolii polychloros</i> Abeille de Perrin, 1894 | H | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia oberthuri</i> Schaefer, 1938 | X | | | | B | | B | | EN |
| <i>Anthaxia praeclara praeclara</i> Mannerheim, 1837 | B | | | | | | | | VU |
| <i>Anthaxia salicis salicis</i> (Fabricius, 1777) | X | | | | | B | | | LC |
| <i>Anthaxia scylla</i> Levey, 1985 | | | | | | X | | | LC |
| <i>Anthaxia semicuprea</i> Küster, 1851 | H | X | | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia senicula senicula</i> (Schränk, 1789) | B | B | | | B | | | | NT |
| <i>Anthaxia sepulchralis sepulchralis</i> (Fabricius, 1801) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Anthaxia suzannae</i> Théry, 1942 | ! | | | | | | | | LC |
| <i>Anthaxia thalassophila thalassophila</i> Abeille de Perrin, 1900 | X | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Anthaxia umbellatarum umbellatarum</i> (Fabricius, 1787) | H | X | N | B | B | B | B | B | LC |
| Buprestini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Buprestis cupressi</i> Germar, 1836 | B | X | | | | | | | LC |
| <i>Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis</i> Herbst, 1780 | | B | | | | X | X | | LC |
| <i>Buprestis humeralis</i> Klug, 1829 | | B | | | | | | | EN |
| <i>Buprestis novemmaculata novemmaculata</i> Linnaeus, 1767 | X | | | | | X | X | B | LC |
| <i>Buprestis octoguttata octoguttata</i> Linnaeus, 1758 | | | | | B | X | | | LC |
| <i>Buprestis splendens splendens</i> Fabricius, 1775 | | | | | | X | | | EN |
| <i>Eurythyrea austriaca</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | N | X | X | B | VU |
| <i>Eurythyrea micans</i> (Fabricius, 1792) | | X | | | | | B | B | LC |
| <i>Eurythyrea quercus</i> (Herbst, 1780) | | | | | | | | B | CR |
| Chrysobothrini Gory & Laporte, 1938 | | | | | | | | | |
| <i>Chrysobothris affinis affinis</i> (Fabricius, 1794) | X | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Chrysobothris chrysostigma chrysostigma</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | B | | | LC |
| <i>Chrysobothris solieri</i> Gory & Laporte, 1837 | B | B | | | | B | X | | LC |
| Melanophilini Bedel, 1921 | | | | | | | | | |
| <i>Melanophila acuminata</i> (DeGeer, 1774) | | | | | | | X | | CR |
| <i>Melanophila cuspidata</i> (Klug, 1829) | B | X | | | ! | | B | | LC |
| <i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | | X | | NT |
| <i>Phaenops knoteki ochsi</i> Schaefer, 1947 | | | | | | X | B | B | VU |
| <i>Trachypteris picta decostigma</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | | | CK LC |
| Agrilinae Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Agrilini Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Agrilina Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Jendek in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Agrilus albogularis artemisiae</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | B | | | | B | B | | |
| <i>Agrilus albomarginatus</i> A. Fiori, 1906 | B | | | | | ! | | B | LC |
| <i>Agrilus angustulus angustulus</i> (Illiger, 1803) [E] | X | X | X | B | B | X | X | N | LC |
| <i>Agrilus antiquus croaticus</i> Abeille de Perrin, 1897 | | | | | | B | X | | LC |
| <i>Agrilus ater</i> (Linnaeus, 1767) | | X | | | | B | B | | LC |
| <i>Agrilus auricollis</i> Kiesenwetter, 1857 | | B | | | | | | | LC |
| <i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777) | CK | N | | | | B | X | | LC |
| <i>Agrilus convexicollis</i> L. Redtenbacher, 1847 | H | X | X | B | ! | X | | | LC |
| <i>Agrilus cuprescens</i> (Ménétriés, 1832) | X | B | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Agrilus cyanescens italicus</i> Obenberger, 1920 [E] | | B | | | B | | | | LC |
| <i>Agrilus derasofasciatus</i> Lacordaire, 1835 | B | B | | | B | | | | LC |
| <i>Agrilus graecus</i> Obenberger, 1916 | | | | | B | B | | | DD |
| <i>Agrilus graminis</i> Kiesenwetter, 1857 | B | B | | B | B | X | X | B | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Agrilus hastulifer</i> (Ratzeburg, 1837) | B | | | N | | X | X | | LC |
| <i>Agrilus hyperici</i> (Creutzer, 1799) | H | B | B | B | B | X | X | N | |
| <i>Agrilus integerrimus</i> (Ratzeburg, 1837) | | | | | B | X | | B | |
| <i>Agrilus laticornis</i> (Illiger, 1803) | H | B | | B | B | B | B | | LC |
| <i>Agrilus lineola lineola</i> Kiesenwetter, 1857 | X | X | | | N | | | N | LC |
| <i>Agrilus marozzini</i> Gobbi, 1974 | X | X | | | B | | | | LC |
| <i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857 | X | X | | | B | B | X | | LC |
| <i>Agrilus olivicolor</i> Kiesenwetter, 1857 | | B | | | B | B | X | B | LC |
| <i>Agrilus paganettii</i> Obenberger, 1913 [E] | | B | | | | | | B | |
| <i>Agrilus pratensis</i> (Ratzeburg, 1837) | | B | | | | N | X | B | LC |
| <i>Agrilus relegatus alexeevi</i> Bellamy, 1998 | B | | | | | | | | LC |
| <i>Agrilus roscidus</i> Kiesenwetter, 1857 | H | X | | N | B | B | X | B | LC |
| <i>Agrilus sinuatus sinuatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | | | | | | | | LC |
| <i>Agrilus solieri solieri</i> Gory & Laporte, 1837 | | B | | | B | B | | | |
| <i>Agrilus suvorovi populneus</i> Schaefer, 1946 | | B | | | | B | B | B | LC |
| <i>Agrilus viridicaerulans rubi</i> Schaefer, 1937 | B | X | | B | B | X | B | B | |
| <i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758) | B | B | | N | B | X | X | B | LC |
| Aphanisticini Jacquelin du Val, 1859 | | | | | | | | | |
| Aphanisticina Jacquelin du Val, 1859 | | | | | | | | | |
| Kalashian & Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Aphanisticus angustatus</i> P.H. Lucas, 1846 | X | X | X | N | | N | B | B | |
| <i>Aphanisticus elongatus elongatus</i> A. Villa & G.B. Villa, 1835 | | | X | N | B | X | | | |
| <i>Aphanisticus emarginatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | X | N | B | B | | | | |
| <i>Aphanisticus pygmaeus</i> P.H. Lucas, 1849 | | X | | | B | | | | |
| <i>Cylindromorphus dalmatinus</i> Csiki, 1915 | B | B | | | B | | | | |
| <i>Cylindromorphus gallicus angelinii</i> Curletti, 1990 [E] | | B | | | N | B | | | |
| Coraebini Bedel, 1921 | | | | | | | | | |
| Amorphosomatina Majer, 2000 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Coraebus elatus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | B | B | X | X | N | |
| <i>Coraebus fasciatus</i> (Villers, 1789) | X | B | | | B | | | B | LC |
| <i>Coraebus rubi</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Meliboeus amethystinus amethystinus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | B | | | B | N | X | B | |
| <i>Meliboeus episcopalis</i> (Mannerheim, 1837) | X | X | | B | | B | | B | |
| <i>Meliboeus fulgidicollis</i> (P.H. Lucas, 1846) | X | | | | B | B | X | B | LC |
| <i>Meliboeus graminis graminis</i> (Panzer, 1789) | | X | | | B | B | X | B | |
| <i>Meliboeus parvulus</i> (Küster, 1852) | | B | X | N | B | X | X | B | |
| Tracheini Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Pachyschelina Böving & Craighead, 1931 | | | | | | | | | |
| Kubán in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Habroloma nanum</i> (Paykull, 1799) | | B | | | | | | | |
| <i>Habroloma triangulare</i> (Lacordaire, 1835) | | B | | | | | | | |
| <i>Trachys menthae</i> Bedel, 1921 | X | | | B | | X | | B | |
| <i>Trachys minutus minutus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Trachys quercicola</i> Marseul, 1871 | | | X | | | B | | | |
| <i>Trachys troglodytes</i> Gyllenhal, 1817 | H | X | X | B | B | ! | B | B | |
| <i>Trachys troglodytiformis</i> Obenberger, 1918 | B | X | | B | B | B | B | B | |
| BYRRHOIDEA Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| BYRRHIDAE Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Byrrhinae Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Simplocariini Mulsant & Rey, 1869 | | | | | | | | | |
| Jäger & Pütz in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Simplocaria semistriata</i> (Fabricius, 1794) | | | | | N | | | | |
| Byrrhini Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| <i>Byrrhus arietinus arietinus</i> Steffahny, 1842 | X | | | | | | | | |
| <i>Byrrhus numidicus</i> Normand, 1935 | | | | | | B | | B | |
| <i>Byrrhus pustulatus pustulatus</i> (Forster, 1771) | | | | | | X | X | | |
| <i>Byrrhus pilula</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| <i>Curimus lariensis</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1833) | | | | | | N | | | DD |
| <i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771) | | | | | | | N | | |
| Syncalyptinae Mulsant & Rey, 1869 | | | | | | | | | |
| Syncalyptini Mulsant & Rey, 1869 | | | | | | | | | |
| <i>Curimopsis maritima maritima</i> (Marsham, 1802) | H | N | | | N | N | | N | |
| <i>Curimopsis paleata</i> (Erichson, 1846) | | | N | | | N | | | |
| ELMIDAE Curtis, 1830 | | | | | | | | | |
| Elminae Curtis, 1830 | | | | | | | | | |
| Elmini Curtis, 1830 | | | | | | | | | |
| Elmina Curtis, 1830 | | | | | | | | | |
| Jäch & Kodada in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Elmis aenea</i> (P.W.J. Müller, 1806) | | | | | | N | B | CK | |
| <i>Elmis maugetii maugetii</i> Latreille, 1802 | | | | N | CK | B | B | B | |
| <i>Elmis rioloides</i> (Kuwert, 1890) | | | | | CK | | | B | |
| <i>Esolus angustatus</i> (P.W.J. Müller, 1821) | | | | | CK | B | X | ! | |
| <i>Esolus berthelemyi</i> Olmi, 1975 | | | X | | B | B | B | B | |
| <i>Esolus parallelepipedus</i> (P.W.J. Müller, 1806) | | | | | | | B | | |
| <i>Limnius intermedius</i> Fairmaire, 1881 | | | | | | | | B | |
| <i>Limnius opacus opacus</i> P.W.J. Müller, 1806 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Limnius perrisi perrisi</i> (Dufour, 1843) | | | | N | | X | X | B | |
| <i>Oulimnius tuberculatus</i> (P.W.J. Müller, 1806) | | | | | | CK | | | |
| <i>Riolus cupreus</i> (P.W.J. Müller, 1806) | | | | | CK | B | | | |
| <i>Riolus subviolaceus</i> (P.W.J. Müller, 1817) | | | | | | X | X | | |
| DRYOPIDAE Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Kodada & Jäch in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Dryops algiricus</i> (P.H. Lucas, 1846) | X | X | X | N | B | | | CK | |
| <i>Dryops doderoi</i> Bollow, 1936 | X | X | | | | | | | |
| <i>Dryops ernesti</i> Gozis, 1886 | | | | | N | | | B | |
| <i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847) | | X | | N | | X | X | | |
| <i>Dryops lutulentus</i> (Erichson, 1847) | | | N | | | | B | CK | |
| <i>Dryops rufipes</i> (Krynicky, 1832) | | | | ! | | | | | |
| <i>Dryops similaris</i> Bollow, 1936 | | | | | | CK | | | |
| <i>Dryops striatellus</i> (Fairmaire & C.N.F. Brisout de Barneville, 1859) | | X | | | | | | | |
| <i>Dryops subincanus</i> (Kuwert, 1890) | | B | X | | CK | ! | | B | |
| <i>Dryops sulcipennis</i> (A. Costa, 1883) | | CK | | | | X | X | | |
| <i>Dryops viennensis</i> (Laporte, 1840) | | ! | | | | | | | |
| <i>Pomatinus substriatus</i> (P.W.J. Müller, 1806) | | | | | | | X | B | |
| LIMNICHIDAE Erichson, 1846 | | | | | | | | | |
| Linnichinae Erichson, 1846 | | | | | | | | | |
| Hernando & Ribera in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Bothriophorus atomus</i> Mulsant & Rey, 1852 | | B | | | | B | | B | |
| <i>Linnichus incanus</i> Kiesenwetter, 1851 | | B | X | | CK | B | | CK | |
| <i>Linnichus sericeus</i> (Duftschmid, 1825) | | CK | N | N | | B | | | |
| <i>Pelochares versicolor</i> (Waltl, 1838) | CK | CK | X | | CK | N | | CK | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| HETEROCERIDAE W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| Heterocerinae W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| Augylini Pacheco, 1964 | | | | | | | | | |
| Mascagni in Cat. Pal. Col., vol. 3, 2016 | | | | | | | | | |
| <i>Augyles flavidus</i> (P. Rossi, 1794) | X | X | | N | CK | X | | | |
| <i>Augyles maritimus</i> (Guérin-Méneville, 1844) | CK | CK | X | N | CK | N | X | N | |
| <i>Augyles marmota</i> (Kiesenwetter, 1850) | | X | | | | CK | | CK | |
| Heterocerini W.S. Macleay, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Heterocerus aragonicus</i> Kiesenwetter, 1850 | | | | | N | CK | | B | |
| <i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784) | X | X | X | CK | N | X | X | B | |
| <i>Heterocerus flexuosus</i> Stephens, 1828 | X | X | | | | | | | |
| <i>Heterocerus holosericeus</i> Rosenhauer, 1856 | X | X | | | CK | CK | | | |
| ELATEROIDEA Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Kundrata et al., 2014 | | | | | | | | | |
| ARTEMATOPODIDAE Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Artematopodinae Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Bocák in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Eurypogon cribratus</i> (Hampe, 1866) [E] | | | | | N | | | | |
| EUCNEMIDAE Eschscholtz, 1829 | | | | | | | | | |
| Melasinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Dirhagini Reitter, 1911 | | | | | | | | | |
| Muona in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Farsus dubius</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | X | X | | | | X | X | N | LC |
| <i>Microrhagus emyi</i> (Rouget, 1856) | | | | | | | N | N | VU |
| <i>Microrhagus hummleri</i> (Reitter, 1911) | | X | | | | B | | B | CR |
| <i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792) | | | | | | | N | | NT |
| Epiphanini Muona, 1993 | | | | | | | | | |
| <i>Epiphanis cornutus</i> Eschscholtz, 1829 | | | | | | | N | | VU |
| Melasini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Isorhipis melasoides</i> (Laporte, 1835) | | | | | B | X | X | N | LC |
| <i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1761) | X | | | N | | X | | B | LC |
| Xylobiini Reitter, 1911 | | | | | | | | | |
| <i>Xylophilus corticalis</i> (Paykull, 1800) | | | | | | | | | NT |
| THROSCIDAE Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Throscinae Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Throscini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Leseigneur in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Aulonthroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859) | | | N | | | | | | DD |
| <i>Trixagus algiricus</i> (Bonvouloir, 1862) | | | X | N | | | N | N | DD |
| <i>Trixagus angelinii</i> Leseigneur, 2005 | | | | | N | | | N | LC |
| <i>Trixagus atticus</i> Reitter, 1921 | | B | N | | | | | | DD |
| <i>Trixagus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859) | | | | | N | | | N | DD |
| <i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | N | N | | | LC |
| <i>Trixagus duvalii</i> (Bonvouloir, 1859) | | X | X | | | | | | DD |
| <i>Trixagus elateroides elateroides</i> (Heer, 1841) | | N | X | | N | N | N | N | LC |
| <i>Trixagus exul</i> (Bonvouloir, 1859) | | | | | N | | | | |
| <i>Trixagus gracilis</i> Wollaston, 1854 | B | B | B | | N | N | N | N | LC |
| <i>Trixagus meybohmi</i> Leseigneur, 2005 | | | | | | | | B | NT |
| <i>Trixagus obtusus</i> (Curtis, 1827) | | | X | | N | N | | | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| LYCIDAE Laporte, 1838 | | | | | | | | | |
| Lycinae Laporte, 1838 | | | | | | | | | |
| Erotini LeConte, 1881 | | | | | | | | | |
| Bocáková & Bocák in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784) | | X | | | | | X | B | LC |
| <i>Platycis minutus</i> (Fabricius, 1787) | | | | | | X | B | B | LC |
| <i>Pyropterus nigroruber</i> (DeGeer, 1774) | X | X | | N | | X | X | N | LC |
| Calochrominae Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Lygisterus anorachilus</i> Ragusa, 1883 [E] | X | | | | B | X | X | N | NT |
| <i>Lygisterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | N | B | X | B | B | LC |
| LAMPYRIDAE Latreille, 1817 | | | | | | | | | |
| Lampyrinae Latreille, 1817 | | | | | | | | | |
| Lampyrini Latreille, 1817 | | | | | | | | | |
| Geisthardt & Satô in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Lampyris brutia</i> A. Costa, 1882 [E] | | | | | N | | B | | |
| <i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | X | | | X | X | | |
| Photinini E. Olivier, 1907 | | | | | | | | | |
| <i>Lamprohiza splendidula</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | | X | X | N | |
| Luciolinae Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Luciolini Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Luciola italica</i> (Linnaeus, 1767) | | | X | | N | X | | N | |
| <i>Luciola lusitanica</i> (Charpentier, 1825) | B | B | | | | | | | |
| CANTHARIDAE Imhoff, 1856 | | | | | | | | | |
| Cantharinae Imhoff, 1856 | | | | | | | | | |
| Podabrini LeConte, 1881 | | | | | | | | | |
| Kazantsev & Brancucci in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Malthacus procerulus</i> (Kiesenwetter, 1860) | | | | B | N | X | X | B | |
| Cantharini Imhoff, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Ancistronycha abdominalis</i> (Fabricius, 1798) | | | | | | | X | | |
| <i>Ancistronycha lucens</i> Moscardini, 1967 | X | | | | | X | X | B | |
| <i>Ancistronycha violacea</i> (Paykull, 1798) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Cantharis corvina</i> Moscardini, 1962 [E] | | | | B | | | | | |
| <i>Cantharis decipiens</i> Baudi di Selve, 1872 | X | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Cantharis falzonii</i> A. Fiori, 1914 [E] | | | | | | B | X | X | B |
| <i>Cantharis flavilabris</i> Fallén, 1807 | H | X | N | N | N | X | X | N | |
| <i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758 | X | X | N | B | N | X | X | B | |
| <i>Cantharis ictaria</i> A. Fiori, 1914 [E] | | | | | | | X | | |
| <i>Cantharis italica</i> A. Fiori, 1914 [E] | X | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Cantharis lateralis</i> Linnaeus, 1758 | H | X | N | | | | | | |
| <i>Cantharis liburnica</i> Depoli, 1912 | | | | B | | | | B | |
| <i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758 | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Cantharis merula</i> Moscardini, 1962 [E] | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Cantharis monacha</i> Moscardini, 1962 [E] | | | | | | | X | N | |
| <i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776) | X | N | | N | | X | X | N | |
| <i>Cantharis obscura</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | X | | | |
| <i>Cantharis paganettii</i> (Flach, 1907) [E] | | | N | N | | X | X | B | |
| <i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Cantharis pellucida</i> Fabricius, 1792 | | | | B | | X | X | B | |
| <i>Cantharis peninsularis</i> A. Fiori, 1914 [E] | X | X | | B | | X | X | B | |
| <i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | | B | |
| <i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807 | X | X | X | B | N | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Malthodes siculus</i> Kiesenwetter, 1852 | B | X | | | B | N | | B | |
| <i>Malthodes solarii</i> Pic, 1912 [E] | | | | | B | X | | B | |
| <i>Malthodes spectabilis</i> Kiesenwetter, 1871 [E] | X | B | N | B | B | B | X | | |
| <i>Malthodes spinifer</i> Liberti, 2017 [E] | | | | | | B | | | |
| <i>Malthodes teter</i> A. Fiori, 1908 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Malthodes umbrosus</i> Kiesenwetter, 1871 [E] | | | | | | B | | | |
| OMALISIDAE Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Omalisinae Lacordaire, 1857 | | | | | | | | | |
| Bocák in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Kundrata et al., 2015; Bocek et al., 2017 | | | | | | | | | |
| <i>Omalisus fontisbellaquaei</i> Geoffroy, 1785 | | N | | | N | | | | |
| Thilmaninae Kazantsev, 2005 | | | | | | | | | |
| <i>Phaeopterus unicolor</i> A. Costa, 1857 | | N | | | | | | | |
| ELATERIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Agrypninae Candèze, 1857 | | | | | | | | | |
| Agrypnini Candèze, 1857 | | | | | | | | | |
| Cate in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 except Cebrionini and Lissominae; Kundrata et al., 2018 | | | | | | | | | |
| <i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Compsolacon crenicollis</i> (Ménétriés, 1832) | | X | | | CK | X | | B | |
| <i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1800) | | | | | | | X | | EN |
| <i>Lacon punctatus punctatus</i> (Herbst, 1779) | H | X | X | N | CK | X | X | N | LC |
| Drilini Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Drilus flavescens</i> A.G. Olivier, 1790 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| Oophorini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Aeoloderma crucifer</i> (P. Rossi, 1790) | | X | | | | | | B | |
| <i>Drasterius bimaculatus</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | X | CK | CK | X | X | B | |
| Cardiophorinae Candèze, 1860 | | | | | | | | | |
| <i>Cardiophorus anticus</i> Erichson, 1840 | CK | CK | | | | | | CK | NT |
| <i>Cardiophorus castillanus</i> Buysson, 1902 | | | | B | | X | B | | |
| <i>Cardiophorus collaris</i> Erichson, 1840 | X | X | X | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Cardiophorus elenorae</i> (Gené, 1836) | | | | | | | | B | |
| <i>Cardiophorus exaratus</i> Erichson, 1840 | X | X | | | | | | | |
| <i>Cardiophorus goezei</i> Sanchez-Ruiz, 1996) | H | X | | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763) | CK | | | | | | | | NT |
| <i>Cardiophorus italicus</i> Platia & Bartolozzi, 1988 [E] | B | B | | CK | CK | N | B | | |
| <i>Cardiophorus nathaliae</i> Platia & Schimmel, 1988 [E] | | B | | | | | | | |
| <i>Cardiophorus ruficurvis</i> (Brullé, 1832) | CK | | | | | | | | |
| <i>Cardiophorus ulcerosus</i> (Gené, 1836) | | X | | | | X | B | CK | |
| <i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson, 1840 | X | X | | | CK | X | X | B | |
| <i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784) | H | CK | | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Dicronychus equiseti</i> (Herbst, 1784) | CK | X | | | CK | X | B | | |
| <i>Dicronychus rubripes</i> (Germar, 1824) | B | | | B | | | | | |
| <i>Dicronychus versicolor</i> (Mulsant & Guillebeau, 1856) | H | | | CK | CK | X | X | | |
| <i>Paracardiophorus musculus musculus</i> (Erichson, 1840) | | X | | | | | X | | |
| Dendrometrinae Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Dendrometrini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Athouina Candèze, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Athous bicolor</i> (Goeze, 1777) | | | | | B | | | | |
| <i>Athous cachecticus</i> Candèze, 1860 [E] | | | | | CK | B | X | B | |
| <i>Athous flavipennis</i> Candèze, 1860 | | | | | B | | | | |
| <i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801) | H | | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Athous ineptus</i> Candèze, 1860 | | | | | CK | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Athous limoniiformis</i> Candèze, 1865 [E] | | | | | | | | CK | |
| <i>Athous marginicollis</i> Reitter, 1890 | | | | | | B | X | B | |
| <i>Athous puncticollis</i> Kiesenwetter, 1858 | ! | | | | ! | ! | ! | ! | |
| <i>Athous subfuscus</i> (O.F. Müller, 1764) | X | | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | N | CK | X | X | B | |
| <i>Athous zappiorum</i> Platia, 1985 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785) | ! | | X | | CK | B | | | |
| <i>Cidnopus pseudopilosus</i> Platia & Gudenzi, 1985 | H | | X | CK | B | X | X | | |
| <i>Limonius minutus</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799) | H | | | N | | X | X | B | |
| <i>Pheletes quercus</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | N | CK | X | X | | |
| Dendrometrina Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Denticollis rubens</i> Piller & Mitterpacher, 1783 | | | | | | X | X | ! | NT |
| Hemicrepidina Champion, 1894 | | | | | | | | | |
| <i>Harminius florentinus</i> (Desbrochers des Loges, 1870) | | | | | CK | | X | | |
| <i>Harminius spiniger</i> (Candèze, 1860) | X | X | X | | N | X | ! | ! | |
| <i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784) | CK | X | X | B | CK | X | X | B | |
| <i>Stenagostus rhombeus</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | | | | | B | ! | ! | VU |
| Prosternini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Anostirus cerrutii</i> Binaghi, 1940 | | | | N | B | B | X | B | |
| <i>Aplotarsus incanus</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | | X | | |
| <i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767) | X | | | CK | CK | | CK | | VU |
| <i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1775) | | | | | B | | | | |
| <i>Ctenicera pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | | |
| <i>Hypoganus inunctus</i> (Lacordaire, 1835) | | | | CK | B | B | X | | EN |
| <i>Mosotalesus impressus impressus</i> (Fabricius, 1792) | | | | | | X | | | |
| <i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | B | |
| Selatosomini Schimmel, Tarnawski, Han & Platia, 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Pristilophus melancholicus melancholicus</i> (Fabricius, 1798) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Selatosomus amplicollis</i> (Germar, 1843) | X | | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Selatosomus sabinatus</i> (Ménétriés, 1832) | H | X | | | CK | X | X | B | |
| Elaterinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Agriotini Champion, 1894 | | | | | | | | | |
| <i>Agriotes acuminatus</i> (Stephens, 1830) | | | CK | | CK | X | X | B | |
| <i>Agriotes aequalis</i> Schwarz, 1891 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Agriotes brevis</i> Candèze, 1863 | X | X | X | CK | CK | X | X | ! | |
| <i>Agriotes corsicus</i> Candèze, 1863 | ! | | | | CK | X | X | B | |
| <i>Agriotes infuscatus</i> Desbrochers des Loges, 1870 | H | | X | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | X | | CK | X | X | B | |
| <i>Agriotes litigiosus</i> (P. Rossi, 1792) | X | | X | | CK | X | X | B | |
| <i>Agriotes modestus</i> Kiesenwetter, 1858 | | X | | | | | | | |
| <i>Agriotes proximus</i> Schwarz, 1891 | B | | B | | | | | | |
| <i>Agriotes sordidus</i> (Illiger, 1807) | H | X | X | | CK | | | CK | |
| <i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | N | CK | X | X | B | |
| Ampedini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Ampedus cardinalis</i> (Schiodte, 1865) | | B | | | | | X | | LC |
| <i>Ampedus cinnaberinus</i> (Eschscholtz, 1829) | | | | N | CK | X | X | B | LC |
| <i>Ampedus coenobita</i> (A. Costa, 1881) | | | | | | | X | B | NT |
| <i>Ampedus elegantulus</i> (Schönherr, 1817) | | | | | | X | X | | VU |
| <i>Ampedus erythrogonus</i> (P.W.J. Müller, 1821) | | | | | | B | X | | NT |
| <i>Ampedus glycereus</i> (Herbst, 1784) | H | | | CK | | B | B | B | LC |
| <i>Ampedus magistretti</i> Platia & Schimmel, 1988 [E] | B | | | | | X | | | EN |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Ampedus melanurus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855 | | | | | | X | | B | VU |
| <i>Ampedus nemoralis</i> Bouwer, 1980 | | B | | | | | | | VU |
| <i>Ampedus nigerrimus</i> (Lacordaire, 1835) | | | | | CK | | | ! | LC |
| <i>Ampedus pomonae</i> (Stephens, 1830) | B | | | | | | | | NT |
| <i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784) | H | B | | | | X | X | B | LC |
| <i>Ampedus praeustus</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | | X | | NT |
| <i>Ampedus quadrisignatus</i> (Gyllenhal, 1817) | | X | | | | | | | CR |
| <i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887) | B | | | | B | CK | X | B | LC |
| <i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830) | H | B | | B | B | X | X | B | VU |
| <i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | | X | X | B | LC |
| <i>Ampedus sanguinolentus sanguinolentus</i> (Schränk, 1776) | | X | | | | | X | | LC |
| <i>Ampedus sinuatus</i> Germar, 1844 | | | | | | X | X | B | VU |
| <i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835) | | B | | | | | | ! | VU |
| <i>Reitterelater bouyoni</i> (Chassain, 1992) | | | | | | CK | | | CR |
| Cebrionini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Sánchez-Ruiz & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Kundrata & Bocák, 2011 | | | | | | | | | |
| <i>Cebrio dubius</i> P. Rossi, 1790 [E] | X? | | | | | | | | |
| <i>Cebrio fiorii</i> Leoni, 1906 cf. [E] | | B | X | B | | X | X? | | |
| Elaterini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Elaterina Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Elater ferrugineus ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 | | X | | | | N | | | VU |
| <i>Mulsanteus guillebeaui</i> (Mulsant & Godart, 1853) | X | N | | | | N | | B | |
| Megapenthini Gurjeva, 1973 | | | | | | | | | |
| <i>Megapenthes lugens</i> (W. Redtenbacher, 1842) | H | N | | B | B | | | B | VU |
| <i>Proceraerus tibialis</i> (Lacordaire, 1835) | | | | B | | | | ! | EN |
| Melanotini Candèze, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800) | X | | | | CK | X | X | B | LC |
| <i>Melanotus crassicolis</i> (Erichson, 1841) | H | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Melanotus dichrous</i> (Erichson, 1841) | X | | X | | B | | | CK | |
| <i>Melanotus tenebrosus</i> (Erichson, 1841) | H | X | | B | CK | X | X | B | |
| <i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy, 1785) | X | | X | | CK | X | X | B | LC |
| Pomachiliini Candèze, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Betarmon bisbimaculatus</i> (Fabricius, 1803) | | X | | N | N | CK | X | B | |
| <i>Idiotarmon quadrivittatus</i> (Ragusa, 1893) [E] | | X | | | | X | X | B | |
| <i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852) | | | | CK | CK | X | X | | |
| <i>Isidus moreli</i> Mulsant & Rey, 1875 | | B | | | | | | | VU |
| Synaptini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Adrastus axillaris</i> Erichson, 1841 | | X | | | CK | CK | X | | |
| <i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1777) | ! | | | | ! | | ! | | |
| <i>Adrastus rachifer</i> (Geoffroy, 1785) | X | X | X | N | CK | X | X | B | |
| <i>Adrastus sekeræ</i> Reitter, 1910 [E] | | X | | | CK | | | B | |
| <i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781) | X | X | CK | N | CK | X | | ! | |
| Lissominae Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Lissomini Laporte, 1835 | | | | | | | | | |
| Smetana in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Kundrata et al., 2018 | | | | | | | | | |
| <i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789) | X | X | | | | X | X | N | LC |
| Negastriinae Nakane & Kishii, 1956 | | | | | | | | | |
| Quasimusini Schimmel & Tarnawski, 2009 | | | | | | | | | |
| <i>Quasimus liliputanus</i> (Germar, 1844) | | | | | | | | B | |
| <i>Quasimus minutissimus</i> (Germar, 1823) | X | X | X | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Zoroachros boubersi</i> Leseigneur, 1970 | | | | | | | X | | |
| <i>Zoroachros curtus</i> (Germar, 1844) | | X | | | | CK | | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Zorochros dermestoides</i> (Herbst, 1806) | CK | CK | | | CK | B | | B | |
| <i>Zorochros meridionalis</i> (Laporte, 1840) | X | X | | | | ! | | B | |
| <i>Zorochros pumilio</i> (Kiesenwetter, 1858) | | | | | CK | CK | X | B | |
| <i>Zorochros trigonochirus</i> (Binaghi, 1933) | | X | | | CK | CK | | B | |
| DERODONTIFORMIA LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| DERODONTOIDEA LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| DERODONTIDAE LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| Derodontinae LeConte, 1861 Háva in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Derodontus raffrayi</i> Grouvelle, 1917 [E] | | B | | | B | B | | | VU |
| NOSODENDRIDAE Erichson, 1846 Steinhammer in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Nosodendron fasciculare</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | N | | | | LC |
| BOSTRICHIFORMIA Forbes, 1926 | | | | | | | | | |
| BOSTRICHIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| DERMESTIDAE Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Dermestinae Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Dermestini Latreille, 1804 Háva in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Dermestes erichsoni</i> Ganglbauer, 1904 | | | | N | N | | | | |
| <i>Dermestes frischii</i> Kugelann, 1792 | H | X | X | N | | X | X | | |
| <i>Dermestes fuliginosus</i> P. Rossi, 1792 | H | | | | | | X | | |
| <i>Dermestes gyllenhalii gyllenhalii</i> Laporte, 1840 | | | N | | N | N | N | N | |
| <i>Dermestes laniarius</i> Illiger, 1801 | H | X | | | | X | | | |
| <i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | N | X | B | |
| <i>Dermestes mustelinus</i> Erichson, 1846 | | N | | N | N | N | | | |
| <i>Dermestes olivieri</i> Lepesme, 1939 | X | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790 | N | X | N | | N | N | | | |
| Thorictinae Agassiz, 1846 | | | | | | | | | |
| Thorictini Agassiz, 1846 Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Thorictus grandicollis grandicollis</i> Germar, 1842 | X | X | | | N | | | N | |
| <i>Thorictus stricticollis stricticollis</i> Kraatz, 1859 | | | | | | | | ! | |
| Orphilinae LeConte, 1861 Háva in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Orphilus niger</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | | N | | X | X | N | LC |
| Trinodinae Casey, 1900 | | | | | | | | | |
| Trinodini Casey, 1900 | | | | | | | | | |
| <i>Trinodes hirtus</i> (Fabricius, 1781) | H | X | X | | | | X | N | LC |
| Attageninae Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Attagenini Laporte, 1840 Háva in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Attagenus bifasciatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | N | | | | N | | |
| <i>Attagenus brunneus</i> Faldermann, 1835 | | X | | | | | | | |
| <i>Attagenus calabricus</i> Reitter, 1881 [E] | X | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Attagenus lobatus</i> Rosenhauer, 1856 | X | | | | | | | | |
| <i>Attagenus pilosissimus</i> Roubal, 1932 | H | | | N | B | X | X | N | |
| <i>Attagenus silvaticus</i> Zhantiev, 1976 | B | | | | | | | | |
| <i>Attagenus unicolor unicolor</i> (Brahm, 1790) | X | X | | N | | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Paranovelsis punctatus</i> (Scopoli, 1772) | | | | | | X | X | | |
| Megatominae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Anthrenini Casey, 1900 | | | | | | | | | |
| Háva in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Anthrenus angustefasciatus</i> Ganglbauer, 1904 | | | | | | B | | | |
| <i>Anthrenus coloratus</i> Reitter, 1881 | B | | | | | | | | |
| <i>Anthrenus delicatus</i> Kiesenwetter, 1852 | B | | | | | | | | |
| <i>Anthrenus fuscus</i> A.G. Olivier, 1790 | | | | | | X | X | | |
| <i>Anthrenus munroi</i> Hinton, 1943 | X | X | | | | X | | | |
| <i>Anthrenus pimpinellae pimpinellae</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | N | | | | | |
| <i>Anthrenus scrophulariae scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | | | | X | N | |
| <i>Anthrenus signatus</i> Erichson, 1846 | H | N | B | | | X | | | |
| <i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| Megatomini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792) | | | | | | X | X | | LC |
| <i>Globicornis corticalis</i> (Eichhoff, 1863) | | | N | | N | N | | | NT |
| <i>Globicornis emarginata</i> (Gyllenhal, 1808) | X | X | | | | X | X | | LC |
| <i>Globicornis fasciata</i> (Fairmaire & C.N.F. Brisout de Barneville, 1859) | | N | | | | B | | | LC |
| <i>Globicornis nigripes</i> (Fabricius, 1792) | | | | | N | N | | | LC |
| <i>Globicornis picta</i> (Küster, 1851) | H | | | | | X | | | LC |
| <i>Globicornis sulcata</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1866) | | | | | B | X | | | NT |
| <i>Globicornis tristis</i> (Reitter, 1881) | | X | | | | | | | LC |
| <i>Globicornis variegata</i> (Küster, 1851) | | | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1783) | | | | | | N | | | |
| <i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898 | X | | | | | | | | |
| <i>Trogoderma inclusum</i> LeConte, 1854 | | X | | | | | | | |
| BOSTRICHIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Bostrichinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Apatini Jacquelin du Val, 1861 | | | | | | | | | |
| Borowski in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Apate monachus</i> Fabricius, 1775 | | B | | | N | | | B | NT |
| Bostrichini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Amphicerus bimaculatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | | | | | N | LC |
| <i>Bostrichus capucinus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Lichenophanes numida</i> Lesne, 1899 | | | N | | | | | | EN |
| <i>Lichenophanes varius</i> (Illiger, 1801) | X | B | | | B | | | B | EN |
| <i>Micrapate xyloperthoides</i> (Jacquelin du Val, 1859) | N | | | | | | | | LC |
| Sinoxylonini Lesne, 1899 | | | | | | | | | |
| <i>Sinoxylon muricatum</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | | | N | X | | | LC |
| <i>Sinoxylon perforans</i> (Schränk, 1789) | | | | | N | | | | LC |
| Xyloperthini Lesne, 1921 | | | | | | | | | |
| <i>Enneadesmus trispinosus</i> (A.G. Olivier, 1795) | | | | | | | | N | NT |
| <i>Scobicia chevrieri</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1835) | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Xylopertha praeusta</i> (Germar, 1817) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Xylopertha retusa</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | N | | N | X | N | VU |
| <i>Xyloperthella picea picea</i> (A.G. Olivier, 1790) | | X | | | N | | | | LC |
| Dinoderinae C.G. Thomson, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792) | X | X | X | N | | X | X | N | |
| <i>Stephanopachys quadricollis</i> (Marseul, 1878) | | | | | | X | X | N | VU |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Lyctinae Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Lyctini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Lyctus brunneus</i> (Stephens, 1830) | | N | | | | | | | LC |
| Trogoxylini Lesne, 1921 | | | | | | | | | |
| <i>Trogoxylon impressum</i> (Comolli, 1837) | X | X | X | | N | X | X | N | LC |
| Psoinae Blanchard, 1851 | | | | | | | | | |
| Psoini Blanchard, 1851 | | | | | | | | | |
| <i>Psoa dubia</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | N | | | | | N | LC |
| PTINIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Anobiinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Anobiini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Zahradnik in Cat. Pal. Col. Vol. 4, 2007; Zahradnik, 2013 | | | | | | | | | |
| <i>Anobium hederæ</i> Ihssen, 1949 | N | N | | | | N | | | LC |
| <i>Anobium punctatum</i> (DeGeer, 1774) | X | X | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Cacotemnus thomsoni</i> (Kraatz, 1881) | | N | | | | | | | EN |
| <i>Hemicoelus canalicularis</i> (C.G. Thomson, 1863) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830) | H | | | N | N | B | N | N | LC |
| <i>Hemicoelus fulvicornis</i> (Sturm, 1837) | | N | | N | | N | N | N | LC |
| <i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid, 1825) | H | | | | N | | | | LC |
| Gastrallini White, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Falsgastrallus unistriatus</i> (Zoufal, 1897) | | N | | | | | | | EN |
| <i>Gastrallus corsicus</i> Schilsky, 1898 | | N | | | | N | | | LC |
| <i>Gastrallus immarginatus</i> (P.W.J. Müller, 1821) | N | X | | | | N | | | LC |
| <i>Gastrallus laevigatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | N | | | N | N | | | LC |
| Hadrobregmini White, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Hadrobregmus denticollis</i> (Creutzer, 1796) | | | | | | | N | | LC |
| <i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | N | | | LC |
| Nicobiini White, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Nicobium castaneum</i> (A.G. Olivier, 1790) | | X | | | | | | N | LC |
| Stegobiini White, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Oligomerus brunneus</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | | | N | | | | | LC |
| <i>Oligomerus ptilinoides</i> (Wollaston, 1854) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | N | N | |
| Dorcatominae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Dorcatomini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Caenocara affine</i> (Sturm, 1837) | | X | | | | | | N | LC |
| <i>Caenocara subglobosum</i> (Mulsant & Rey, 1864) | X | X | | N | | X | | | LC |
| <i>Dorcatoma chrysomelina</i> Sturm, 1837 | N | | | | | | | N | LC |
| <i>Dorcatoma dresdensis</i> Herbst, 1792 | | | | B | N | | | | LC |
| <i>Dorcatoma flavicornis</i> (Fabricius, 1792) | N | | | | | | | | LC |
| <i>Dorcatoma setosella setosella</i> Mulsant & Rey, 1864 | | | | | | | | B | LC |
| <i>Mizodorcatoma dommeri</i> (Rosenhauer, 1856) | | N | | | | N | | N | LC |
| Prothecini White, 1982 | | | | | | | | | |
| <i>Stagetus andalusiacus cribricollis</i> (Aubé, 1861) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Stagetus byrrhoides</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | | | | N | | | N | LC |
| <i>Stagetus calabriensis</i> Toskina, 2012 [E] | | | | | | | | B | LC |
| <i>Stagetus elongatus</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Stagetus italicus</i> (Reitter, 1885) | | | | N | | N | | N | LC |
| <i>Stagetus pilula</i> (Aubé, 1861) | X | N | X | | | | | N | LC |
| Dryophilinae LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| Dryophilini LeConte, 1861 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Niptus hololeucus</i> (Faldermann, 1835) | | | | | | N | | | |
| <i>Pseudeurostus apenninus</i> (Baudi di Selve, 1874) [E] | | | | N | N | N | | N | |
| <i>Pseudoptinus lichenum</i> (Marsham, 1802) | X | X | | N | N | N | | N | LC |
| <i>Ptinus atricapillus</i> Kiesenwetter, 1877 | H | | | | N | | | N | |
| <i>Ptinus aubei</i> Boieldieu, 1854 | H | X | | | N | X | X | | |
| <i>Ptinus bidens</i> A.G. Olivier, 1790 | H | X | | N | N | N | | N | |
| <i>Ptinus calcaratus</i> Kiesenwetter, 1877 | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Ptinus corsicus</i> Kiesenwetter, 1877 | N | | | N | N | N | N | N | |
| <i>Ptinus dubius</i> Sturm, 1837 | | X | | | | | | | |
| <i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | | X | X | N | |
| <i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775 | X | X | | N | | X | X | N | |
| <i>Ptinus obesus</i> P.H. Lucas, 1846 | X | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Ptinus perrini</i> (Reitter, 1884) | | N | | | N | | | | |
| <i>Ptinus pilosus</i> P.W.J. Müller, 1821 | H | | | | N | X | X | N | |
| <i>Ptinus raptor</i> Sturm, 1837 | H | | | | | | | | |
| <i>Ptinus reitteri</i> Pic, 1894 | | | | | | | | N | |
| <i>Ptinus sexpunctatus</i> Panzer, 1789 | | X | | | | | N | | |
| <i>Ptinus spitzvi</i> A. Villa & G.B. Villa, 1838 | | N | | | | | | | |
| <i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837 | H | N | | | N | N | | | |
| <i>Ptinus tarsalis</i> (Reitter, 1884) | X | X | | | | X | | N | |
| <i>Ptinus variegatus</i> P. Rossi, 1792 | X | | | | | | | | |
| Xyletininae Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| Lasiodermi White, 1982 | | | | | | | | | |
| Zahradnik in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Zahradnik, 2013 | | | | | | | | | |
| <i>Lasioderma baudii</i> Schilsky, 1899 | X | X | | N | | X | X | N | |
| <i>Lasioderma bubalus</i> Fairmaire, 1860 | H | | N | N | N | X | X | | |
| <i>Lasioderma haemorrhoidale</i> (Illiger, 1807) | H | | X | N | | | | N | |
| <i>Lasioderma kiesenwetteri</i> Schilsky, 1899 | H | N | | N | N | | | | |
| <i>Lasioderma laeve</i> (Illiger, 1807) | | N | N | | | | | N | |
| <i>Lasioderma obscurum</i> (Solsky, 1868) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Lasioderma redtenbacheri redtenbacheri</i> (Bach, 1852) | X | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792) | | X | | N | | X | | | |
| Xyletinini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Xyletinus ater</i> (Creutzer, 1796) | | | | | | N | N | | LC |
| <i>Xyletinus balcanicus</i> Gottwald, 1977 | | | | | N | | | | VU |
| <i>Xyletinus fibyensis</i> Lundblad, 1949 | | N | | | | | | | VU |
| <i>Xyletinus laticollis</i> (Duftschmid, 1825) | X | X | N | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Xyletinus longitarsis longitarsis</i> Jansson, 1942 | | | N | | | B | | N | VU |
| <i>Xyletinus pectinatus pectinatus</i> (Fabricius, 1792) | | | | N | | | | | LC |
| <i>Xyletinus pectiniferus</i> Fairmaire, 1879 | | X | | | | | | | NT |
| <i>Xyletinus subrotundatus</i> Lareynie, 1852 | | N | | | | X | | | |
| <i>Xyletinus vaederoensis</i> Lundberg, 1969 | | N | | | | | | | |
| Xyletinini genera incertae sedis | | | | | | | | | |
| <i>Metholcus phoenicis</i> (Fairmaire, 1859) | X | X | | | | N | | | |
| CUCUJIFORMIA Lameere, 1938 | | | | | | | | | |
| LYMEXYLOIDEA Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| LYMEXYLIDAE Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Hylecoetinae Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| Cuccodoro in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Elateroides dermestoides</i> (Linnaeus, 1761) | | | | | N | X | X | N | NT |
| Lymexylinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Lymexylon navale</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | | | | | N | NT |
| CLEROIDEA Latreille, 1802 sensu Robertson et al., 2015; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| BYTURIDAE Jacquelin du Val, 1858 Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Byturus ochraceus</i> (L.G. Scriba, 1790) | | | | | | N | | | |
| <i>Byturus tomentosus</i> (DeGeer, 1774) | X | | | | | X | X | | |
| BIPHYLLIDAE LeConte, 1861 Jelinek in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Biphyllus frater</i> (Aubé, 1850) | | N | | | N | N | X | N | LC |
| <i>Biphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | | N | | | LC |
| <i>Diplocoelus fagi</i> (Chevrolat, 1837) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| PELTIDAE Kirby, 1837 Peltini Kirby, 1837 Kolibáč in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Peltis ferruginea</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | N | NT |
| <i>Peltis grossa</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | B | B | NT |
| LOPHOCATERIDAE Crowson, 1964 Kolibáč in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Grynocharis oblonga</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | B | | B | NT |
| TROGOSSITIDAE Latreille, 1802 Trogossitinae Latreille, 1802 Trogossitini Latreille, 1802 Kolibáč in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2019; | | | | | | | | | |
| <i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761) | N | | | | N | X | | N | LC |
| <i>Temnoscheila caerulea</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | | | B | B | LC |
| THYMALIDAE Léveillé, 1888 Thymalinae Léveillé, 1888 Kolibáč in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787) | | | | | | X | X | N | LC |
| RHADALIDAE LeConte, 1862 Rhadalinae LeConte, 1862 Aplocnemini Majer, 1987 Mayor in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Bocakova et al., 2011; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Aplocnemus angelinii</i> Liberti, 1994 | | B | | | | | | | LC |
| <i>Aplocnemus chalconatus</i> (Germar, 1817) | X | B | | | | B | | | |
| <i>Aplocnemus corcyricus</i> (L. Miller, 1866) | | B | | | B | | | B | LC |
| <i>Aplocnemus etruscus</i> Liberti & Zinetti, 2009 | | | | | B | | | | NT |
| <i>Aplocnemus integer</i> (Baudi di Selve, 1873) | | | | | B | | X? | B | LC |
| <i>Aplocnemus jejunos</i> (Kiesenwetter, 1863) | | | | | ! | | | B | LC |
| <i>Aplocnemus marginatus</i> (Rottenberg, 1871) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Aplocnemus nigricornis garganicus</i> Liberti, 1994 [E] | B | | | | | | | | NT |
| <i>Aplocnemus nigricornis nigricornis</i> (Fabricius, 1792) | | | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Trichoceble floralis floralis</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | B | | | | |
| <i>Trichoceble memnonia</i> (Kiesenwetter, 1861) | | | | | | B | B | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| MELYRIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Malachiinae Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Malachiini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Apalochrina Mulsant & Rey, 1867 | | | | | | | | | |
| Mayor in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2019 | | | | | | | | | |
| <i>Protapalochrus flavolimbatus</i> Mulsant & Rey, 1853 | X | | | | | | | | |
| Attalina Abeille de Perrin, 1890 | | | | | | | | | |
| <i>Attalus amictus</i> (Erichson, 1840) | B? | | | | B? | X? | | | |
| <i>Attalus analis</i> (Panzer, 1798) | | | | | N | X | X | | LC |
| <i>Attalus cyaneus</i> (Fabricius, 1787) | X | B | | | | | | B | |
| <i>Attalus minimus</i> (P. Rossi, 1790) | | | | N | | N | | N | |
| <i>Attalus nourricheli nourricheli</i> (Laporte, 1838) | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Attalus sericans</i> (Erichson, 1840) | | B | | | B | N | | | |
| <i>Attalus varitarsis</i> (Kraatz, 1862) | | B | | | | B | | | |
| <i>Sphinginus coarctatus</i> (Erichson, 1840) | X | X | | B | B | | | B | LC |
| <i>Sphinginus lobatus lobatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | | | | | X | | B | LC |
| Colotina Abeille de Perrin, 1890 | | | | | | | | | |
| <i>Colotes maculatus</i> (Laporte, 1838) | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| <i>Colotes punctatus</i> (Erichson, 1840) | | B | | | | | | | |
| Ebaeina Portevin, 1931 | | | | | | | | | |
| <i>Ebaeus ater</i> Kiesenwetter, 1863 | | | | | | X | | | |
| <i>Ebaeus battonii</i> Pardo Alcaide, 1962 | | | | | B | | | | LC |
| <i>Ebaeus gibbus</i> (Drapiez, 1819) | | | X | | N | B | B | B | LC |
| <i>Hypebaeus flavicollis</i> (Erichson, 1840) | X | | | N | N | N | | B | LC |
| <i>Hypebaeus flavipes</i> (Fabricius, 1787) | | | | | | X | | | LC |
| Malachiina Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| <i>Anthocomus fasciatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | N | | | |
| <i>Anthocomus rufus rufus</i> (Herbst, 1784) | X | X | B | | | X | X | | |
| <i>Anthomalachius spinosus</i> (Erichson, 1840) | | X | B | B | | | B | | |
| <i>Axinotarsus insularis</i> Abeille de Perrin, 1881 | | X | | | B | | | N | |
| <i>Axinotarsus italicus</i> Escalera, 1926 [E] | | | | | B | X | | B | |
| <i>Axinotarsus longicornis</i> (Kiesenwetter, 1859) | | | | B? | | | | | |
| <i>Axinotarsus marginalis</i> (Laporte, 1840) | | X | | | | | | | |
| <i>Axinotarsus pulicarius</i> (Fabricius, 1777) | | | | | N | B | X | B | |
| <i>Axinotarsus ruficollis</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | B | | B | B | X | X | B | |
| <i>Charopus apicalis</i> Kiesenwetter, 1859 | H | X | | N | B | N | | B | |
| <i>Charopus concolor</i> (Fabricius, 1801) | H | | | | | B | B | N | |
| <i>Charopus docilis</i> Kiesenwetter, 1852 | | | | | | B | B | B | |
| <i>Charopus pallipes</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | B | | B | B | X | X | B | |
| <i>Charopus philoctetes</i> Abeille de Perrin, 1885 | | | | | | | B | | |
| <i>Charopus rotundatus</i> Erichson, 1840 | X? | | | | | | X? | | |
| <i>Clanoptilus affinis subconcolor</i> Pic, 1911 | | | | | B | | | | |
| <i>Clanoptilus bellieri</i> (Peyron, 1877) | | B | | | | B | | | |
| <i>Clanoptilus calabrus</i> (Baudi di Selve, 1873) [E] | | | | | | | X | B | LC |
| <i>Clanoptilus emarginatus</i> (Krauss, 1902) | H | | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Clanoptilus geniculatus</i> (Germar, 1824) | H | X | X | B | B | N | B | | |
| <i>Clanoptilus italicus</i> (Pardo Alcaide, 1967) [E] | H | | X | B | B | X | X | | LC |
| <i>Clanoptilus spinipennis brevispina</i> (Kiesenwetter, 1871) | H | X | B | B | N | X | X | B | |
| <i>Cordylepherus viridis</i> (Fabricius, 1787) | X | | B | B | B | X | X | B | |
| <i>Cyrtosus cyanipennis</i> (Erichson, 1840) | | | | | | | | B | |
| <i>Cyrtosus ovalis</i> (Laporte, 1838) | H | | | B | B | X | X | B | |
| <i>Malachius aeneus</i> (Linnaeus, 1758) | H | B | X | N | B | X | X | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Malachius australis</i> Mulsant & Rey, 1867 | H | N | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | B | B | X | | B | |
| Troglopina Mulsant & Rey, 1867 | | | | | | | | | |
| <i>Troglops albicans</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | B | | | B | LC |
| <i>Troglops italicus</i> Wittmer, 1984 | | | | | | | | B | |
| Dasytinae Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Danaceini Kiesenwetter, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Danacea ambigua</i> Mulsant & Rey, 1868 | X | X | | N | N | X | X | | |
| <i>Danacea apula</i> Liberti, 2007 [E] | B | | | | | | | | |
| <i>Danacea aurichalcea</i> (Küster, 1850) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Danacea conceii</i> Liberti, 1984 [E] | | | X | | B | X | | | |
| <i>Danacea cusanensis</i> (A. Costa, 1847) [E] | X | X | X | | B | X | X | B | |
| <i>Danacea jonica</i> Liberti, 1985 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Danacea lucana</i> Liberti, 1989 [E] | | | | | | B | X | | |
| <i>Danacea marginata</i> (Küster, 1851) | | | | | | | | B | |
| <i>Danacea nigritarsis brunneipes</i> Pic, 1927 [E] | B | | | N | | X | X | | |
| <i>Danacea scyllaea</i> Liberti, 1981 [E] | | | | | | N | X | B | |
| Dasytini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Dasytes aeneiventris</i> Küster, 1850 | H | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830 | B | | X | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Dasytes caeruleus</i> (DeGeer, 1774) | | | | B | B | X | | B | LC |
| <i>Dasytes flavescens</i> Gené, 1839 | | X | | | | B | | B | |
| <i>Dasytes nigroaeneus</i> Küster, 1850 | | | | | | | | B | LC |
| <i>Dasytes pauperculus</i> Laporte, 1840 | B | | | | | | | | LC |
| <i>Dasytes plumbeus</i> (O.F. Müller, 1776) | H | X | B | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Dasytes productus</i> Schilsky, 1894 | | | | | | | | B | |
| <i>Dasytes striatulus</i> Brullé, 1832 | H | X | X | | B | B | | | |
| <i>Dasytes subaeneus</i> Schönherr, 1817 | B | | | | | B | | | |
| <i>Dasytes tardus</i> L.W. Schaufuss, 1876 | | | | | B | | X | | |
| <i>Dasytes thoracicus lucanus</i> Wittmer, 1935 | | | | | | X | | | VU |
| <i>Dasytes tristiculus</i> Mulsant & Rey, 1868 | H | B | | | | B | B | B | |
| <i>Divales bipustulatus</i> (Fabricius, 1781) | X | | | B | N | X | X | N | |
| <i>Divales cinctus</i> (Gené, 1839) | | X | | | N | X | | N | |
| <i>Dolichosoma simile</i> (Brullé, 1832) | H | X | | | | | | | |
| <i>Enicopus ater</i> (Fabricius, 1787) | ! | | | | | | | | |
| <i>Enicopus pilosus</i> (Scopoli, 1763) | X | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Psilothrix melanostoma</i> (Brullé, 1832) | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Psilothrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| CLERIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Tillinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Löbl, Rolčík, Kolibáč & Gerstmeier in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Gimmel et al., 2919 | | | | | | | | | |
| <i>Denops albofasciatus</i> (Charpentier, 1825) | X | X | | | ! | N | | | NT |
| <i>Tilloidea transversalis</i> (Charpentier, 1825) | X | X | X | N | ! | X | X | B | |
| <i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius, 1787) | | | | | N | | | N | NT |
| <i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X? | | NT |
| Korynetinae Laporte, 1836 | | | | | | | | | |
| <i>Enoplium doderoi</i> Luigioni, 1926 | | X | | | | | | | EN |
| <i>Enoplium serraticorne</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | | B | | B | NT |
| <i>Korynetes pusillus</i> (Klug, 1842) | ! | X | X | | N | N | X | ! | NT |
| <i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775) | H | | | | | | | | |
| <i>Necrobia rufipes</i> (DeGeer, 1775) | X | X | | | ! | X | | N | |
| <i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758) | ! | X | N | N | ! | N | X | ! | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Tarsostenus univittatus</i> (P. Rossi, 1792) | ! | | | | ! | | | | |
| Clerinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Clerus mutillarius mutillarius</i> Fabricius, 1775 | X | X | X | N | N | X | X | N | NT |
| <i>Opilio domesticus</i> (Sturm, 1837) | ! | X | | | ! | ! | | | LC |
| <i>Opilio mollis</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | ! | X | X | N | LC |
| <i>Opilio pallidus</i> (A.G. Olivier, 1795) | | | | | | | | B | NT |
| <i>Opilio taeniatus</i> (Klug, 1842) | | | | N | | X | | | VU |
| <i>Thanasimus formicarius formicarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | ! | X | X | B | |
| <i>Trichodes leucopsidius</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | X | X | ! | N | X | X | N | |
| CUCUJOIDEA Latreille, 1802 sensu Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| SPHINDIDAE Jacquelin du Val, 1860 Sphindinae Jacquelin du Val, 1860 Jelinek in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808) | H | X | | | | X | | N | NT |
| Aspidiphorinae Kiesenwetter, 1877 | | | | | | | | | |
| <i>Aspidiphorus lareyniei</i> Jacquelin du Val, 1859 | | X | | | | | | | NT |
| <i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| EROTYLIDAE Latreille, 1802 Cryptophilinae Casey, 1900 Cryptophilini Casey, 1900 Wegrzynowicz in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Cryptophilus angustus</i> (Rosenhauer, 1856) | X | N | | N | N | N | X | N | LC |
| Xenoscelinae Ganglbauer, 1899 Xenoscelini Ganglbauer, 1899 | | | | | | | | | |
| <i>Leucohimatium arundinaceum</i> (Forskål, 1775) | H | X | | | N | N | | | |
| <i>Setariola sericea</i> (Mulsant & Rey, 1863) | X | X | | | | | | N | LC |
| <i>Xenoscelis costipennis</i> (Fairmaire, 1852) | | | | | | N | | | LC |
| Erotylinae Latreille, 1802 Dacnini Crotch, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781) | X | | | | | | | | LC |
| <i>Dacne pontica</i> (Bedel, 1868) | | | | N | | X | X | | NT |
| <i>Dacne rufifrons</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | X | X | | NT |
| Tritomini Curtis, 1834 | | | | | | | | | |
| <i>Triplax aenea</i> (Schaller, 1783) | | | | | | X | B | B | LC |
| <i>Triplax collaris</i> (Schaller, 1783) | | N | | | N | | | | DD |
| <i>Triplax lacordairii</i> Crotch, 1870 | H | X | | N | N | X | X | N | NT |
| <i>Triplax lepida</i> (Faldermann, 1837) | H | | | | | | | | NT |
| <i>Triplax marseuli</i> Bedel, 1868 | | X | | | | X | X | N | NT |
| <i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Triplax scutellaris</i> Charpentier, 1825 | | | | | | N | | | LC |
| <i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775 | H | X | | N | N | X | | | LC |
| MONOTOMIDAE Laporte, 1840 Rhizophaginae L. Redtenbacher, 1845 Jelinek in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Otero, 2011 | | | | | | | | | |
| <i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | N | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | | | | DD |
| <i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Rhizophagus ferrugineus</i> (Paykull, 1800) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Rhizophagus nitidulus</i> (Fabricius, 1798) | X | | | | | X | | | NT |
| <i>Rhizophagus unicolor</i> P.H. Lucas, 1849 | H | | | | | | | | LC |
| Monotominae Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Monotoma bicolor</i> A. Villa & G.B. Villa, 1835 | | N | | | N | N | N | | LC |
| <i>Monotoma brevicollis brevicollis</i> Aubé, 1838 | X | N | X | N | N | N | | N | LC |
| <i>Monotoma diecki</i> Reitter, 1877 | | N | | | | | | | LC |
| <i>Monotoma johnsoni</i> Bousquet & Laplante, 1999 | | | N | | N | | | | LC |
| <i>Monotoma longicollis</i> (Gyllenhal, 1827) | X | X | X | | | X | | | LC |
| <i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793 | | X | X | N | | | | N | LC |
| <i>Monotoma spinicollis</i> Aubé, 1837 | X | X | | N | | | | N | LC |
| KATERETIDAE Erichson, 1846 | | | | | | | | | |
| Jelinek in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Brachypterolus antirrhini</i> (Murray, 1864) | H | | | | | | X | | |
| <i>Brachypterolus linariae</i> (Stephens, 1830) | B | | | N | N | X | | B | |
| <i>Brachypterolus pulicarius</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | | | | | | |
| <i>Brachypterus curtulus</i> Wollaston, 1864 | | B | | | | | | | |
| <i>Brachypterus glaber</i> (Newman, 1834) | H | X | | | | | X | N | |
| <i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792) | X | | | N | | X | X | N | |
| <i>Kateretes dalmatinus</i> (Sturm, 1844) | | X | | | B | | | | |
| <i>Kateretes pusillus</i> (Thunberg, 1794) | | | | | | N | N | | |
| <i>Kateretes rufilabris</i> (Latreille, 1807) | X | X | | | | N | X | | |
| NITIDULIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Epuraeinae Kirejtshuk, 1986 | | | | | | | | | |
| Jelinek & Audisio in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Cline et al., 2014 | | | | | | | | | |
| <i>Epuraea unicolor</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Epuraea thoracica</i> Tournier, 1872 | | | | | | B | | | VU |
| <i>Epuraea terminalis</i> (Mannerheim, 1843) | | | | | | CK | | | LC |
| <i>Epuraea silacea</i> (Herbst, 1783) | | | | | CK | X | | | VU |
| <i>Epuraea rufomarginata</i> (Stephens, 1830) | | | | | | B | | | VU |
| <i>Epuraea pallescens</i> (Stephens, 1832) | H | | | N | | X | X | | LC |
| <i>Epuraea ocularis</i> Fairmaire, 1849 | | | | | | | | B | |
| <i>Epuraea melina</i> Erichson, 1843 | CK | | | | CK | X | X | CK | |
| <i>Epuraea melanocephala</i> (Marsham, 1802) | H | | CK | | CK | CK | B | | LC |
| <i>Epuraea marseuli</i> Reitter, 1873 | | | | | | | X | B | LC |
| <i>Epuraea luteola</i> Erichson, 1843 | | | | N | N | N | | B | |
| <i>Epuraea longula</i> Erichson, 1845 | | | X | | | X | | CK | LC |
| <i>Epuraea imperialis</i> (Reitter, 1877) | | | | | | | | B | |
| <i>Epuraea guttata</i> (A.G. Olivier, 1811) | | X | | | CK | X | B | | LC |
| <i>Epuraea fuscicollis</i> (Stephens, 1835) | | N | X | N | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Epuraea fageticola</i> Audisio, 1991 | X | X | | | B | B | B | | VU |
| <i>Epuraea biguttata</i> (Thunberg, 1784) | | | | | | B | | | LC |
| <i>Epuraea angustula</i> Sturm, 1844 | | X | | | N | B | | | VU |
| <i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | N | CK | X | X | CK | |
| Carpophilinae Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| <i>Carpophilus bifenestratus</i> Murray, 1864 | | X | | N | N | N | | N | |
| <i>Carpophilus bipustulatus</i> (Heer, 1841) | | X | CK | | | B | B | | LC |
| <i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | N | CK | | | |
| <i>Carpophilus marginellus</i> Motschulsky, 1858 | | CK | X | | | CK | | N | |
| <i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson, 1843 | X | X | | N | N | CK | | N | |
| <i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864 | X | X | X | | N | CK | | B | |
| <i>Carpophilus obsoletus</i> Erichson, 1843 | B | X | | | | CK | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pamano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I., | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Carpophilus quadrisignatus</i> Erichson, 1843 | | X | | | | CK | | | |
| <i>Carpophilus sexpustulatus</i> (Fabricius, 1792) | H | N | | | | | | | NT |
| <i>Urophorus humeralis</i> (Fabricius, 1798) | | N | | N | N | CK | | B | |
| <i>Urophorus rubripennis</i> (Heer, 1841) | H | N | | | CK | N | | | |
| Cryptarchinae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | CK | X | X | | LC |
| <i>Cryptarcha undata</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | CK | X | | | NT |
| <i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1777) | H | | | | | | | | VU |
| <i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | B | X | | NT |
| <i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761) | | | | | | B | X | | LC |
| Nitidulinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Aethina tumida</i> Murray, 1867 | | | | | | | | | B |
| <i>Amphotis marginata</i> (Fabricius, 1781) | X | | | | B | CK | X | | LC |
| <i>Cycramus luteus</i> (Fabricius, 1787) | | CK | | | | CK | | | LC |
| <i>Ipidia binotata</i> Reitter, 1875 | | | | | | X | B | B | VU |
| <i>Nitidula carnaria</i> (Schaller, 1783) | X | X | X | N | | X | X | | |
| <i>Nitidula flavomaculata</i> P. Rossi, 1790 | X | X | | | | CK | | | |
| <i>Nitidula rufipes</i> (Linnaeus, 1767) | CK | X | CK | CK | | CK | CK | N | |
| <i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | B | B | |
| <i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775) | CK | X | CK | | CK | CK | CK | CK | |
| <i>Pocadius ferrugineus</i> (Fabricius, 1775) | X | | | N | N | X | X | | |
| <i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758) | | X | X | | N | | X | N | LC |
| <i>Soronia oblonga</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | X | X | | CK | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825) | | | | | | | | | B |
| <i>Thalycra fervida</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | CK | CK | X | CK | |
| <i>Xenostrogylus arcuatus</i> Kiesenwetter, 1859 | X | X | X | | | CK | X | CK | |
| <i>Xenostrogylus lateralis</i> Chevrolat, 1861 | | | | | | | | | B |
| Cillaeinae Kirejtshuk & Audisio, 1986 | | | | | | | | | |
| <i>Colopterus abdominalis</i> (Erichson, 1843) | | | | | | | | | B |
| Meligethinae C.G. Thomson, 1859 Audisio et al., 2009 for ex genus Meligethes | | | | | | | | | |
| <i>Acanthogethes brevis</i> (Sturm, 1845) | H | | | | | X | X | B | |
| <i>Acanthogethes fuscus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | | | X | B | |
| <i>Acanthogethes reyi</i> (Guillebeau, 1885) | | | | | | X | | | |
| <i>Acanthogethes solidus</i> (Kugelann, 1794) | | | | | | X | | | |
| <i>Afrogethes buduensis</i> (Ganglbauer, 1899) | CK | | | | | | | | B |
| <i>Afrogethes planiusculus</i> (Heer, 1841) | H | X | CK | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Astylogethes substrigosus</i> (Erichson, 1845) | H | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Brassicogethes aeneus</i> (Fabricius, 1775) | H | X | X | CK | CK | X | X | B | |
| <i>Brassicogethes anthracinus</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863) | H | | X | CK | CK | X | CK | CK | |
| <i>Brassicogethes arankae</i> (Audisio & De Biase, 2005) | | | | | | CK | | B | |
| <i>Brassicogethes coracinus</i> (Sturm, 1845) | | | | | | N | X | B | |
| <i>Brassicogethes erysimicola</i> (Audisio & De Biase, 2001) | | | | | CK | CK | CK | CK | |
| <i>Brassicogethes lunariae</i> (Audisio & De Biase, 1999) | | | | | CK | ! | | B | |
| <i>Brassicogethes matronalis</i> (Audisio & Spornraft, 1990) | | | | | CK | | | | |
| <i>Brassicogethes spornrafti</i> (Audisio, 1977) | | | | B | | B | | | |
| <i>Brassicogethes viridescens</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | CK | N | X | X | B | |
| <i>Clypeogethes lepidii</i> (L. Miller, 1851) | X | X | X | B | | X | | | |
| <i>Clypeogethes tener</i> (Reitter, 1873) | X | | | | | | | | |
| <i>Fabogethes brachialis</i> Erichson, 1845 | | | | | B | B | | | |
| <i>Fabogethes nigrescens</i> (Stephens, 1830) | H | X | CK | CK | | X | X | B | |
| <i>Genistogethes bidentatus</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863) | | | | | N | | | CK | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cryptophagus dentatus</i> (Herbst, 1793) | H | X | | N | | X | | B | LC |
| <i>Cryptophagus denticulatus</i> Heer, 1841 | H | X | X | N | B | X | X | CK | LC |
| <i>Cryptophagus distinguendus</i> Sturm, 1845 | N | | | | N | | | N | |
| <i>Cryptophagus dorsalis</i> C.R. Sahlberg, 1819 | | | | | | | | N | DD |
| <i>Cryptophagus falcozi</i> Roubal, 1927 | | | | | CK | CK | | | DD |
| <i>Cryptophagus fasciatus</i> Kraatz, 1852 | N | X | | | | | | CK | LC |
| <i>Cryptophagus jakowlewi</i> Reitter, 1888 | | X | | | | | | | LC |
| <i>Cryptophagus labilis</i> Erichson, 1846 | | | | | | CK | N | | VU |
| <i>Cryptophagus laticollis</i> P.H. Lucas, 1846 | H | X | | | N | N | CK | N | LC |
| <i>Cryptophagus lycoperdi</i> (Scopoli, 1763) | X | CK | | CK | N | | | CK | |
| <i>Cryptophagus micaceus</i> Rey, 1889 | | | N | | N | | | | |
| <i>Cryptophagus pallidus</i> Sturm, 1845 | X | X | X | B | CK | X | X | B | LC |
| <i>Cryptophagus parallelus</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | | | | N | | | | DD |
| <i>Cryptophagus populi</i> Paykull, 1800 | CK | CK | | | | | | | DD |
| <i>Cryptophagus pubescens</i> Sturm, 1845 | H | | | | B | | | CK | |
| <i>Cryptophagus puncticollis</i> P.H. Lucas, 1846 | X | X | | | B | CK | | | DD |
| <i>Cryptophagus ruficornis</i> Stephens, 1830 | H | | | | N | | | | LC |
| <i>Cryptophagus saginatus</i> Sturm, 1845 | | CK | | | N | X | X | CK | |
| <i>Cryptophagus scanicus</i> (Linnaeus, 1758) | H | CK | X | CK | B | X | X | CK | LC |
| <i>Cryptophagus schroeteri</i> Reitter, 1912 | | | | | | | | B | DD |
| <i>Cryptophagus setulosus</i> Sturm, 1845 | | | | | CK | | | | DD |
| <i>Cryptophagus sporadum</i> Bruce, 1934 | X | | | | | | | | DD |
| <i>Cryptophagus uncinatus</i> Stephens, 1830 | H | CK | X | CK | CK | N | | CK | LC |
| <i>Henoticus serratus</i> (Gyllenhal, 1808) | H | X | | | | | X | | LC |
| <i>Micrambe abietis</i> (Paykull, 1798) | | | | | | N | X | B | DD |
| <i>Micrambe ulicis</i> (Stephens, 1830) | H | X | | | | N | | CK | |
| <i>Micrambe umbripennis</i> (Reitter, 1888) | | | | | | | | B | DD |
| <i>Micrambe woodroffei</i> C. Johnson, 2007 | CK | X | | N | | N | CK | CK | |
| <i>Paramecosoma melanocephalum</i> (Herbst, 1793) | | | | | | CK | | N | LC |
| <i>Pteryngium crenulatum</i> (Erichson, 1846) | | | | | | CK | | | LC |
| Telmatophilinae Jacquelin du Val, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Telmatophilus brevicollis</i> Aubé, 1862 | | B | X | | | | | | |
| <i>Telmatophilus caricis</i> (A.G. Olivier, 1790) | | X | X | | | | | CK | |
| <i>Telmatophilus typhae</i> (Fallén, 1802) | | B | X | | | | | N | |
| Atomariinae LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| Atomariini LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Atomaria affinis</i> (R.F. Sahlberg, 1834) | CK | | | | | CK | | | |
| <i>Atomaria analis</i> Erichson, 1846 | H | | N | CK | CK | N | | N | |
| <i>Atomaria apicalis</i> Erichson, 1846 | H | X | X | | B | | X | | |
| <i>Atomaria atricapilla</i> Stephens, 1830 | H | N | CK | CK | N | CK | CK | CK | |
| <i>Atomaria gibbula</i> Erichson, 1846 | | | | | CK | | | | |
| <i>Atomaria gravidula</i> Erichson, 1846 | | | N | N | | N | | | |
| <i>Atomaria gutta</i> Newman, 1834 | | X | | | | | | | |
| <i>Atomaria impressa</i> Erichson, 1846 | | | | | | | | CK | |
| <i>Atomaria linearis</i> Stephens, 1830 | | | X | | | | | | DD |
| <i>Atomaria nigripennis</i> (Kugelann, 1794) | | | | | N | | | | |
| <i>Atomaria nigrirostris</i> Stephens, 1830 | H | N | X | N | N | CK | CK | CK | LC |
| <i>Atomaria nigriventris</i> Stephens, 1830 | CK | | | | CK | | CK | | |
| <i>Atomaria ornata</i> Heer, 1841 | | | | | | N | | CK | |
| <i>Atomaria pallidipennis</i> Holdhaus, 1903 | | N | | | N | | | | |
| <i>Atomaria parvula</i> Reitter, 1875 [E] | | | | | CK | CK | | | |
| <i>Atomaria pulchra</i> Erichson, 1846 | | | X | | | | | | |
| <i>Atomaria puncticollis</i> C.G. Thomson, 1868 | | | | | CK | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Atomaria pusilla</i> (Paykull, 1798) | H | | X | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Atomaria rubida</i> Reitter, 1875 | X | X | | | | | CK | | |
| <i>Atomaria scutellaris</i> Motschulsky, 1849 | H | X | CK | CK | CK | N | X | N | |
| <i>Atomaria slavonica</i> C. Johnson, 1971 | | X | | | CK | X | | CK | |
| <i>Atomaria testacea</i> Stephens, 1830 | H | X | X | N | B | X | X | CK | |
| <i>Curelius exiguus</i> (Erichson, 1846) | CK | X | X | | N | | | CK | LC |
| <i>Curelius japonicus</i> (Reitter, 1878) | | N | | | N | | | CK | |
| <i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798) | X | X | X | | CK | CK | X | CK | |
| <i>Ephistemus reitteri</i> Casey, 1900 | | | N | | N | | | | |
| <i>Ootypus globosus</i> Walzl, 1838 | | | X | | | | | N | |
| Hypocoprinae Reitter, 1879 | | | | | | | | | |
| <i>Hypocoprus lathridioides</i> Motschulsky, 1839 | | | | | B | | | | |
| SILVANIDAE Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Brontinae Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Brontini Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Halstead, Löbl & Jelínek in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Uleiota planatus</i> (Linnaeus, 1761) | H | X | X | | | X | X | N | LC |
| Telephanini LeConte, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Psammoeceus bipunctatus</i> (Fabricius, 1792) | X | X | X | | | X | | N | |
| Silvaninae Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Ahasverus advena</i> (Walzl, 1834) | X | X | X | N | N | X | | N | |
| <i>Airaphilus calabricus</i> Obenberger, 1914 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Airaphilus elongatus</i> (Gyllenhal, 1813) | X | X | X | N | N | | | N | |
| <i>Airaphilus talpa</i> (Kraatz, 1862) [E] | B | B | | | | | | | |
| <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | N | X | | B | |
| <i>Silvanus unidentatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | X | N | B | X | X | N | LC |
| CUCUJIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Wegrzynowiec in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Cucujus cinnaberinus</i> (Scopoli, 1763) | | | | | | B | X | B | VU |
| <i>Cucujus haematodes</i> (Erichson, 1845) | | | | | | B | B | B | EN |
| <i>Cucujus tulliae</i> Bonacci, Mazzei, Horák & Brandmayr, 2012 [E] | | | | | | | B | | EN |
| <i>Pediacus dermestoides</i> (Fabricius, 1792) | H | | N | | B | X | B | | NT |
| PHALACRIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Phalacrinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Švec in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Olibrus aenescens</i> Küster, 1852 | | | | B | | | | N | |
| <i>Olibrus aeneus</i> (Fabricius, 1792) | | B | | | | | | | |
| <i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807) | H | B | X | B | B | B | B | B | |
| <i>Olibrus bicolor</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | B | B | X | | |
| <i>Olibrus bimaculatus</i> Küster, 1848 | | | | | B | B | B | | |
| <i>Olibrus bisignatus</i> (Ménétriés, 1849) | | | | | | X | B | B | |
| <i>Olibrus castaneus</i> Baudi di Selve, 1870 | | B | | | B | B | N | N | |
| <i>Olibrus corticalis</i> (Panzer, 1797) | | | | | | | B | | |
| <i>Olibrus demarzoii</i> Švec & Angelini, 1996 | B | | | | | | | | |
| <i>Olibrus fallax</i> Flach, 1888 | | B | | | | | | N | |
| <i>Olibrus flavicornis</i> (Sturm, 1807) | H | | X | B | B | B | B | N | |
| <i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845 | H | B | X | | B | B | B | B | |
| <i>Olibrus millefolii</i> (Paykull, 1800) | | | X | B | N | B | B | N | |
| <i>Olibrus pygmaeus</i> (Sturm, 1807) | H | B | | B | B | B | | | |
| <i>Olibrus reitteri</i> Flach, 1888 | | B | X | | | B | | | |
| <i>Olibrus stierlini</i> Flach, 1888 | H | | X | N | N | B | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Phalacrus corruscus</i> (Panzer, 1797) | | B | X | B | B | B | B | B | |
| <i>Phalacrus fimetarius</i> (Fabricius, 1775) | H | B | X | B | B | N | | N | |
| <i>Stilbus atomarius</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | | | | | | |
| <i>Stilbus oblongus</i> (Erichson, 1845) | | | N | | | B | | | |
| <i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797) | H | B | X | B | N | B | | N | |
| <i>Tolyphus granulatus</i> (Guérin-Méneville, 1834) | | | X | | B | B | | N | |
| <i>Tolyphus punctulatus</i> Rosenhauer, 1856 | X | X | | | B | X | | | |
| LAEMOPHLOEIDAE Ganglbauer, 1899 | | | | | | | | | |
| Laemophloeinae Ganglbauer, 1899 | | | | | | | | | |
| Wegrzynowicz in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007 | | | | | | | | | |
| <i>Cryptolestes capensis</i> (Waltl, 1834) | X | X | | | | | | | |
| <i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1839) | H | X | | | B | N | | N | NT |
| <i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831) | H | X | | | CK | X | X | N | LC |
| <i>Cryptolestes fractipennis</i> (Motschulsky, 1845) | X | B | | N | B | B | X | | LC |
| <i>Cryptolestes spartii</i> (Curtis, 1834) | | X | | | | X | | N | LC |
| <i>Laemophloeus monilis</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Laemophloeus nigricollis</i> P.H. Lucas, 1849 | | B | X | | | B | | | NT |
| <i>Leptophloeus juniperi</i> (Grouvelle, 1874) | B | X | | | | | | | LC |
| <i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| CYBOCEPHALIDAE Jacquelin du Val, 1858 | | | | | | | | | |
| Jelinek & Audisio in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Cline et al., 2014 | | | | | | | | | |
| <i>Cybocephalus rufifrons rufifrons</i> Reitter, 1874 | | B | | | | N | | N | |
| COCCINELLOIDEA Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| BOTHRIDERIDAE Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Bothriderinae Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Ślipiński in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Bothrideres bipunctatus</i> (Gmelin, 1790) | X | | | | B | X | X | B | NT |
| <i>Ogmoderes angusticollis</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1862) | | | | | N | | | | NT |
| TEREDIDAE Seidlitz, 1888 | | | | | | | | | |
| Anommatinae Ganglbauer, 1899 | | | | | | | | | |
| Ślipiński in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Anommatus duodecimstriatus</i> (P.W.J. Müller, 1821) | H | X | | | N | | | N | |
| Teredinae Seidlitz, 1888 | | | | | | | | | |
| <i>Oxylaemus cylindricus</i> (Creutzer, 1796) | X | | | N | | X | | N | NT |
| <i>Teredus cylindricus</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | | N | X | | N | LC |
| CERYLONIDAE Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Ceryloninae Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Ślipiński in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Cerylon fagi</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1867 | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830 | H | | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cerylon histeroideus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cerylon impressum</i> Erichson, 1845 | | | | | N | | | | NT |
| <i>Philothermus evanescens</i> (Reitter, 1876) | H | N | | | N | X | X | | NT |
| <i>Philothermus semistriatus</i> (Perris, 1865) | H | X | N | | N | X | | N | LC |
| LATRIDIIDAE Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| Latridiinae Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| Latridiini Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| Johnson in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015; Otero & Lopez, 2016; Rucker, 2018 | | | | | | | | | |
| <i>Cartodere constricta</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | | X | | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839) | H | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Dienerella anatolica</i> (Mannerheim, 1844) | N | B | N | | B | N | | B | LC |
| <i>Dienerella angelinii</i> Rucker, 1998 [E] | | | | N | B | B | B | B | |
| <i>Dienerella clathrata</i> (Mannerheim, 1844) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Dienerella elegans</i> (Aubé, 1850) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Dienerella elongata</i> (Curtis, 1830) | H | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Dienerella parilis</i> (Rey, 1889) | X | | B | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Dienerella polyhymnia</i> Rucker & Poggi, 2013 | B | | B | B | B | B | B | B | LC |
| <i>Dienerella ruficollis</i> (Marsham, 1802) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Dienerella siciliana</i> Vincent, 1990 [E] | | | | | | | X | | DD |
| <i>Enicmus atriceps</i> V. Hansen, 1962 | | | | | | | | B | DD |
| <i>Enicmus brevicornis</i> (Mannerheim, 1844) | X | X | | | | X | X | B | LC |
| <i>Enicmus fungicola</i> C.G. Thomson, 1868 | X | X | | | | | | B | LC |
| <i>Enicmus histrio</i> Joy & Tomlin, 1910 | | X | X | | B | X | | B | LC |
| <i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793) | H | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Enicmus testaceus</i> (Stephens, 1830) | X | | | | B | B | X | B | LC |
| <i>Enicmus transversus</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Latridius assimilis</i> (Mannerheim, 1844) | | | | | | | | B | DD |
| <i>Latridius brevicollis</i> (C.G. Thomson, 1868) | X | X | | | B | X | X | B | DD |
| <i>Latridius consimilis</i> (Mannerheim, 1844) | | | | | B | X | | N | LC |
| <i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | X | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Latridius porceatus</i> Herbst, 1793 | B | | X | N | B | X | | | |
| <i>Metophthalmus solarii</i> Binaghi, 1946 | | | | | B | | | B | DD |
| <i>Revelieria genei</i> (Aubé, 1850) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827) | | B | | | B | | | B | LC |
| <i>Stephostethus productus</i> (Rosenhauer, 1856) | | X | | | | | | | DD |
| Corticariinae Curtis, 1829 | | | | | | | | | |
| <i>Corticaria crenulata</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | N | | | | LC |
| <i>Corticaria cucujiformis</i> Reitter, 1880 | | X | B | | | | | | DD |
| <i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827) | | | X | | B | | | N | LC |
| <i>Corticaria fagi</i> Wollaston, 1854 | | | X | | | | | | |
| <i>Corticaria fulva</i> (Comolli, 1837) | X | | | | | X | | | LC |
| <i>Corticaria laertes</i> Rucker, 2006 | | B | B | | | N | | | |
| <i>Corticaria obscura</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Corticaria olympiaca</i> Reitter, 1875 | H | | | | | | | | |
| <i>Corticaria pineti</i> Lohse, 1960 | X | X | | | | | | | LC |
| <i>Corticaria pubescens</i> (Gyllenhal, 1827) | H | X | | | | N | | B | LC |
| <i>Corticaria saginata</i> Mannerheim, 1844 | | | B | | | | | | LC |
| <i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798) | | X | | | N | X | X | B | LC |
| <i>Corticarina curta</i> (Wollaston, 1854) | N | N | N | | N | N | | N | |
| <i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827) | X | X | X | | | | | B | LC |
| <i>Corticinara gibbosa</i> (Herbst, 1793) | H | X | X | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Melanophthalma distinguenda</i> (Comolli, 1837) | H | B | X | N | B | B | X | B | LC |
| <i>Melanophthalma extensa</i> Rey, 1889 | | B | | | B | | | | |
| <i>Melanophthalma fuscipennis</i> (Mannerheim, 1844) | H | X | X | N | B | X | | B | LC |
| <i>Melanophthalma maura</i> Motschulsky, 1866 | | | B | | B | | | B | LC |
| <i>Melanophthalma parvicollis</i> (Mannerheim, 1844) | | B | | | | B | | | |
| <i>Melanophthalma rispini</i> Rucker & C. Johnson, 2007 | | B | | | | | | | |
| <i>Melanophthalma sericea</i> (Mannerheim, 1844) | | X | X | | | | | | LC |
| <i>Melanophthalma suturalis</i> (Mannerheim, 1844) | | B | X | N | B | | X | B | LC |
| <i>Melanophthalma taurica</i> (Mannerheim, 1844) | X | X | X | | B | X | X | N | LC |
| <i>Melanophthalma transversalis</i> (Gyllenhal, 1827) | H | X | | | | | | | |
| <i>Migneauxia crassiuscula</i> (Aubé, 1850) | | X | X | N | B | N | | B | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Migneauxia lederi</i> Reitter, 1875 | | | | | | | | B | |
| <i>Migneauxia otto</i> C. Johnson, 2007 | | | | | N | | | N | |
| ALEXIIDAE Imhoff, 1856 | | | | | | | | | |
| Tomaszewska in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Sphaerosoma globosum</i> (Sturm, 1807) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Sphaerosoma reitteri</i> (Ormay, 1888) | | | | N | N | N | | B | LC |
| <i>Sphaerosoma solaris</i> Reitter, 1904 [E] | N | | | B | N | N | X | N | LC |
| <i>Sphaerosoma sparsum</i> Reitter, 1909 [E] | N | | | N | N | N | N | B | LC |
| <i>Sphaerosoma vallombrosae</i> (Reitter, 1885) [E] | N | | | | N | N | | N | LC |
| CORYLOPHIDAE LeConte, 1852 | | | | | | | | | |
| Corylophinae LeConte, 1852 | | | | | | | | | |
| Corylophini LeConte, 1852 | | | | | | | | | |
| Bowstead in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Corylophus cassidoides</i> (Marsham, 1802) | | X | X | | | N | | | |
| <i>Corylophus sublaevipennis</i> Jacquelin du Val, 1859 | H | X | | | | N | | | DD |
| Parmulini Poey, 1854 | | | | | | | | | |
| <i>Arthrolips convexuscula</i> (Motschulsky, 1849) | | B | X | N | N | N | | N | |
| <i>Arthrolips hetschkoi</i> (Reitter, 1913) | | | | | | B | | | |
| <i>Arthrolips nana</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | | | | | X | X | | DD |
| <i>Arthrolips obscura</i> (C.R. Sahlberg, 1833) | X | N | | | N | B | X | B | DD |
| <i>Arthrolips picea</i> (Comolli, 1837) | H | B | X | N | N | N | | B | |
| <i>Clypastraea reitteri</i> Bowstead, 1999 | | | | | B | B | N | B | DD |
| Sericoderini Matthews, 1888 | | | | | | | | | |
| <i>Aposericoderus revelierei</i> Reitter, 1878 | | B | | | | X | | | |
| <i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827) | H | X | X | N | B | X | X | N | |
| Orthoperinae Jacquelin du Val, 1857 | | | | | | | | | |
| <i>Orthoperus aequalis</i> Sharp, 1885 | | B | | | | | | N | DD |
| <i>Orthoperus anxius</i> Mulsant & Rey, 1861 | | | X | | | | | | |
| <i>Orthoperus atomus</i> (Gyllenhal, 1808) | B | B | | | | | | | DD |
| <i>Orthoperus brunnipes</i> (Gyllenhal, 1808) | | | | | | N | | | |
| <i>Orthoperus corticalis</i> (L. Redtenbacher, 1845) | | | | | B | N | | B | DD |
| <i>Orthoperus nigrescens</i> Stephens, 1829 | H | | | | | | | | |
| Rypobiinae Paulian, 1950 | | | | | | | | | |
| Gloeosomatini Bowstead, 1999 | | | | | | | | | |
| <i>Gloeosoma velox</i> Wollaston, 1854 | B | N | | | | | | B | |
| Rypobiini Paulian, 1950 | | | | | | | | | |
| <i>Rypobius fiorianus</i> Matthews, 1886 | | | B | | | | | B | |
| ANAMORPHIDAE Strohecker, 1953 | | | | | | | | | |
| Tomaszewska in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Aclermyxa solaris</i> Reitter, 1904 [E] | | | X | B | B | N | | N | NT |
| <i>Mychothenus minutus</i> (Frivaldszky, 1877) | | | | | | N | | | NT |
| <i>Symbiotes gibberosus</i> (P.H. Lucas, 1846) | X | X | | N | | N | | N | LC |
| ENDOMYCHIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Endomychinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Tomaszewska in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758) | N | | | N | N | X | X | B | LC |
| Leiestinae C.G. Thomson, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Leiestes seminiger</i> (Gyllenhal, 1808) | | | | | | N | | B | VU |
| Lycoperdininae L. Redtenbacher, 1844 | | | | | | | | | |
| <i>Ancylopus melanocephalus</i> (A.G. Olivier, 1808) | X | X | | | | | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Dapsa opuntiae</i> Reitter, 1884 | H | X | N | B | B | B | B | B | |
| <i>Dapsa trimaculata</i> Motschulsky, 1835 | | X | | | | | | N | |
| <i>Lycoperdina bovistae</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Lycoperdina validicornis</i> Gerstaecker, 1858 | X | X | | | | X | X | N | VU |
| <i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| Merophysiinae Seidlitz, 1872 | | | | | | | | | |
| Merophysiini Seidlitz, 1872 | | | | | | | | | |
| Rücker & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015; Rücker, 2018 | | | | | | | | | |
| <i>Cholovocera attae</i> (Kraatz, 1858) | | | | | | N | | N | |
| <i>Cholovocera fleischeri</i> Reitter, 1902 | | B | | | | | | N | |
| <i>Cholovocera formicaria</i> Motschulsky, 1838 | H | | | | | | | B | |
| <i>Cholovocera punctata</i> Märkel, 1844 | | | | | B | N | | N | |
| <i>Merophysia formicaria</i> P.H. Lucas, 1852 | | | | | | N | | N | |
| <i>Merophysia oblonga</i> Kiesenwetter, 1872 | H | B | | | B | | | B | |
| Holopamecini Seidlitz, 1888 | | | | | | | | | |
| <i>Holopamecus caularum</i> (Aubé, 1843) | X | X | | | | X | | | |
| <i>Holopamecus depressus</i> Curtis, 1833 | | B | | | | | | | |
| <i>Holopamecus niger</i> (Aubé, 1843) | X | X | | | N | B | | B | |
| <i>Holopamecus ragusae</i> Reitter, 1875 | | B | | | | | | | |
| <i>Holopamecus singularis</i> (Beck, 1817) | | X | | | | | | | |
| MYCETAEIDAE Jacquelin du Val, 1857 | | | | | | | | | |
| Tomaszewska in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801) | N | | | | N | X | X | N | LC |
| COCCINELLIDAE Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| Coccinellinae Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| Chilocorini Mulsant, 1846 | | | | | | | | | |
| Kovář in Cat. Pal. Col., vol. 4, 2007; Seago et al., 2011; Robertson et al., 2015 | | | | | | | | | |
| <i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | | X | X | N | |
| <i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758) | X | N | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777) | | X | N | | | N | | | |
| Coccidulini Mulsant, 1846 | | | | | | | | | |
| <i>Clitostethus arcuatus</i> (P. Rossi, 1794) | H | | | | | | X | | |
| <i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783) | X | N | X | | | | | N | |
| <i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783) | H | | X | N | | N | | | |
| <i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann, 1794) | H | | | | | X | | | |
| <i>Nephus bisignatus bisignatus</i> (Boheman, 1850) | | | X | | | | | | |
| <i>Nephus kiesenwetteri</i> (Mulsant, 1850) | | X | | | | | | | |
| <i>Nephus nigricans nigricans</i> (J. Weise, 1879) | X | | | N | | X | X | N | |
| <i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Nephus schatzmayri</i> Canepari & Tedeschi, 1977 | | | | B | B | | | | |
| <i>Rhizophobius litura</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Rhizophobius lophantae</i> (Blaisdell, 1892) | | | | | N | X | | N | |
| <i>Scymniscus anomus</i> (Mulsant & Rey, 1852) | N | X | B | | B | | | | |
| <i>Scymniscus helgae</i> (Fürsch, 1965) | | | | | | | | B | |
| <i>Scymniscus tristictulus</i> (J. Weise, 1929) | | | | | | | | B | |
| <i>Scymnus apetzi</i> Mulsant, 1846 | B | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus ater</i> Kugelann, 1794 | H | N | | | | | | | |
| <i>Scymnus auritus</i> Thunberg, 1795 | H | N | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus bivulnerus</i> Baudi di Selve, 1894 | | X | X | | | | | B | |
| <i>Scymnus femoralis</i> (Gyllenhal, 1827) | | | X | | | | | N | |
| <i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll, 1785) | H | | | | | | | | |
| <i>Scymnus flagellisiphonatus</i> (Fürsch, 1970) | | X | X | | | | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Scymnus fraxini</i> Mulsant, 1850 | | | X | | N | | | N | |
| <i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797 | | | X | | | | | | |
| <i>Scymnus impexus</i> Mulsant, 1850 | | | | | N | | | | |
| <i>Scymnus inderihensis</i> Mulsant, 1850 | | X | | | | | | | |
| <i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Scymnus limbatus</i> Stephens, 1832 | | | X | | | | | | |
| <i>Scymnus marginalis</i> (P. Rossi, 1794) | X | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Scymnus marinus</i> (Mulsant, 1850) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus pharaonis</i> Motschulsky, 1851 | | | X | | | | | N | |
| <i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus rufipes</i> (Fabricius, 1798) | | X | X | | | | | N | |
| <i>Scymnus sacium</i> (Roubal, 1927) | | | | | N | | | | |
| <i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Scymnus suffrianioides apetzoides</i> Capra & Fürsch, 1967 | N | | | | | | X | | |
| <i>Scymnus suturalis</i> Thunberg, 1795 | | | | | N | X | X | | |
| <i>Stethorus gilvifrons</i> (Mulsant, 1850) | H | X | X | | N | N | | | |
| <i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797) | X | X | X | N | N | X | | | |
| Coccinellini Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| <i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | | X | X | | |
| <i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | N | |
| <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Ceratomegilla undecimnotata</i> (D.H. Schneider, 1792) | X | | X | B | | | X | | |
| <i>Coccinella hieroglyphica hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | X | | |
| <i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Coccinella undecimpunctata undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758 | H | | | | | | | | |
| <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Halysia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | X | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763) | X | X | X | N | | X | X | | |
| <i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | | | X | X | | |
| <i>Myzia oblongoguttata oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| <i>Oenopia conglobata conglobata</i> (Linnaeus, 1758) | H | N | X | N | N | X | X | | |
| <i>Oenopia doublieri</i> (Mulsant, 1846) | H | X | | | | N | | | |
| <i>Oenopia lyncea agnata</i> (Rosenhauer, 1847) | | | | N | | | | | |
| <i>Oenopia lyncea lyncea</i> (A.G. Olivier, 1808) | X | | X | | N | X | X | N | |
| <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | N | |
| <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | H | X | X | | N | X | X | B | |
| Diomini R.D. Gordon, 2000 | | | | | | | | | |
| <i>Diomus rubidus</i> (Motschulsky, 1837) | X | X | | | | | | N | |
| Epilachnini Mulsant, 1850 | | | | | | | | | |
| <i>Chnootriba elaterii elaterii</i> (P. Rossi, 1794) | | X | | | | | | | |
| <i>Henosepilachna vigintioctomaculata</i> Motschulsky, 1858 | H | | | | | | | B | |
| <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| Hyperaspidiini Mulsant, 1846 | | | | | | | | | |
| <i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783) | X | | | | N | | | | |
| <i>Hyperaspis concolor</i> (Suffrian, 1843) | | | X | N | | B | X | B | |
| <i>Hyperaspis duvergeri</i> Fürsch, 1985 | X | X | X | | | | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Hyperaspis peezi</i> Fürsch, 1976 | | | | | | B | B | B | |
| <i>Hyperaspis stigma</i> (A.G. Olivier, 1808) | | N | X | | | | | | |
| Noviini Mulsant, 1850 | | | | | | | | | |
| <i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850) | | X | | | | | | | |
| Platynaspidini Mulsant, 1846 | | | | | | | | | |
| <i>Platynaspis luteorubra</i> Goeze, 1777 | | X | X | N | N | X | X | | |
| TENEBRIONOIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| MYCETOPHAGIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Mycetophaginae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Mycetophagini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Nikitsky in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Litargus balteatus</i> Leconte, 1856 | N | | | | N | N | N | N | |
| <i>Litargus coloratus</i> Rosenhauer, 1856 | X | X | | | | | | | NT |
| <i>Litargus connexus</i> (Geoffroy, 1785) | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1787) | H | | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Mycetophagus fulvicollis</i> Fabricius, 1792 | | N | | | | | | | NT |
| <i>Mycetophagus quadriguttatus</i> P.W.J. Müller, 1821 | | | | N | | | | | LC |
| <i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1760) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Pseudotriphyllus suturalis</i> (Fabricius, 1801) | | X | | | | | X | | NT |
| <i>Triphyllus bicolor</i> (Fabricius, 1777) | X | | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Typhaeola umbrata</i> (Baudi di Selve, 1870) | | N | | N | N | B | | B | LC |
| Berginiinae Lend, 1920 | | | | | | | | | |
| <i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854 | X | X | X | N | | N | X | N | LC |
| Esarcinae Reitter, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Esarcus fiorii</i> Reitter, 1887 [E] | | N | | | | | | B | VU |
| CIIDAE Leach, 1819 | | | | | | | | | |
| Ciinae Leach, 1819 | | | | | | | | | |
| Ciini Leach, 1819 | | | | | | | | | |
| Jelinek in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008; Reibnitz et al., 2013 | | | | | | | | | |
| <i>Cis bidentatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | | | | N | LC |
| <i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cis castaneus</i> (Herbst, 1793) | X | N | N | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cis comptus</i> Gyllenhal, 1827 | H | X | | N | N | X | | | LC |
| <i>Cis dentatus</i> Mellié, 1849 | | | | | | X | | | LC |
| <i>Cis fissicollis</i> Mellié, 1849 | | | X | | N | N | | | LC |
| <i>Cis glabratus</i> Mellié, 1849 | | | | | | N | | | LC |
| <i>Cis hanseni</i> A. Strand, 1965 | N | | | | N | N | | | VU |
| <i>Cis jacquemartii</i> Mellié, 1849 | | | | | | N | | | LC |
| <i>Cis lineatocribratus</i> Mellié, 1849 | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cis micans</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Cis pygmaeus pygmaeus</i> (Marsham, 1802) | X | | | | | | | | VU |
| <i>Cis quadridentulus</i> Perris, 1874 | | N | | | | | | | LC |
| <i>Cis rugulosus</i> Mellié, 1849 | | X | | | N | N | | | LC |
| <i>Cis vestitus</i> Mellié, 1849 | H | X | | | | X | X | N | LC |
| <i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Ennearthron palmi</i> Lohse, 1966 | | | | | | N | | | |
| <i>Ennearthron pruinosulum</i> (Perris, 1864) | | | | | | N | | | VU |
| <i>Orthocis almi</i> (Gyllenhal, 1813) | | | | | | N | | | |
| <i>Orthocis reflexicollis</i> (Abeille de Perrin, 1874) | | N | | | | | | | VU |
| <i>Strigocis bicornis</i> (Mellié, 1849) | H | X | | N | | X | X | N | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Sulcaxis bidentulus</i> (Rosenhauer, 1847) | | | | | | N | | | LC |
| <i>Sulcaxis fronticornis</i> (Panzer, 1805) | | X | | | | N | | | LC |
| <i>Sulcaxis nitidus</i> (Fabricius, 1792) | | X | | N | | X | X | N | LC |
| Orophini C.G. Thomson, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827) | | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Octotemnus mandibularis</i> (Gyllenhal, 1813) | X | | | | | | | | VU |
| <i>Ropalodontus baudueri</i> Abeille de Perrin, 1874 | | | | | | | | N | EN |
| <i>Ropalodontus novorossicus</i> Reitter, 1902 | | X | | | | | | | EN |
| <i>Ropalodontus perforatus</i> (Gyllenhal, 1813) | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Xylographus bostrichoides</i> (Dufour, 1843) | X | X | | | N | X | | | |
| TETRATOMIDAE Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Eustrophinae Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| Eustrophini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| Nikitsky in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Eustrophus dermestoides</i> (Fabricius, 1792) | | | | | N | | | N | NT |
| Hallomeninae Mulsant, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel, 1790) | | | | | | | X | N | NT |
| MELANDRYIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Melandryinae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Dircaeni Mulsant, 1856 | | | | | | | | | |
| Nikitsky & Pollock in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Abdera quadrifasciata</i> (Curtis, 1829) | X | X | | | | X | X | N | NT |
| <i>Phloiotrya tenuis</i> (Hampe, 1850) | X | X | | | | B | X | N | NT |
| Melandryini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Melandrya barbata</i> (Fabricius, 1787) | | | | | | B? | B | | NT |
| <i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1760) | X | | | | N | B | X | B | NT |
| Orchesiini Mulsant, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1793) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Orchesia undulata</i> Kraatz, 1853 | | | | | | X | X | N | LC |
| Serropalpini Latreille, 1829 | | | | | | | | | |
| <i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783) | | | | | | X | | B | NT |
| Xylitini C.G. Thomson, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Rushia parreyssii</i> (Mulsant, 1856) | | | | | | | X | B | NT |
| Osphyinae Mulsant, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Conopalpus brevicollis</i> Kraatz, 1855 | | | | | | | | B | NT |
| <i>Osphyia bipunctata</i> (Fabricius, 1775) | | | | N | N | X | X | | LC |
| MORDELLIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Mordellinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Mordellini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Horák in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Falsopseudotomoxia argyroleura</i> (Franciscolo, 1942) | B | | | | | | | | |
| <i>Iberomorda sulcicauda</i> (Mulsant, 1856) | | | | | | | B | | |
| <i>Mediimorda bipunctata</i> (Germar, 1827) | H | X | | | | X | | | |
| <i>Mordella aculeata</i> Linnaeus, 1758 | H | | | | | | | B | |
| <i>Mordella holomelaena holomelaena</i> Apfelbeck, 1914 | X | | | | | X | X | | |
| <i>Mordella leucaspis leucaspis</i> Küster, 1849 | X | X | | | | X | X | | |
| <i>Mordella meridionalis</i> Méquignon, 1946 | | | | | | X | | | |
| <i>Mordella purpurascens</i> Apfelbeck, 1914 | X | | | | | X | | | |
| <i>Mordellaria aurofasciata</i> (Comolli, 1837) | | | | | | B | | | |
| <i>Variimorda briantea</i> (Comolli, 1837) | X | X | | | B | N | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Variimorda ragusai</i> (Emery, 1876) | X | X | | | B | B | X | | |
| <i>Variimorda villosa</i> (Schrank, 1781) | | X | B | | | X | X | | |
| Mordellistenini Ermisch, 1941 | | | | | | | | | |
| <i>Mordellistena austriaca</i> Schilsky, 1899 | | X | | | | X | X | | |
| <i>Mordellistena brevicauda</i> (Boheman, 1849) | H | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistena emeryi</i> Schilsky, 1895 | | X | | | | X | X | | |
| <i>Mordellistena episternalis</i> Mulsant, 1856 | H | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistena falsoparvula</i> Ermisch, 1956 | | | | | B | B | | | |
| <i>Mordellistena humeralis</i> Fabricius, 1758 | H | | N | | | | | | |
| <i>Mordellistena micans</i> (Germar, 1817) | H | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistena minima</i> A. Costa, 1854 | | X | | | | X | X | | |
| <i>Mordellistena neuwaldeggiana</i> (Panzer, 1796) | | X | | | | | | | |
| <i>Mordellistena paraepisternalis</i> Ermisch, 1965 | N | X | | | | | | | |
| <i>Mordellistena paraintersecta</i> Ermisch, 1956 | X | | | | B | | | | |
| <i>Mordellistena parvula</i> (Gyllenhal, 1827) | X | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistena pseudohirtipes pseudohirtipes</i> Ermisch, 1965 | X | X | | | | X | X | | |
| <i>Mordellistena pumila</i> (Gyllenhal, 1810) gr. | H | X | | B | | X | X | | |
| <i>Mordellistena stenidea</i> Mulsant, 1856 | | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistena subepisternalis</i> Ermisch, 1965 | X | X | | | | | | | |
| <i>Mordellistena tarsata</i> Mulsant, 1856 | X | | | | | X | | | |
| <i>Mordellistenula perrisi</i> (Mulsant, 1857) | | | | | | X | X | | |
| <i>Mordellistenula planifrons</i> Stehegoleva-Barovskaya, 1930 | | | | | | | X | | |
| <i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775) | | X | | | | | | | LC |
| <i>Mordellochroa pulchella</i> (Mulsant & Rey, 1859) | B | | | | | | | | |
| Stenaliini Franciscolo, 1955 | | | | | | | | | |
| <i>Stenalia bisecta</i> Baudi di Selve, 1883 [E] | | B | | | | | | | |
| <i>Stenalia testacea testacea</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | | N | B | B | |
| RIPIPHORIDAE Gemminger & Harold, 1870 | | | | | | | | | |
| Ptilophorinae Gerstaecker, 1855 | | | | | | | | | |
| Batelka in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Ptilophorus dufourii</i> (Latreille, 1817) | H | X | | | N | | | | N |
| Ripiphorinae Gemminger & Harold, 1870 | | | | | | | | | |
| Ripiphorini Reitter, 1911 | | | | | | | | | |
| <i>Rhipiphorus subdipterus</i> Bosc, 1792 | | | | | | | | | B |
| ZOPHERIDAE Solier, 1834 | | | | | | | | | |
| Zopherinae Solier, 1834 | | | | | | | | | |
| Pycnomerini Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| Šlipiňský & Schuh in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Pycnomerus italicus</i> (Ganglbauer, 1899) | | N | | N | N | N | X | N | EN |
| <i>Pycnomerus terebrans</i> (A.G. Olivier, 1790) | | | | | | X | | | NT |
| Colydiinae Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| Colydiini Erichson, 1842 | | | | | | | | | |
| <i>Aulonium ruficorne</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | | | | | | LC |
| <i>Colydium elongatum</i> (Fabricius, 1787) | | | | | N | N | B | | LC |
| <i>Colydium filiforme</i> Fabricius, 1792 | X | | | | | | X | N | NT |
| Synchitini Erichson, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775) | H | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Colobius hirtus</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | | | X | | N | NT |
| <i>Corticus celtis</i> (Germar, 1824) | H | X | X | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Coxelus pictus</i> (J. Sturm, 1807) | | | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Diodesma denticincta</i> Abeille de Perrin, 1899 | | | | N | B | N | N | N | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Endophloeus markovichianus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | H | X | | | N | X | X | N | NT |
| <i>Langelandia anophthalma</i> Aubé, 1842 | | N | | | N | N | | N | LC |
| <i>Langelandia ausonica</i> Obenberger, 1914 [E] | | N | | N | N | N | | N | CR |
| <i>Langelandia reitteri</i> Belon, 1882 | N | | | | N | | | N | NT |
| <i>Nosodomodes tuberculatus</i> (Germar, 1832) | | | | | N | N | | | DD |
| <i>Synchita mediolanensis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833 | | | | | N | | | | LC |
| <i>Synchita separanda</i> (Reitter, 1882) | N | | | | | | | | NT |
| <i>Synchita undata</i> Guérin-Méneville, 1844 | H | | | | | | | | NT |
| <i>Synchita variegata</i> Hellwig, 1792 | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Tarphius gibbulus</i> Erichson, 1845 [E] | X | | | N | N | X | X | N | NT |
| TENEBRIONIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Lagriinae Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| Belopini Reitter, 1917 | | | | | | | | | |
| Löbl, Merkl, Ando, Bouchard, Lillig, Masomutu & Schawaller in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Centorus elongatus ecalcaratus</i> (Seidlitz, 1896) | | | | | | | | N | |
| <i>Centorus crassipes crassipes</i> (Fischer von Waldheim, 1844) | X | | | | | | | | |
| Cossyphini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Cossyphus moniliferus moniliferus</i> Chevrolat, 1829 | | | | | | | | B | |
| <i>Cossyphus tauricus</i> Steven, 1832 | | X | | | | | | B | |
| Lagriini Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| Lagriina Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| Merkl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Lagria atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855 | X | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Lagria rugosula</i> Rosenhauer, 1856 | | | | | | | | B | |
| Pimeliinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Akidini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Akis trilineata</i> Herbst, 1799 | x | x | | | | | | B | |
| <i>Akis subterranea</i> Solier, 1836 | | | | | | | | B | |
| Asidini Fleming, 1821 | | | | | | | | | |
| Soldati in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Alphasida grossa grossa</i> (Solier, 1836) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Asida bayardi bayardi</i> Solier, 1836 [E] | B | | | B | B | X | | | |
| <i>Asida calabra</i> Leoni, 1909 [E] | | | | | | B | X | B | |
| <i>Asida fascicularis fiorii</i> Leoni, 1909 [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Asida goryi</i> Solier, 1836 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Asida novasiriensis</i> Grimm, 1985 [E] | | N | X | | | | | | |
| <i>Asida piligera</i> Leoni, 1909 [E] | B | | | | | | | | |
| Boromorphini Skopin, 1978 | | | | | | | | | |
| <i>Boromorphus italicus</i> Gardini, 2010 [E] | | | B | | | | | B | |
| Cnemeplatiini Jacquelin du Val, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Cnemeplatia atropos atropos</i> A. Costa, 1847 | X | X | | | N | | | N | |
| Elenophorini Solier, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Elenophorus italicus</i> (Ferrer, 2015) | | | | | | | | B | |
| Erodiini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Erodius siculus dalmatinus</i> Kraatz, 1865 | X | X | | | | | | | |
| <i>Erodius siculus neapolitanus</i> Solier, 1834 [E] | | | | | | | | B | |
| Pimeliini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Pimelia rugulosa apula</i> Gridelli, 1950 [E] | X | X | | | | | | | |
| <i>Pimelia rugulosa rugulosa</i> Germar, 1824 [E] | | | | | | B | X | B | |
| Stenosini Lacordaire, 1859 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Dichillus corsicus</i> (Solier, 1838) | | | | | | B | B | B | |
| <i>Dichillus minutus</i> (Solier, 1838) | | | | | B | | | | |
| <i>Dichillus pertusus</i> (Kiesenwetter, 1861) | | | | | | | | B | |
| <i>Eutagenia elvirae</i> Marcuzzi & Turchetto, 1982 [E] | | N | | | | | | | |
| <i>Stenosis brentoides brentoides</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Stenosis intermedia intermedia</i> (Solier, 1838) | B | B | | B | N | N | B | B | |
| Tentyriini Eschscholtz, 1831 | | | | | | | | | |
| <i>Pachychila dejeani dejeani</i> (Besser, 1832) | | N | | | | | | B | |
| <i>Pachychila italica</i> Ferrer, 2018 | x | x | | | | | | B | |
| <i>Tentyria grossa grossa</i> Besser, 1832 | | X | | | | | | B | |
| <i>Tentyria italica</i> Solier, 1835 | H | X | | B | | B | | B | |
| Tenebrioninae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Alphitobiini Reitter, 1917 | | | | | | | | | |
| <i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1796) | X | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Diaclina fagi</i> (Panzer, 1799) | | | | | N | | | | DD |
| <i>Diaclina testudinea</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | | X | | | | | | | EN |
| Blaptini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Blaptina Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Löbl, Nabozhenko & Merkl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Blaps gibba</i> Laporte, 1840 | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Blaps gigas</i> (Linnaeus, 1767) | B | X | | | | | | B | |
| <i>Blaps lethifera lethifera</i> Marsham, 1802 | | | | | | X | | | |
| <i>Blaps mucronata</i> Latreille, 1804 | X | X | | | | | | B | |
| Bolitophagini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Bolitophagina Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Bolitophagus interruptus</i> Illiger, 1800 | X | X | | | | X | X | | EN |
| <i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | | N | N | X | X | N | VU |
| <i>Eledona agricola</i> (Herbst, 1783) | | | | | N | | X | | NT |
| <i>Eledonoprius armatus</i> (Panzer, 1799) | B | | | | | | | | CR |
| <i>Eledonoprius serrifrons</i> (Reitter, 1890) | B | | | | | B | | | CR |
| Helopini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Cylindrinotina Espanol, 1956 | | | | | | | | | |
| Nabozhenko & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Nalassus dermestoides</i> (Illiger, 1798) | H | | | | | | | | LC |
| <i>Nalassus dryadophilus</i> (Mulsant, 1854) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Nalassus planipennis</i> (Küster, 1850) [E] | H | | | | | | | | LC |
| <i>Nalassus plebejus</i> (Küster, 1850) | | X | | N | | | | | CR |
| <i>Odocnemis exaratus</i> (Germar, 1817) | H | | | | | | | | LC |
| <i>Stenomax aeneus</i> (Scopoli, 1763) | X | | | N | X | X | N | | LC |
| <i>Xanthomus pallidus</i> (Curtis, 1830) | | X | | | | | | | |
| <i>Xanthomus pellucidus</i> (Mulsant & Rey, 1856) | | X | | | | | | | |
| Helopina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Accanthopus velikensis</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | H | X | X | B | N | X | X | B | LC |
| <i>Catomus rotundicollis</i> (Guérin-Méneville, 1825) | X | X | | | | | | B | |
| <i>Helops caeruleus caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Helops rossii</i> (Germar, 1817) | H | X | | | | | | B | LC |
| <i>Italohelops subchalybaeus</i> (Reitter, 1907) [E] | | X | | | | | X | | NT |
| <i>Probatiscus anthrax</i> (Seidlitz, 1896) [E] | | | | | | | | B | DD |
| <i>Probatiscus sphaericollis</i> (Küster, 1850) [E] | | N | X | | | | | B | NT |
| <i>Raiboscelis azureus azureus</i> (Brullé, 1832) | B | | | | | | | | DD |
| Melanimini Seidlitz, 1894 | | | | | | | | | |
| Iwan & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Melanimon tibialis tibialis</i> (Fabricius, 1781) | | X | | | | | | | |
| Opatrini Brullé, 1832 | | | | | | | | | |
| Opatrina Brullé, 1832 | | | | | | | | | |
| Iwan & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Ammobius rufus</i> (P.H. Lucas, 1846) | X | X | | | | | | | B |
| <i>Gonocephalum granulatum pusillum</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | | | X | X | | B |
| <i>Gonocephalum obscurum obscurum</i> (Küster, 1849) | | | | | | | | | B |
| <i>Gonocephalum prolixum</i> (Erichson, 1843) | H | | | | | | | | B |
| <i>Gonocephalum rusticum</i> (A.G. Olivier, 1811) | B | N | | | N | N | X | | B |
| <i>Opatroides punctulatus punctulatus</i> Brullé, 1832 | | | | | | | | | B |
| <i>Opatrum obesum</i> A.G. Olivier, 1811 | | X | | | | | | | B |
| <i>Opatrum sabulosum sculptum</i> Rey, 1892 | B | X | | | N | X | X | | B |
| <i>Opatrum verrucosum</i> Germar, 1817 | B | | | | B | X | | | B |
| Palorini Matthews, 2003 | | | | | | | | | |
| <i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Palorus ratzeburgii</i> (Wissmann, 1848) | | X | | | | | | | |
| <i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864) | | | | | N | | | | |
| Pedinini Eschscholtz, 1829 | | | | | | | | | |
| Dendarina Seidlitz, 1889 | | | | | | | | | |
| Iwan & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Dendarus dalmatinus</i> (Germar, 1824) | H | X | | | | | | | |
| <i>Dendarus lugens</i> (Mulsant & Rey, 1854) | | | | B | | X | X | B | |
| <i>Dendarus peslieri</i> Soldati, 2012 | x | | | | | | | | |
| Leichenina Mulsant, 1854 | | | | | | | | | |
| <i>Leichenum pictum</i> (Fabricius, 1801) | X | X | | | | | | | N |
| Melambiina Mulsant & Rey, 1854 | | | | | | | | | |
| <i>Allophylax picipes</i> (A.G. Olivier, 1811) | X | | | | | | | | B |
| Pedinina Eschscholtz, 1829 | | | | | | | | | |
| <i>Colpotus strigosus ganglbaueri</i> D'Amore Fracassi, 1907 | | | | | N | X | | | |
| <i>Colpotus strigosus ragusae</i> D'Amore Fracassi, 1907 | | X | | | | | | | B |
| <i>Colpotus strigosus strigosus</i> (A. Costa, 1847) | | | | | | | X | | |
| <i>Pedinus helopioides</i> Germar, 1814 | | | | | | | | | B |
| <i>Pedinus meridianus</i> Mulsant & Rey, 1853 | H | N | X | B | N | X | X | | N |
| <i>Pedinus ragusae</i> Baudi di Selve, 1876 | | | | | | | | | B |
| Scaurini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Scaurus striatus</i> Fabricius, 1792 | X | X | | | | | B | B | |
| <i>Scaurus tristis</i> A.G. Olivier, 1795 | B | | | | | | | B | |
| Tenebrionini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Neatus noctivagus</i> (Mulsant & Rey, 1853) | X | X | | | | X | X | | VU |
| <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus, 1758 | X | X | | | | X | | | B |
| <i>Tenebrio obscurus</i> Fabricius, 1792 | | X | | N | | X | | | B LC |
| Triboliini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Lyphia tetraphylla</i> (Fairmaire, 1856) | X | X | | | | | | | EN |
| Ulomini Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Uloma culinaris</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Uloma rufa</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | | | | | | | X | | EN |
| Diaperinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Crypticini Brullé, 1832 | | | | | | | | | |
| <i>Oochrotus unicolor ardoini</i> Canzoneri, 1961 [E] | H | X | X | | | | | | N |
| <i>Pseudoseriscius helvolus adriaticus</i> (Espanol, 1949) | X | | | | | | | | |
| <i>Pseudoseriscius helvolus helvolus</i> (Küster, 1852) | | | | | | | | | B |
| Diaperini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824) | | X | N | | N | N | X | | |
| <i>Diaperis boleti boleti</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Gnathocerus cornutus</i> (Fabricius, 1798) | X | X | | | | X | X | | |
| <i>Neomida haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | | N | X | X | N | EN |
| <i>Pentaphyllus chrysomeloides</i> (P. Rossi, 1792) | X | X | X | | N | N | X | N | EN |
| <i>Pentaphyllus testaceus</i> (Hellwig, 1792) | | N | | | N | | | | EN |
| <i>Platydemia europaeum</i> Laporte & Brullé, 1831 | | | | | | | X | | CR |
| <i>Platydemia violaceum</i> (Fabricius, 1790) | X | X | | | | | | | NT |
| Hypophlaeini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Corticeus bicolor</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | | | X | B | N | LC |
| <i>Corticeus fasciatus</i> Fabricius, 1790 | | | | | | X | | | LC |
| <i>Corticeus fraxini</i> (Kugelann, 1794) | | | | | | | X | | |
| <i>Corticeus pini</i> (Panzer, 1799) | X | X | | | | | X | B | LC |
| <i>Corticeus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783 | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| Myrmechixenini Jacquelin du Val, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Myrmechixenus vaporariorum</i> Guérin-Méneville, 1843 | | N | X | | N | N | N | N | |
| Phaleriini Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Phaleria acuminata acuminata</i> Küster, 1852 | X | X | | | | | | N | |
| <i>Phaleria bimaculata bimaculata</i> (Linnaeus, 1767) | | N | | | | | | B | |
| <i>Phtora crenata</i> Germar, 1836 | | X | | | | | | | |
| Scaphidemini Reitter, 1922 | | | | | | | | | |
| <i>Scaphidema metallicum metallicum</i> (Fabricius, 1792) | X | X | | N | N | X | X | N | LC |
| Trachyscelini Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Trachyscelis aphodioides aphodioides</i> Latreille, 1809 | X | X | | | | | | N | |
| Alleculinae Laporte, 1840 Alleculini Laporte, 1840 Alleculina Laporte, 1840 Novák & Pettersson in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Allecula morio</i> (Fabricius, 1787) | | | | | N | | | N | LC |
| <i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792) | | | N | | | | | | LC |
| <i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775) | | N | X | | | | | B | NT |
| Gonoderina Seidlitz, 1896 | | | | | | | | | |
| <i>Gonodera luperus luperus</i> (Herbst, 1783) | H | | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Gonodera metallica</i> (Küster, 1850) | H | | X | N | N | X | X | | |
| <i>Isomira genistae</i> (Rottenberg, 1871) [E] | | | | | N | N | | | |
| <i>Isomira icteropa</i> (Küster, 1852) | X | | | N | | X | X | N | |
| <i>Isomira marcida</i> Kiesenwetter, 1863 | X | X | X | | | X | X | | |
| <i>Isomira melanophthalma</i> (P.H. Lucas, 1846) | H | X | | | N | | | N | |
| <i>Isomira murina murina</i> (Linnaeus, 1758) | | | | B | | X | X | B | |
| <i>Isomira ochropus</i> (Küster, 1850) | | N | | | | | | N | |
| <i>Isomira testacea</i> Seidlitz, 1896 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Isomira umbellatarum</i> (Kiesenwetter, 1863) | | | | B | | | | | |
| <i>Pseudocistela ceramoides ceramoides</i> (Linnaeus, 1761) | | | X | | | X | X | N | NT |
| Mycetocharina Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Mycetochara axillaris axillaris</i> (Paykull, 1799) | X | | | | | | | | NT |
| <i>Mycetochara maura</i> (Fabricius, 1792) | | X | | | | | B | | LC |
| <i>Mycetochara quadrimaculata</i> (Latreille, 1804) | | X | | | | | | | LC |
| Cteniopodini Solier, 1835 | | | | | | | | | |
| <i>Cteniopus neapolitanus</i> Baudi di Selve, 1877 [E] | | X | | | N | N | | | NT |
| <i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | | | X | X | B | LC |
| <i>Cteniopus sulphuripes</i> (Germar, 1824) | X | | | | | | | | NT |
| <i>Megischia curvipes curvipes</i> (Brullé, 1832) | H | | | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Megischina armillata</i> (Brullé, 1832) | | | | | N | X | X | B | |
| <i>Omophilus dispar</i> A. Costa, 1847 [E] | X | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Omophilus flavipennis</i> Küster, 1849 | X | | | | | X | | | |
| <i>Omophilus lepturoides</i> (Fabricius, 1787) | X | X | | N | N | X | N | B | |
| <i>Omophilus longicornis</i> Bertolini, 1868 | | | | | | | X | | |
| <i>Omophilus picipes</i> (Fabricius, 1792) | | | | B | | X | X | N | |
| <i>Omophilus pubescens</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | X | X | B | |
| <i>Omophilus rugosicollis</i> (Brullé, 1832) | | | | | N | | | | |
| <i>Podonta italica</i> Baudi di Selve, 1877 [E] | H | X | X | N | N | X | | | |
| Stenochiinae Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Cnodalonini Gistel, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Ipthiminius italicus italicus</i> (Truqui, 1857) | X | | | | B | X | X | B | VU |
| <i>Menophilus cylindricus cylindricus</i> (Herbst, 1784) | | | | | N | X | X | N | NT |
| PROSTOMIDAE C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Schawaller in Cat. Pal. Col. Vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Prostomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801) | | | | | | N | | | LC |
| OEDEMERIDAE Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| Calopodinae A. Costa, 1852 | | | | | | | | | |
| Švihla in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Sparedrus orsinii</i> A. Costa, 1852 [E] | | B | X | X | N | | | N | LC |
| Oedemerinae Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| Asclerini Semenov, 1894 | | | | | | | | | |
| <i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | N | X | X | B | LC |
| <i>Ischnomera cinerascens cinerascens</i> (Pandellé, 1867) | | | | N | N | X | X | | LC |
| <i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792) | | | | | N | N | | N | LC |
| <i>Ischnomera sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787) | | | | B | N | X | X | | LC |
| Ditylini Mulsant, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | N | X | X | B | LC |
| Nacerdini Mulsant, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Anogcodes ruficollis</i> (Fabricius, 1781) | | X | | N | N | X | | N | LC |
| <i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763) | | X | | | | | X | | LC |
| <i>Nacertes melanura</i> Linnaeus, 1758 | ! | N | | | | | | | LC |
| Oedemerini Latreille, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Oedemera atrata</i> W.L.E. Schmidt, 1846 | X | X | | B | N | X | X | B | |
| <i>Oedemera barbara</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | | N | N | X | B | |
| <i>Oedemera crassipes</i> Ganglbauer, 1881 | H | X | | B | N | X | X | N | |
| <i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827 | | X | | | | | | | |
| <i>Oedemera femoralis femoralis</i> A.G. Olivier, 1803 | | | | | N | X | | N | LC |
| <i>Oedemera femorata</i> (Scopoli, 1763) | B | X | N | B | B | X | X | B | |
| <i>Oedemera flavipes</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802) | X | | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Oedemera melanopyga</i> W.L.E. Schmidt, 1846 [E] | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Oedemera podagrariae podagrariae</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Oedemera pthysica</i> (Scopoli, 1763) | | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Oedemera simplex</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | B | X | X | B | |
| Stenostomini Mulsant, 1858 | | | | | | | | | |
| <i>Stenostoma rostratum septentrionale</i> Švihla, 2005 | X | X | | | | | | B | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| MELOIDAE Gyllenhal, 1810 | | | | | | | | | |
| Meloinae Gyllenhal, 1810 | | | | | | | | | |
| Cerocomini Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Bologna in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008; Bologna et al., 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Cerocoma schaefferi</i> (Linnaeus, 1758) | B | | X | B | B | X | X | B | |
| Epicautini Denier, 1935 | | | | | | | | | |
| <i>Epicauta rufidorsum</i> (Goeze, 1777) | B | | | | N | | B | B | |
| Lyttini Solier, 1851 | | | | | | | | | |
| <i>Lydus trimaculatus italicus</i> Kaszab, 1952 [E] | H | X | | B | B | B | | B | |
| <i>Lytta vesicatoria vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | B | X | X | B | |
| Mylabrini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Mylabris fabricii</i> Sumakov, 1924 | X | X | | B | B | X | X | B | |
| <i>Mylabris flexuosa</i> A.G. Olivier, 1811 | | | | | | X | X | | |
| <i>Mylabris obsoleta</i> Nowicki, 1872 [E] | B | B | X | B | B | B | B | | |
| <i>Mylabris quadripunctata quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767) | B | | | | B | B | B | B | |
| <i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781) | H | X | | B | B | X | X | B | |
| Meloini Gyllenhal, 1810 | | | | | | | | | |
| <i>Meloe apenninicus</i> Bologna, 1988 [E] | | | B | | | B | B | B | |
| <i>Meloe autumnalis autumnalis</i> A.G. Olivier, 1797 | B | X | | | N | | B | B | |
| <i>Meloe baudii</i> Leoni, 1907 | B | | | | | | B | | |
| <i>Meloe brevicollis brevicollis</i> Panzer, 1793 | X | | | B | | X | X | B | |
| <i>Meloe cavensis</i> L. Petagna, 1819 | | | | | | | | B | |
| <i>Meloe cicatricosus</i> Leach, 1815 | | | | B | B | B | | B | |
| <i>Meloe erythrocnemus</i> Pallas, 1782 | B | | | | | | B | B | |
| <i>Meloe ganglbaueri</i> Apfelbeck, 1905 | B | | | | | | | B | |
| <i>Meloe mediterraneus</i> G. Müller, 1925 | X | N | | | | | | B | |
| <i>Meloe proscarabaeus proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 | B | X | X | | | B | B | B | |
| <i>Meloe rugosus</i> Marsham, 1802 | | | | | | | X | | |
| <i>Meloe tuccius corrosus</i> Brandt & Erichson, 1832 [E] | | X | | | | | B | B | |
| <i>Meloe violaceus</i> Marsham, 1802 | H | | | | B | | B | | |
| Nemognathinae Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| Nemognathini Laporte, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Sitaris muralis</i> (Forster, 1771) | B | | | | | | | B | |
| <i>Stenoria apicalis apicalis</i> (Latreille, 1804) | B | | | | | | | | |
| <i>Zonitis flava</i> Fabricius, 1775 | H | X | X | | B | X | X | N | |
| <i>Zonitis immaculata</i> (A.G. Olivier, 1789) | H | X | | N | B | X | X | B | |
| <i>Zonitis nana</i> Ragusa, 1881 | | | | | | X | | | |
| MYCTERIDAE Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| Mycterinae Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Mycterus curculionoides</i> (Fabricius, 1781) | B | X | | | | N | X | N | |
| <i>Mycterus tibialis</i> Küster, 1850 | X | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Mycterus umbellatarum</i> (Fabricius, 1787) | X | | | | | | | | |
| PYROCHROIDAE Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| Pyrochroinae Latreille, 1807 | | | | | | | | | |
| Pollock & Young in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760) | | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Pyrochroa serraticornis kiesenwetteri</i> Fairmaire, 1849 | | | | | | | X | | NT |
| <i>Pyrochroa serraticornis serraticornis</i> Scopoli, 1763) | X | | | | N | X | | N | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| SALPINGIDAE Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| Agleninae Horn, 1878 | | | | | | | | | |
| Pollock & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Aglenus brunneus</i> (Gyllenhal, 1813) | X | X | X | | | X | | N | LC |
| Salpinginae Leach, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Lissodema denticolle</i> (Gyllenhal, 1813) | | X | X | | | | | N | LC |
| <i>Lissodema lituratum</i> (A. Costa, 1847) | | | | | | N | | | LC |
| <i>Rabocerus foveolatus</i> (Ljungh, 1823) | | | | | | | X | N | LC |
| <i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787) | X | X | X | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1760) | H | | | | N | X | | N | NT |
| <i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794) | | | | | B | X | X | B | LC |
| ANTHICIDAE Latreille, 1819 | | | | | | | | | |
| Anthicinae Latreille, 1819 | | | | | | | | | |
| Chandler, Uhmann, Nardi & Telnov in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Amblyderus scabricollis</i> (LaFerté-Sénéctère, 1847) | | | | | | | N | | |
| <i>Anthelephila pedestris</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Anthicus antherinus antherinus</i> (Linnaeus, 1760) | H | | X | | | X | X | N | |
| <i>Anthicus biguttatus</i> LaFerté-Sénéctère, 1849 | | | | | | | | N | |
| <i>Anthicus fenestratus</i> W.L.E. Schmidt, 1842 | X | X | | | | | | N | |
| <i>Anthicus invreai</i> Koch, 1933 | X | X | X | | | | | | |
| <i>Anthicus laeviceps</i> Baudi di Selve, 1877 | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Anthicus luteicornis</i> W.L.E. Schmidt, 1842 | | | | | N | | | | |
| <i>Anthicus niger</i> (A.G. Olivier, 1811) | H | X | X | N | N | X | N | B | |
| <i>Anthicus quadrioctulatus</i> LaFerté-Sénéctère, 1849 | | N | | | B | | | | |
| <i>Anthicus tristis tristis</i> W.L.E. Schmidt, 1842 | | X | | | | | | N | |
| <i>Clavicomus paganettii</i> (Pic, 1909) [E] | | X | | | | | | | |
| <i>Cordicomus gracilior</i> (Abeille de Perrin, 1885) | | X | | | | | | | |
| <i>Cordicomus instabilis instabilis</i> (W.L.E. Schmidt, 1842) | H | X | X | | N | N | | B | |
| <i>Cyclodinus blandulus blandulus</i> (Baudi di Selve, 1877) | | | | | | | | B | |
| <i>Cyclodinus bremeri bremeri</i> (LaFerté-Sénéctère, 1842) | | X | | | | | | | |
| <i>Cyclodinus coniceps</i> (Marseul, 1879) | X | X | | | | | | N | |
| <i>Cyclodinus constrictus constrictus</i> (Curtis, 1838) | X | | | | | N | | B | |
| <i>Cyclodinus humilis</i> (Germar, 1824) | | N | X? | | | | | B | |
| <i>Cyclodinus italicus</i> (Pic, 1901) [E] | X | X | | | | | | | |
| <i>Cyclodinus larvipennis</i> (Marseul, 1879) | | X | | | | | | | |
| <i>Cyclodinus minutus minutus</i> (LaFerté-Sénéctère, 1842) | N | | | | | | | | |
| <i>Endomia occipitalis</i> (Dufour, 1843) | | | | | N | | X | B | |
| <i>Endomia tenuicollis tenuicollis</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | X | N | | X | N | N | |
| <i>Endomia unifasciata unifasciata</i> (Bonelli, 1812) | | X | X | | N | | | | |
| <i>Hirticomus hispidus</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Hirticomus quadriguttatus</i> (P. Rossi, 1792) | X | X | X | N | | X | | B | |
| <i>Leptaleus rodriguessi</i> (Latreille, 1804) | N | | X | | B | B | B | N | |
| <i>Microhoria fasciata fasciata</i> (Chevrolat, 1834) | H | X | | | | X | X | N | |
| <i>Microhoria helenae</i> (Koch, 1933) [E] | X | | | | | | | | |
| <i>Microhoria leonhardi</i> (Krekich-Strassoldo, 1913) [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Microhoria raveli</i> (Pic, 1899) | X | X | | | | X | | | |
| <i>Microhoria terminata</i> (W.L.E. Schmidt, 1842) | H | X | N | N | | X | X | B | |
| <i>Omonadus bifasciatus</i> (P. Rossi, 1792) | X | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | | X | X | N | |
| <i>Omonadus formicarius formicarius</i> (Goeze, 1777) | | | X | | | | | N | |
| <i>Stricticomus longicollis</i> (W.L.E. Schmidt, 1842) | | | | | B | B | | B | |
| <i>Stricticomus tobias</i> (Marseul, 1879) | | X | | | | X | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Stricticomus transversalis transversalis</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1833) | X | X | | | N | N | | B | |
| <i>Tenuicomus velox velox</i> (LaFerté-Sénectère, 1849) | | | | | | | | B | |
| Notoxinae Stephens, 1829 | | | | | | | | | |
| <i>Mecynotarsus serricornis</i> (Panzer, 1796) | X | X | | | | | | | |
| <i>Notoxus appendicinus</i> Desbrochers des Loges, 1874 | X | X | | | | | | N | |
| <i>Notoxus brachycerus</i> (Faldermann, 1837) | | X | | | | | | B | |
| <i>Notoxus lonai</i> Bucciarelli, 1973 [E] | | X | | | | | X | | |
| <i>Notoxus miles italicus</i> Bucciarelli, 1978 [E] | | X | | | N | X | X | N | |
| <i>Notoxus trifasciatus</i> P. Rossi, 1792 | | X | | N | | X | X | B | |
| Tomoderinae Bonadona, 1961 | | | | | | | | | |
| <i>Pseudotomoderus compressicollis compressicollis</i> (Motschulsky, 1839) | X | X | | | B | N | | | |
| <i>Tomoderus italicus</i> Marseul, 1879 [E] | | | | N | B | N | X | B | |
| ADERIDAE Csiki, 1909 Nardi in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Aderus populneus</i> (Creutzer, 1796) | | | X | | | | | B | LC |
| <i>Anidorus nigrinus</i> (Germar, 1842) | | | | | N | | B | | LC |
| <i>Cobosia pruinosa pruinosa</i> (Kiesenwetter, 1861) | H | | | | N | | | | |
| <i>Gompelia ruficollis</i> (P. Rossi, 1794) | X | | | | | | X | B | NT |
| <i>Phytochaenus amabilis amabilis</i> R.F. Sahlberg, 1834 | X | N | X | | | X | X | B | NT |
| SCRAPTIIDAE Gistel, 1848 Scraptiinae Gistel, 1848 Scraptiini Gistel, 1848 Leblanc, Levey & Horák in Cat. Pal. Col., vol. 5, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Scraptia bifoveolata</i> Küster, 1853 | X | X | X | | | X | X | | |
| <i>Scraptia dubia</i> (A.G. Olivier, 1790) | H | X | | N | | X | X | | |
| <i>Scraptia ferruginea</i> Kiesenwetter, 1861 | H | X | | | | | | | |
| <i>Scraptia ophthalmica</i> Mulsant, 1856 | | X | | | | | | | VU |
| <i>Trotomma pubescens</i> Kiesenwetter, 1851 | H | N | | N | N | N | | N | |
| Anaspidinae Mulsant, 1856 Anaspidini Mulsant, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Anaspis brunnipes</i> (Mulsant, 1856) | H | | | | | | | | |
| <i>Anaspis costai</i> Emery, 1876 | X | X | | | | X | | | VU |
| <i>Anaspis fasciata</i> (Forster, 1771) | X | X | | | | | | | |
| <i>Anaspis flava</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | N | N | | X | X | | LC |
| <i>Anaspis labiata</i> A. Costa, 1854 | | X | N | | | | | | |
| <i>Anaspis lurida</i> Stephens, 1832 | H | X | | | | X | X | N | LC |
| <i>Anaspis maculata</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Anaspis melanostoma</i> A. Costa, 1854 | | | | | | X | | | |
| <i>Anaspis nigripes</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1866 | H | X | | | N | X | | N | |
| <i>Anaspis palpalis</i> (Gerhardt, 1876) | H | X | | | N | | X | N | |
| <i>Anaspis pulicaria</i> A. Costa, 1854 | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Anaspis quadrimaculata</i> Gyllenhal, 1817 | H | | | | | | | | |
| <i>Anaspis regimbarti</i> Schilsky, 1895 | | N | | | | | | N | |
| <i>Anaspis ruficollis</i> (Fabricius, 1792) | H | X? | | | | X | | | EN |
| <i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827) | X | | | | | | X | | EN |
| <i>Anaspis serbica</i> Apfelbeck, 1931 | | | | | | X | X | | |
| <i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| <i>Anaspis varians varians</i> (Mulsant, 1856) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Anaspis viennensis</i> Schilsky, 1895 | | | | | | X | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| CHRYSOMELOIDEA Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| VESPERIDAE Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| Vesperinae Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| Vesperini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| Sama & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010; Bouchard et al., 2011 | | | | | | | | | |
| <i>Vesperus luridus</i> (P. Rossi, 1794) | X | B | X | | CK | N | X | B | |
| CERAMBYCIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Sama & Löbl in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 (except Prioninae and Dorcadionini) | | | | | | | | | |
| Prioninae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Aegosomatini J. Thomson, 1861 | | | | | | | | | |
| Drumont & Komiya in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli, 1763) | X | X | | | N | CK | B | | LC |
| Ergatini Fairmaire, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Ergates faber faber</i> (Linnaeus, 1751) | X | | | | | ! | | | LC |
| <i>Ergates faber opifex</i> Mulsant, 1851 | | | | | | | X | B | NT |
| Macrotomini J. Thomson, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Prinobius myardi slamorum</i> Danilevsky, 2012 | B | X | | | B | | | | NT |
| Prionini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | B | N | X | X | B | NT |
| Lepturinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Lepturini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Alosterna tabacicolor tabacicolor</i> (DeGeer, 1775) | X | | | | CK | CK | B | N | LC |
| <i>Anastrangalia dubia dubia</i> (Scopoli, 1763) | | | | N | | X | B | B | LC |
| <i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1760) | | | | N | N | X | X | CK | LC |
| <i>Anoplodera rufipes izzilloi</i> Sama, 1999 [E] | | | | B | B | CK | | | NT |
| <i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775) | | | | | B | | | | LC |
| <i>Grammoptera ruficornis ruficornis</i> (Fabricius, 1781) | B | | | CK | CK | X | X | N | LC |
| <i>Grammoptera ustulata ustulata</i> (Schaller, 1783) | CK | | | B | | X | X | N | NT |
| <i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1793 | | | | | | X | X | | LC |
| <i>Pachytodes erraticus</i> (Dalman, 1817) | X | | | B | CK | X | X | | LC |
| <i>Pedostrangalia revestita</i> (Linnaeus, 1767) | B | B | | | CK | B | | | NT |
| <i>Pseudovadonia livida pecta</i> K. Daniel & J. Daniel, 1891 | H | X | | N | B | X | X | CK | LC |
| <i>Rutpela maculata maculata</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | X | X | X | N | CK | X | X | N | LC |
| <i>Stenurella bifasciata bifasciata</i> (O.F. Müller, 1776) | H | X | X | B | B | X | X | N | LC |
| <i>Stenurella melanura melanura</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Stenurella nigra nigra</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Stictoleptura cordigera cordigera</i> (Fuessly, 1775) | H | X | X | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Stictoleptura fulva</i> (DeGeer, 1775) | CK | | | B | B | X | X | N | |
| <i>Stictoleptura rubra rubra</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Stictoleptura rufa rufa</i> (Brullé, 1832) | B | X | | | B | CK | B | B | NT |
| <i>Stictoleptura scutellata scutellata</i> (Fabricius, 1781) | X | X | | B | CK | X | X | B | NT |
| Rhagiini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Acmaeops marginatus</i> (Fabricius, 1781) | | | | | | B | | | NT |
| <i>Cortodera humeralis aspromontana</i> G. Müller, 1948 | B | | | B | B | X | | B | NT |
| <i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758) | H | | N | N | B | X | X | N | LC |
| <i>Evodinellus clathratus</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | | | | NT |
| <i>Pidonia lurida</i> (Fabricius, 1793) | X | | | | | X | | | NT |
| <i>Rhagium bifasciatum</i> Fabricius, 1775 | | | | | N | CK | X | | LC |
| <i>Rhagium inquisitor inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | | X | X | CK | LC |
| <i>Rhagium mordax</i> (DeGeer, 1775) | | | | | N | X | X | B | LC |
| <i>Rhagium sycophanta</i> (Schränk, 1781) | | | | B | N | X | | | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | CK | X | X | B | NT |
| <i>Stenocorus quercus quercus</i> (Götz, 1783) | | | | B | | | | | |
| Rhamnusiini Danilevsky in Althoff & Danilevsky, 1997 | | | | | | | | | |
| <i>Rhamnusium bicolor italicum</i> G. Müller, 1966 [E] | | | | B | B | X | | | CR |
| Necydalinae Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Necydalis ulmi</i> (Chevrolat, 1838) | | CK | | | | CK | | | NT |
| Spondylidinae Audinet-Serville, 1832 | | | | | | | | | |
| Asemini J. Thomson, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Arhopalus ferus</i> Mulsant, 1839 | X | B | | | | X | X | B | LC |
| <i>Arhopalus rusticus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | | X | X | B | LC |
| <i>Arhopalus syriacus</i> (Reitter, 1895) | CK | | | | | | B | CK | LC |
| <i>Aseum striatum striatum</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | | LC |
| <i>Nothorhina punctata</i> (Fabricius, 1798) | | | | | | | B | | NT |
| Saphanini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Saphanus piceus piceus</i> (Laicharting, 1784) | | | | | | CK | B | | NT |
| Spondylidini Audinet-Serville, 1832 | | | | | | | | | |
| <i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758) | X | | | | | B | X | CK | NT |
| Cerambycinae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Achrysonini Lacordaire, 1868 | | | | | | | | | |
| <i>Icosium tomentosum atticum</i> Ganglbauer, 1881 | CK | B | | | | | | | LC |
| Anaglyptini Lacordaire, 1868 | | | | | | | | | |
| <i>Anaglyptus gibbosus</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | B | CK | X | X | CK | LC |
| <i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | B | | X | X | CK | LC |
| <i>Anaglyptus zappii</i> Rapuzzi & Sama, 2014 [E] | | | | | B | B | | | VU |
| Brachypteromatini Sama, 2008 | | | | | | | | | |
| <i>Dolocerus reichii</i> Mulsant, 1862 | H | | | B | CK | X | | N | LC |
| Callichromatini Swainson & Shuckard, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Aromia moschata moschata</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | B | | X | X | N | LC |
| Callidiini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Callidium aeneum aeneum</i> DeGeer, 1775 | | | | | | X | X | CK | LC |
| <i>Leioderes kollari kollari</i> L. Redtenbacher, 1849 | B | | | | | | | | NT |
| <i>Phymatodes alni alni</i> (Linnaeus, 1767) | X | N | | B | N | X | X | N | LC |
| <i>Phymatodes fasciatus</i> (Villers, 1789) | CK | | | | | | | | LC |
| <i>Phymatodes glabratus</i> (Charpentier, 1825) | | B | | | | | | | NT |
| <i>Phymatodes lividus</i> (P. Rossi, 1794) | X | | | | | | | | LC |
| <i>Phymatodes pusillus pusillus</i> (Fabricius, 1787) | CK | | | | N | | | | NT |
| <i>Phymatodes rufipes rufipes</i> (Fabricius, 1777) | | | | B | B | | X | | NT |
| <i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | B | X | X | CK | LC |
| <i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | B | X | | | LC |
| <i>Ropalopus clavipes</i> (Fabricius, 1775) | X | X | | | N | X | B | | LC |
| <i>Ropalopus ungaricus</i> (Herbst, 1784) | B | | | | B | | | | NT |
| <i>Ropalopus varini</i> (Bedel, 1870) | | | | | B | | | | NT |
| <i>Semanotus ruscicus ruscicus</i> (Fabricius, 1777) | B | | | | ! | | | | NT |
| Cerambycini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Cerambyx cerdo cerdo</i> Linnaeus, 1758 | X | X | | | B | X | B | B | LC |
| <i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1812 | | | | | B | B | | | LC |
| <i>Cerambyx scopoli scopoli</i> Fuessly, 1775 | H | X | | N | B | X | X | B | LC |
| <i>Cerambyx welensii welensii</i> (Küster, 1845) | X | X | | | B | X | B | B | LC |
| Certallini Fairmaire, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Certallum ebulinum</i> (Linnaeus, 1767) | CK | | | | | | | B | |
| Clytini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763) | H | | | N | CK | X | X | N | LC |
| <i>Chlorophorus glabromaculatus glabromaculatus</i> (Goeze, 1777) | B | X | | | CK | | | | LC |
| <i>Chlorophorus sartor</i> (O.F. Müller, 1766) | H | X | X | N | B | X | X | CK | LC |
| <i>Chlorophorus trifasciatus</i> (Fabricius, 1781) | H | | | | B | X | | B | LC |
| <i>Chlorophorus varius</i> (O.F. Müller, 1766) | X | X | X | | | CK | X | N | LC |
| <i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | B | B | X | X | B | LC |
| <i>Clytus rhamni bellieri</i> Gautier des Cottes, 1862 | H | X | | N | B | X | X | N | LC |
| <i>Clytus triangulimacula</i> A. Costa, 1854 [E] | H | | | | N | CK | N | | VU |
| <i>Echinocerus floralis</i> (Pallas, 1773) | X | X | X | N | B | B | X | B | |
| <i>Isotomus speciosus barbarae</i> Sama, 1977 [E] | | | | | B | | | | NT |
| <i>Neoplagionotus scalaris</i> (Brullé, 1832) | H | X | | B | | X | X | | |
| <i>Plagionotus arcuatus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758) | B | | | B | N | X | X | | LC |
| <i>Plagionotus detritus detritus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | B | CK | | B | NT |
| <i>Pseudosphegistes cinerea</i> (Laporte & Gory, 1841) | | | | | B | | | | NT |
| <i>Rusticoeclytus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | CK | | X | | |
| <i>Xylotrechus antilope antilope</i> (Schönherr, 1817) | B | | | N | | B | | | LC |
| <i>Xylotrechus arvicola arvicola</i> (A.G. Olivier, 1795) | B | X | | | B | X | X | B | LC |
| Deilini Fairmaire, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Deilus fugax</i> (A.G. Olivier, 1790) | X | X | | N | B | X | X | N | LC |
| Graciliini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Axinopalpis gracilis gracilis</i> (Krynicky, 1832) | X | | | | | X | | | NT |
| <i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781) | X | X | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Penichroa fasciata</i> (Stephens, 1831) | B | N | | | | | | B | LC |
| Hesperophanini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| Hesperophanina Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Hesperophanes sericeus</i> (Fabricius, 1787) | CK | B | | | | | | B | LC |
| <i>Stromatium unicolor</i> (A.G. Olivier, 1795) | | CK | | | | X | | B | LC |
| <i>Trichoferus fasciculatus fasciculatus</i> (Faldermann, 1837) | B | B | X | | B | B | | | LC |
| <i>Trichoferus griseus</i> (Fabricius, 1793) | X | X | | N | B | X | B | B | LC |
| <i>Trichoferus holosericeus</i> (P. Rossi, 1790) | B | | | | CK | X | | | LC |
| <i>Trichoferus spartii</i> (G. Müller, 1948) | CK | B | | | CK | CK | | | |
| Hylotruperini Zagajkevitch, 1991 | | | | | | | | | |
| <i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | | | N | X | X | B | LC |
| Molorchini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Molorchus minor minor</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | CK | B | X | | LC |
| <i>Molorchus umbellatarus umbellatarus</i> (Schreber, 1759) | CK | | | B | N | X | X | N | LC |
| Nathriini Arnett, 1962 | | | | | | | | | |
| <i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839) | B | X | | | | | | | LC |
| Obrini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1793) | | | | N | | B | X | | LC |
| <i>Obrium cantharinum cantharinum</i> (Linnaeus, 1767) | | X | | | | | | | NT |
| Phoracanthini Newman, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840 | | | | | | | | B | NA |
| <i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius, 1775) | | X | | | | | | | NA |
| Purpuricenini J. Thomson, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Purpuricenus coccineus</i> Breit, 1917 | | | | | | | | B | NT |
| <i>Purpuricenus globulicollis globulicollis</i> Dejean, 1839 | | CK | | | | CK | X | | NT |
| <i>Purpuricenus kaehleri kaehleri</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | B | X | | B | LC |
| Rosalini Fairmaire, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Rosalia alpina alpina</i> (Linnaeus, 1758) | B | X | | | N | X | X | N | NT |
| Stenhomalini Miroshnikov, 1989 | | | | | | | | | |
| <i>Stenhomalus bicolor</i> (Kraatz, 1862) | H | | | B | | | | | NT |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Stenopterini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Callimus abdominalis</i> (A.G. Olivier, 1795) | X | N | | | CK | N | | | LC |
| <i>Callimus angulatus angulatus</i> (Schrank, 1789) | | | | B | N | N | X | | LC |
| <i>Stenopterus ater</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | B | B | X | X | CK | LC |
| <i>Stenopterus flavicornis</i> Küster, 1846 | | | | | | X | X | | NT |
| <i>Stenopterus rufus rufus</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | B | X | X | CK | LC |
| Lamiinae Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| Acanthocinini Blanchard, 1845 | | | | | | | | | |
| <i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | X | X | N | LC |
| <i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1793) | B | | | | | | X | N | LC |
| <i>Acanthocinus reticulatus</i> (Razoumov, 1789) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Acanthocinus xanthoneurus</i> (Mulsant & Rey, 1852) [E] | | | | | ! | B | X | B | NT |
| <i>Leiopus femoratus</i> Fairmaire, 1859 | | | | | | | | B | NT |
| <i>Leiopus nebulosus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | X | N | | N | N | X | X | B | LC |
| Acanthoderini J. Thomson, 1860 | | | | | | | | | |
| <i>Aegomorphus clavipes</i> (Schrank, 1781) | X | X | | | N | X | X | N | LC |
| Agapanthiini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Agapanthia asphodeli</i> (Latreille, 1804) | B | | | B | | CK | | | |
| <i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Agapanthia cynarae cynarae</i> (Gyllenhal, 1817) | X | X | | N | B | X | X | | |
| <i>Agapanthia irrorata</i> (Fabricius, 1787) | CK | | | | ! | | X | | |
| <i>Agapanthia maculicornis davidi</i> Sláma, 1986 [E] | | B | | CK | CK | B | | | |
| <i>Agapanthia sicula malmerendii</i> Sama, 1981 | H | X | CK | B | B | CK | | CK | |
| <i>Agapanthia suturalis</i> (Fabricius, 1787) | | | | B | | | | B | |
| <i>Agapanthia villosoviridescens</i> (DeGeer, 1775) | | X | | N | B | X | X | | |
| <i>Agapanthia violacea</i> (Fabricius, 1775) | X | | | B | B | X | X | N | |
| <i>Calamobius filum</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| Apodasyini Lacordaire, 1872 | | | | | | | | | |
| <i>Anaesthetis testacea testacea</i> (Fabricius, 1781) | X | X | | | CK | X | X | B | LC |
| <i>Deroplia genei genei</i> (Aragona, 1830) | | X | | | | | | | NT |
| <i>Deroplia troberti troberti</i> (Mulsant, 1843) | B | | | | | | | | NT |
| Dorcadionini Swainson & Shuckard, 1840 | | | | | | | | | |
| Danilevsky in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Dorcadion arenarium marsicanum</i> D'Amore Fracassi, 1905 | H | B | | | | | | | |
| <i>Dorcadion etruscum etruscum</i> (P. Rossi, 1790) [E] | H | X | X | B | B | X | X | CK | |
| <i>Neodorcadion calabricum</i> (Reitter, 1889) [E] | | | | | | | | B | |
| Lamiini Latreille, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Herophila tristis martinasci</i> (Contarini & Gargagni, 1983) | | X | | | | | | CK | NT |
| <i>Herophila tristis tristis</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | CK | B | X | X | | LC |
| <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | | ! | | | B | NT |
| <i>Morimus asper asper</i> (Sulzer, 1776) | H | X | | N | CK | X | X | B | LC |
| Mesosini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Mesosa curculionoides</i> (Linnaeus, 1760) | X | X | X | | B | B | | B | LC |
| <i>Mesosa nebulosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781) | B | X | | B | CK | | B | | LC |
| Monochamini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Monochamus galloprovincialis galloprovincialis</i> (A.G. Olivier, 1795) | B | | | | | | | | LC |
| Parmenini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Parmena pubescens</i> (Dalman, 1817) | X | | | | | | | B | LC |
| <i>Parmena subpubescens</i> Hellrigl, 1971 [E] | | | | | | | | CK | NT |
| <i>Parmena unifasciata</i> (P. Rossi, 1790) | H | X | | B | N | | | | LC |
| Phytoeciini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Oberea linearis</i> (Linnaeus, 1760) | | B | | | B | | X | | LC |
| <i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758) | | B | | | | X | | | LC |
| <i>Phytoecia affinis nigrohirta</i> (G. Müller, 1948) [E] | | | | B | | | | | |
| <i>Phytoecia caerulea caerulea</i> (Scopoli, 1772) | H | X | X | B | | X | X | B | |
| <i>Phytoecia coerulescens coerulescens</i> (Scopoli, 1763) | H | CK | | B | N | X | X | N | |
| <i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758) | X | B | X | B | B | B | B | CK | |
| <i>Phytoecia nigricornis</i> (Fabricius, 1782) | | | | | N | | X | | |
| <i>Phytoecia pustulata pustulata</i> (Schrank, 1776) | X | | X | CK | N | B | X | N | |
| <i>Phytoecia rufipes rufipes</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | | X | | | CK | CK | | |
| <i>Phytoecia virgula virgula</i> (Charpentier, 1825) | H | X | X | N | B | B | X | | |
| <i>Phytoecia vulneris eremita</i> Sama, 1999 [E] | | | | | | CK | | | |
| <i>Phytoecia vulneris vulneris</i> Aurivillius, 1923 | H | X | | B | B | | CK | N | |
| Pogonocherini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Exocentrus adpersus</i> Mulsant, 1846 | B | | X | | CK | | B | | LC |
| <i>Exocentrus lusitanicus</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | B | | | | NT |
| <i>Exocentrus punctipennis punctipennis</i> Mulsant & Guillebeau, 1856 | B | X | | | CK | | | | LC |
| <i>Pogonocherus decoratus</i> Fairmaire, 1855 | | | | | | CK | X | | NT |
| <i>Pogonocherus eugeniae eugeniae</i> Ganglbauer, 1891 | | | | | | X | | B | NT |
| <i>Pogonocherus fasciculatus fasciculatus</i> (DeGeer, 1775) | | | | | N | B | | | LC |
| <i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | | B | | | | | | CK | LC |
| <i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758) | H | B | X | B | | B | X | | LC |
| <i>Pogonocherus neuhausi</i> (G. Müller, 1916) | X | N | | | | | | | NT |
| <i>Pogonocherus ovatooides</i> Rapuzzi & Sama, 2014 | | | | | | B | | B | NT |
| <i>Pogonocherus perroudi perroudi</i> Mulsant, 1839 | X | | | | | | X | | LC |
| Pteropliini J. Thomson, 1860 | | | | | | | | | |
| <i>Niphona picticornis</i> Mulsant, 1839 | H | X | | | | | | | LC |
| Saperdini Mulsant, 1839 | | | | | | | | | |
| <i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758) | | B | X | | | | | B | NT |
| <i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772) | | | | | | | X | | NT |
| <i>Saperda populnea populnea</i> (Linnaeus, 1758) | | X | | | | B | X | | |
| <i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767) | | X | | B | B | N | | N | LC |
| <i>Saperda scalaris scalaris</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | ! | B | X | | LC |
| <i>Saperda similis</i> Laicharting, 1784 | | | | | | | X | | NT |
| <i>Stenostola ferrea ferrea</i> (Schrank, 1776) | | | | | CK | | X | | NT |
| Tetropini Portevin, 1927 | | | | | | | | | |
| <i>Tetrops praeustus praeustus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | N | | LC |
| <i>Tetrops starkii starkii</i> Chevrolat, 1859 | | | | | B | | | | NT |
| MEGALOPODIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Zeugophorinae Böving & Craighead, 1931 Silfverberg in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Zeugophora subspinosa</i> (Fabricius, 1781) | | | | | | N | | | |
| ORSODACNIDAE C.G. Thomson, 1859 Silfverberg in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Orsodacne humeralis humeralis</i> Latreille, 1804 | N | | N | B | N | N | N | N | |
| CHRYSOMELIDAE Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Bruchinae Latreille, 1802 Amblycerini Bridwell, 1932 Spermophagina Borowiec, 1987 Anton in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Spermophagus calystegiae</i> (Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957) | | | X | | B | | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Pollicoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Spermophagus kuesterei</i> Schilsky, 1905 | | | X | | | | | N | |
| <i>Spermophagus sericeus</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | X | | N | X | X | N | |
| Bruchini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Acanthoscelidina Bridwell, 1946 | | | | | | | | | |
| <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831) | X | X | | | B | | | | |
| <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874) | | | X | | N | | | | |
| <i>Bruchidius biguttatus</i> (A.G. Olivier, 1795) | B | | | | | | X | N | |
| <i>Bruchidius bimaculatus</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Bruchidius calabrensis</i> (Blanchard, 1844) | | X | | | N | | | N | |
| <i>Bruchidius caninus</i> (Kraatz, 1869) | B | | X | | B | X | X | | |
| <i>Bruchidius cinerascens</i> (Gyllenhal, 1833) | | N | X | | N | N | | | |
| <i>Bruchidius cisti</i> (Fabricius, 1775) | H | | X | | B | X | X | N | |
| <i>Bruchidius corsicus</i> (Baudi di Selve, 1890) | H | | X | | | | X | | |
| <i>Bruchidius dispar</i> (Gyllenhal, 1833) | H | | X | | N | N | X | N | |
| <i>Bruchidius foveolatus</i> (Gyllenhal, 1833) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius jocosus</i> (Gyllenhal, 1833) | | | | | | | X | | |
| <i>Bruchidius lineatus</i> (Allard, 1868) | | | | | B | N | B | B | |
| <i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833) | H | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Bruchidius lutescens</i> (Blanchard, 1844) | B | | | | | B | | | |
| <i>Bruchidius marginalis</i> (Fabricius, 1776) | H | | X | N | | X | | N | |
| <i>Bruchidius martinezi</i> (Allard, 1868) | | | X | | | | | | |
| <i>Bruchidius meleagrinus</i> (Gené, 1839) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius mulsanti</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863) | H | X | X | | N | | | | |
| <i>Bruchidius murinus</i> (Boheman, 1829) | H | X | X | N | B | X | X | N | |
| <i>Bruchidius nanus</i> (Germar, 1824) | H | X | X | B | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius nudus</i> (Allard, 1868) | H | | X | | N | | X | N | |
| <i>Bruchidius obscuripes</i> (Gyllenhal, 1839) | N | | | | | | | | |
| <i>Bruchidius olivaceus</i> (Germar, 1824) | | X | | | B | B | | N | |
| <i>Bruchidius picipes</i> (Germar, 1824) | B | | N | | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius poecilus</i> (Germar, 1824) | H | | X | | B | B | | | |
| <i>Bruchidius pupillieri</i> (Allard, 1868) | | N | X | | | B | | | |
| <i>Bruchidius pygmaeus</i> (Boheman, 1833) | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius seminarius</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius sericatus</i> (Germar, 1824) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchidius tibialis</i> (Boheman, 1829) | H | N | X | | N | N | | | |
| <i>Bruchidius tuberculatus</i> (Hochhuth, 1847) | H | | | | | | | | |
| <i>Bruchidius unicolor</i> (A.G. Olivier, 1795) | | | | | | N | | | |
| <i>Bruchidius varipictus</i> (Motschulsky, 1874) | | | X | | N | | | | |
| <i>Bruchidius varius</i> (A.G. Olivier, 1795) | H | | X | | N | N | X | N | |
| <i>Bruchidius villosus</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | N | B | X | B | |
| <i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius, 1775) | B | X | | | | | | | |
| <i>Paleoacanthoscelides gilvus</i> (Gyllenhal, 1839) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| Bruchina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Bruchus affinis</i> J.A. Frölich, 1799 | | X | | | | | | | |
| <i>Bruchus atomarius</i> (Linnaeus, 1760) | | | | N | N | B | X | | |
| <i>Bruchus brachialis</i> Fähræus, 1839 | H | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchus emarginatus</i> Allard, 1868 | | | X | | | | | | |
| <i>Bruchus ervi</i> J.A. Frölich, 1799 | | | | | | | | N | |
| <i>Bruchus griseomaculatus</i> Gyllenhal, 1833 | | | X | | N | | | | |
| <i>Bruchus laticollis</i> Boheman, 1833 | H | X | X | | N | B | | N | |
| <i>Bruchus lentis</i> J.A. Frölich, 1799 | | | | | | B | | | |
| <i>Bruchus loti</i> Paykull, 1800 | H | | X | | N | X | X | N | |
| <i>Bruchus luteicornis</i> Illiger, 1794 | H | X | X | | N | | N | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | N | B | | | |
| <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833 | H | X | X | | B | X | | | |
| <i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783 | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Bruchus signaticornis</i> Gyllenhal, 1833 | H | X | | | | | X | | |
| <i>Bruchus tristiculus</i> Fähræus, 1839 | H | X | X | | N | | | | |
| <i>Bruchus ulicis</i> Mulsant & Rey, 1858 | | | | | N | | | | |
| <i>Bruchus viciae</i> A.G. Olivier, 1795 | H | | X | | N | N | X | N | |
| Donaciinae Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Donaciini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| Silfverberg in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Donacia bicolora meridionalis</i> Weise, 1886 [E] | | | N | | | | | | |
| <i>Donacia cinerea</i> Herbst, 1784 | N | X | | | | N | | | |
| <i>Donacia impressa</i> Paykull, 1799 | | X | | | | | | | |
| <i>Donacia reticulata</i> Gyllenhal, 1817 | | X | | B | | | X | | |
| <i>Donacia simplex</i> Fabricius, 1775 | X | X | X | | | X | | | |
| <i>Donacia versicolore</i> (Brahm, 1790) | | | | B | | | | | |
| <i>Donacia vulgaris vulgaris</i> Zschach, 1788 | | | | N | | | | | |
| Plateumarini Baving, 1922 | | | | | | | | | |
| <i>Plateumaris sericea sericea</i> (Linnaeus, 1760) | | | | | | | X | | |
| Criocerinae Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| Schmitt in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Crioceris duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | X | X | B | |
| <i>Crioceris macilenta</i> Weise, 1881 | X | X | | | | X | | | |
| <i>Crioceris paracanthesis</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Lema cyanella</i> (Linnaeus, 1758) | | X | N | | | | | | |
| <i>Lilioceris lili</i> (Scopoli, 1763) | | | | N | | X | | | |
| <i>Lilioceris merdigera</i> (Linnaeus, 1758) | | | | B | | | | B | |
| <i>Lilioceris stercoraria</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | | | | B | |
| <i>Oulema erichsonii</i> Suffrian, 1841 | | | | B | | | | | |
| <i>Oulema magistretti</i> Ruffo, 1964 [E] | | | | | N | | | | |
| <i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Oulema rufocyanea</i> (Suffrian, 1847) | | | | B | | | | | |
| Cassidinae Gyllenhal, 1813 | | | | | | | | | |
| Cassidini Gyllenhal, 1813 | | | | | | | | | |
| Borowiec & Sekerka in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Cassida algirica</i> P.H. Lucas, 1849 | X | X | | | ! | B | | B | |
| <i>Cassida deflorata</i> Suffrian, 1844 | B | | | B | ! | B | | | |
| <i>Cassida denticollis</i> Suffrian, 1844 | | | X | | ! | B | X | N | |
| <i>Cassida ferruginea</i> Goeze, 1777 | | | ! | | | | B | | |
| <i>Cassida flaveola</i> Thurnberg, 1794 | | | | | | | B | | |
| <i>Cassida hemisphaerica</i> Herbst, 1799 | B | | | | | | | | |
| <i>Cassida hexastigma</i> Suffrian, 1844 | B | | | | | B | | | |
| <i>Cassida inopinata</i> Sassi & Borowiec, 2006 | B | B | B | | | B | | | |
| <i>Cassida inquinata</i> Brullé, 1832 | B | X | X | | | N | | | |
| <i>Cassida margaritacea</i> Schaller, 1783 | H | X | ! | B | N | N | X | B | |
| <i>Cassida nebulosa</i> Linnaeus, 1758 | | | | | N | | | | |
| <i>Cassida nobilis</i> Linnaeus, 1758 | | N | | | | | | | |
| <i>Cassida prasina</i> Illiger, 1798 | B | X | | | | X | X | | |
| <i>Cassida pusilla</i> Waltl, 1835 | | X | | | ! | | | | |
| <i>Cassida rubiginosa rubiginosa</i> O.F. Müller, 1776 | H | X | X | N | B | B | X | B | |
| <i>Cassida sanguinolenta</i> O.F. Müller, 1776 | | | | ! | | B | X | | |
| <i>Cassida seladonia</i> Gyllenhal, 1827 | | | | | | B | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767 | | X | X | | B | X | | | |
| <i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758 | H | X | X | B | N | B | X | B | |
| <i>Cassida vittata</i> Villers, 1789 | B | X | | | N | | | | |
| <i>Hypocassida subferruginea</i> (Schrank, 1776) | H | X | X | N | | X | | N | |
| Hispini Gyllenhal, 1813 | | | | | | | | | |
| <i>Dicladispa testacea</i> (Linnaeus, 1767) | X | X | | | N | N | X | N | |
| <i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767 | H | X | X | | N | N | X | N | |
| Leptispini Fairmaire, 1864 | | | | | | | | | |
| <i>Lepthispa filiformis</i> (Germar, 1842) | X | | | | | | | | |
| Chrysomelinae Latreille, 1802 Chrysomelini Latreille, 1802 Chrysomelina Latreille, 1802 Kippenberg in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758 | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Plagioderma versicolora</i> (Laicharting, 1781) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Plagiosterna aenea aenea</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | N | X | B | |
| Gastrophysina Kippenberg, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Gastrophysa polygona polygona</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | N | X | X | B | |
| Phratorina Motschulsky, 1860 | | | | | | | | | |
| <i>Phratora laticollis</i> (Suffrian, 1851) | X | X | X | N | N | X | X | | |
| <i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758) | X | | X | N | | X | | B | |
| Prasocurina Reitter, 1913 | | | | | | | | | |
| <i>Phaedon armoraciae</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | B | X | B | |
| <i>Phaedon cochleariae cochleariae</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Phaedon laevigatus laevigatus</i> (Duftschmid, 1825) | N | | | | | N | | B | |
| <i>Prasocuris flavocincta</i> (Brullé, 1832) | | | | | N | | | | |
| <i>Prasocuris glabra</i> (Herbst, 1783) | | | | | N | | X | | |
| <i>Prasocuris junci</i> (Brahm, 1790) | X | | | | | | | | |
| <i>Prasocuris vicina</i> (P.H. Lucas, 1849) | | X | | | | | | | |
| Doryphorini Motschulsky, 1860 Chrysolinina S.-H. Chen, 1936 | | | | | | | | | |
| <i>Chrysolina affinis bruttiana</i> Bourdonné, 1999 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Chrysolina americana</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | N | | | B | |
| <i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | | N | | | ! | |
| <i>Chrysolina cerealis mixta</i> (Küster, 1844) | | | | | | B | | B | |
| <i>Chrysolina chalcites</i> (Germar, 1824) | H | | | | | | | | |
| <i>Chrysolina corcyria</i> (Suffrian, 1851) | H | | | | | | | ! | |
| <i>Chrysolina cribrata sirentensis</i> (Meier, 1900) [E] | X | | | | B | X | | | |
| <i>Chrysolina fastuosa fastuosa</i> (Scopoli, 1763) | X | | | | N | X | X | N | |
| <i>Chrysolina grossa grossa</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | | X | X | N | |
| <i>Chrysolina haemoptera corvina</i> (Weise, 1916) [E] | X | X | | | | B | X | B | |
| <i>Chrysolina herbacea herbacea</i> (Duftschmid, 1825) | X | X | X | B | N | N | X | ! | |
| <i>Chrysolina hyperici hyperici</i> (Forster, 1771) | X | X | X | N | | X | X | ! | |
| <i>Chrysolina interstincta interstincta</i> (Suffrian, 1851) [E] | H | | | | | N | N | B | |
| <i>Chrysolina lutea</i> (L. Petagna, 1819) | H | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Chrysolina oricalcia</i> (O.F. Müller, 1776) | X | X | | N | | | | | |
| <i>Chrysolina peregrina</i> (Herrich-Schäffer, 1838) | | | | | | | | B | |
| <i>Chrysolina polita polita</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | B | N | ! | X | B | |
| <i>Chrysolina pseudolurida obscurefacta</i> Bechyně, 1952 [E] | X | | | | | X | | | |
| <i>Chrysolina rossia</i> (Illiger, 1802) | H | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Chrysolina vernalis italica</i> (Weise, 1882) | H | X | N | | N | X | X | B | |
| <i>Chrysolina viridana viridana</i> (Küster, 1844) | | X | | B | | | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Altica tamaricis</i> Schrank, 1785 | | | N | | N | N | | | |
| <i>Aphthona carbonaria</i> Rosenhauer, 1856 | | X | N | | | X | | N | |
| <i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank, 1781) | B | X | X | N | N | X | CK | B | |
| <i>Aphthona flaviceps</i> Allard, 1859 | H | | X | | N | N | | | |
| <i>Aphthona herbigrada</i> (Curtis, 1837) | B | | | | | CK | X | | |
| <i>Aphthona lutescens</i> (Gyllenhal, 1813) | | X | N | | | N | | | |
| <i>Aphthona nigriceps</i> (W. Redtenbacher, 1842) | H | X | X | N | N | X | | B | |
| <i>Aphthona nonstriata</i> (Goeze, 1777) | X | X | | | | | | | |
| <i>Aphthona pygmaea</i> (Kutschera, 1861) | H | X | | | N | N | | B | |
| <i>Aphthona semicyanea</i> Allard, 1859 | H | N | | | | | | | |
| <i>Aphthona sicelidis</i> Weise, 1888 | | | X | | | | | | B |
| <i>Aphthona venustula</i> Kutschera, 1861 | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Apteropeda orbiculata</i> (Marsham, 1802) | B | | | | | B | B | B | |
| <i>Argopus ahrensii</i> (Germar, 1817) | | | | | | X | | | |
| <i>Arrhenocoela lineata</i> (P. Rossi, 1790) | X | | | | | | | | |
| <i>Batophila aerata</i> (Marsham, 1802) | H | X | N | CK | CK | N | | | |
| <i>Chaetocnema arenacea</i> (Allard, 1860) | | | | B | | | X | | |
| <i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860 | | X | | | | | X | N | |
| <i>Chaetocnema aridula</i> (Gyllenhal, 1827) | | X | | | | | | | |
| <i>Chaetocnema chlorophana</i> (Duftschmid, 1825) | | X | X | | CK | N | | B | |
| <i>Chaetocnema concinna</i> (Marsham, 1802) | | | CK | N | N | | X | B | |
| <i>Chaetocnema conducta</i> (Motschulsky, 1838) | H | X | X | | N | | | N | |
| <i>Chaetocnema depressa</i> (Boieldieu, 1859) | | | | | | | X | | |
| <i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy, 1785) | X | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Chaetocnema mannerheimii</i> (Gyllenhal, 1827) | | N | | | | | | | |
| <i>Chaetocnema montenegrina</i> Heikertinger, 1912 | | | | | | | X | | |
| <i>Chaetocnema obesa</i> (Boieldieu, 1859) | | X | | | | | | | |
| <i>Chaetocnema picipes</i> Stephens, 1831 | | | | | N | CK | | N | |
| <i>Chaetocnema procerula</i> (Rosenhauer, 1856) | | | X | | | | | B | |
| <i>Chaetocnema punctifrons</i> Abeille de Perrin, 1907 | | X | X | | | | | B | |
| <i>Chaetocnema scheffleri</i> (Kutschera, 1864) | | X | B | ! | | | | | |
| <i>Chaetocnema semicoerulea</i> (Koch, 1803) | | | | | N | | N | CK | |
| <i>Chaetocnema subcoerulea</i> (Kutschera, 1864) | | | X | | | | | | |
| <i>Chaetocnema tibialis</i> (Illiger, 1807) | H | X | B | N | N | X | X | B | |
| <i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802) | X | X | X | | | X | | CK | |
| <i>Crepidodera aurea</i> (Geoffroy, 1785) | X | X | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Crepidodera nitidula</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | CK | | X | | |
| <i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804) | | X | X | | N | | | | |
| <i>Derocrepis sodalis</i> (Kutschera, 1860) | | X | | | CK | B | | | |
| <i>Dibolia chryptocephala</i> (Koch, 1803) | | X | | | | X | B | CK | |
| <i>Dibolia femoralis femoralis</i> L. Redtenbacher, 1849 | H | | | | | | | | |
| <i>Dibolia occultans</i> (Koch, 1803) | X | X | X | | N | N | | B | |
| <i>Dibolia timida</i> (Illiger, 1807) | | | N | | N | | | | |
| <i>Epitrix atropae</i> Foudras, 1861 | | | | | B | X | | | |
| <i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847) | | N | | | | | | | |
| <i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803) | X | X | | | N | X | | | |
| <i>Hermaeophaga mercurialis</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | N | | | | |
| <i>Hermaeophaga ruficollis</i> (P.H. Lucas, 1849) | | CK | | | | | | | |
| <i>Hippuriphila modeeri</i> (Linnaeus, 1760) | | | | | | | | B | |
| <i>Longitarsus aeneicollis</i> (Faldermann, 1837) | H | | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Longitarsus aeneus</i> Kutschera, 1862 | H | | | | | ! | | | |
| <i>Longitarsus aeruginosus</i> (Foudras, 1860) | X | | | | N | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Psylliodes napi</i> (Fabricius, 1792) | H | X | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Psylliodes obsкуроaenea</i> Rosenhauer, 1856 | | | | | | X | | B | |
| <i>Psylliodes pallidipennis</i> Rosenhauer, 1856 | | | | | | | | B | |
| <i>Psylliodes puncticollis</i> Rosenhauer, 1856 | X | X | | | | | | | |
| <i>Psylliodes pyritosa</i> Kutschera, 1864 | H | | | | N | | X | B | |
| <i>Psylliodes ruffoi</i> Leonardi, 1975 [E] | | X | | | CK | X | B | B | |
| <i>Psylliodes thlaspi</i> Foudras, 1860 | | | | | N | | | | |
| <i>Sphaeroderma rubidum</i> (Graells, 1858) | H | X | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Sphaeroderma testaceum</i> (Fabricius, 1775) | | | | | CK | | X | B | |
| Lamprosomatinae Lacordaire, 1848 Konstantinov in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Oomorphus concolor</i> (Sturm, 1807) | | N | | | N | N | | | |
| Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813 Clytrini Kirby, 1837 Clytrina Kirby, 1837 Regalin & Medvedev in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Cheilotoma erythrostoma italica</i> Leoni, 1906 | X | X | X | | N | X | X | | |
| <i>Cheilotoma musciformis musciformis</i> (Goeze, 1777) | H | | X | | | | X | B | |
| <i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837 | X | X | | N | | X | X | N | |
| <i>Clytra quadripunctata quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | | X | | B | |
| <i>Coptocephala scopolina kuesteri</i> Kraatz, 1872 | H | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Coptocephala unicolor</i> (P.H. Lucas, 1845) | | | N | | N | | | N | |
| <i>Coptocephala unifasciata unifasciata</i> (Scopoli, 1763) | X | X | X | N | N | X | X | | |
| <i>Labidostomis humeralis</i> (D.H. Schneider, 1792) | X | | | | | | | | |
| <i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1760) | X | | X | B | N | X | X | | |
| <i>Labidostomis pallidipennis</i> (Gebler, 1830) | X | | | | N | X | | | |
| <i>Labidostomis taxicornis taxicornis</i> (Fabricius, 1792) | H | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Labidostomis tridentata</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | B | |
| <i>Lachnaia italica italica</i> Weise, 1881 | H | X | | N | N | X | X | | |
| <i>Lachnaia sexpunctata</i> (Scopoli, 1763) | | | | | N | | | | |
| <i>Macrolenes dentipes</i> (A.G. Olivier, 1808) | H | X | N | N | N | X | X | N | |
| <i>Smaragdina affinis affinis</i> (Illiger, 1794) | H | | X | B | N | X | | | |
| <i>Smaragdina aurita aurita</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | | | X | X | N | |
| <i>Smaragdina concolor concolor</i> (Fabricius, 1792) | | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli, 1763) | H | | | | N | X | | | |
| <i>Tinuboea biguttata</i> (A.G. Olivier, 1791) | H | | | N | | X | X | | |
| Cryptocephalini Gyllenhal, 1813 Cryptocephalina Gyllenhal, 1813 Lopatín, Smetana & Schöller in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus anticus</i> Suffrian, 1848 | X | X | X | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus aureolus aureolus</i> Suffrian, 1847 | | | | N | | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus bameuli</i> Duhaldeborde, 1999 | | | | | | CK | | | |
| <i>Cryptocephalus bilineatus</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | | | CK | | |
| <i>Cryptocephalus himaculatus</i> Fabricius, 1781 | | | | | | ! | CK | | |
| <i>Cryptocephalus bipunctatus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | | CK | B | X | B | |
| <i>Cryptocephalus connexus</i> A.G. Olivier, 1807 | X | | X | N | CK | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus cyanipes</i> Suffrian, 1847 | | | | | | N | X | | |
| <i>Cryptocephalus czwalinae</i> Weise, 1882 [E] | H | | | | CK | X | X | B | |
| <i>Cryptocephalus daccordii</i> Biondi, 1995 [E] | | B | | | | CK | | B | |
| <i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus elegantulus</i> Gravenhorst, 1807 | N | | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus etruscus</i> Suffrian, 1847 | B | B | N | B | B | X | B | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Cryptocephalus falzonii</i> Burlini, 1956 [E] | | | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781 | H | | | N | CK | X | | N | |
| <i>Cryptocephalus frenatus</i> Laicharting, 1781 | B | | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus frontalis</i> Marsham, 1802 | | | | | | N | | | |
| <i>Cryptocephalus fulvus fulvus</i> (Goeze, 1777) | H | X | X | N | N | X | X | CK | |
| <i>Cryptocephalus imperialis</i> Laicharting, 1781 | | | | | | X | | | |
| <i>Cryptocephalus informis</i> Suffrian, 1847 | | | | | | N | | | |
| <i>Cryptocephalus labiatus</i> (Linnaeus, 1760) | H | X | CK | CK | CK | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus leonhardi</i> Breit, 1918 | | | | | | X | B | | |
| <i>Cryptocephalus loreyi</i> Solier, 1837 | | | | B | CK | CK | X | B | |
| <i>Cryptocephalus macellus</i> Suffrian, 1860 | B | | | N | N | X | | B | |
| <i>Cryptocephalus marginatus</i> Fabricius, 1781 | | | | | CK | X | | | |
| <i>Cryptocephalus moraei</i> (Linnaeus, 1758) | H | | X | N | | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus nitidus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | B | CK | X | X | CK | |
| <i>Cryptocephalus ocellatus ocellatus</i> Drapiez, 1819 | N | | | B | N | X | X | B | |
| <i>Cryptocephalus ochroleucus ochroleucus</i> Fairmaire, 1859 | | | | | CK | | | | |
| <i>Cryptocephalus octomaculatus</i> P. Rossi, 1790 | | | | | | | CK | | |
| <i>Cryptocephalus parvulus</i> O.F. Müller, 1776 | | X | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus pini pini</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | CK | | | |
| <i>Cryptocephalus politus politus</i> Suffrian, 1853 | | | | | | | | CK | |
| <i>Cryptocephalus populi</i> Suffrian, 1848 | | CK | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus pygmaeus vittula</i> Suffrian, 1848 | B | | X | B | | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus renatae</i> Sassi, 2001 | B | X | X | | | N | X | B | |
| <i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777) | | | | | | | | N | |
| <i>Cryptocephalus rugicollis</i> A.G. Olivier, 1791 | H | X | X | N | CK | X | CK | CK | |
| <i>Cryptocephalus sammiticus</i> Leonardi & Sassi, 2001 [E] | ! | B | B | | B | B | | | |
| <i>Cryptocephalus scapularis</i> Suffrian, 1848 | | X | | | CK | X | X | B | |
| <i>Cryptocephalus sexpunctatus sexpunctatus</i> Linnaeus, 1758 | | | | ! | | | | | |
| <i>Cryptocephalus signatifrons</i> Suffrian, 1847 | X | X | | | CK | | X | N | |
| <i>Cryptocephalus stragula</i> P. Rossi, 1794 | X | | | | | | | | |
| <i>Cryptocephalus strigosus</i> Germar, 1824 | X | | | | | | X | | |
| <i>Cryptocephalus tricolor</i> P. Rossi, 1792 | H | X | X | B | CK | X | X | | |
| <i>Cryptocephalus trimaculatus</i> P. Rossi, 1790 | H | | CK | | CK | X | X | N | |
| <i>Cryptocephalus turcicus</i> Suffrian, 1847 | H | | X | N | CK | B | | | |
| <i>Cryptocephalus zambanellus</i> Marsham, 1875 | | | | N | CK | X | X | B | |
| Pachybrachina Chapuis, 1874 | | | | | | | | | |
| Schöller, Löbl & Lopatin in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Pachybrachis exclusus</i> (Rey, 1883) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Pachybrachis fimbriolatus</i> (Suffrian, 1848) | | | X | | | X | | | |
| <i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781) | CK | CK | | | N | N | N | | |
| <i>Pachybrachis hippophaes</i> (Suffrian, 1848) | | | | | | | N | | |
| <i>Pachybrachis karamani</i> (Weise, 1893) | | CK | | | | | | | |
| <i>Pachybrachis ruffoi ruffoi</i> Burlini, 1957 [E] | | | | | | X | X | B | |
| <i>Pachybrachis salfi</i> Burlini, 1957 | CK | | | | | X | | | |
| <i>Pachybrachis scriptus</i> Herrich-Schäffer, 1838 | X | | | | | | | | |
| <i>Pachybrachis tessellatus</i> (A.G. Olivier, 1791) | X | | | | | | | | |
| Stylosomina Chapuis, 1874 | | | | | | | | | |
| <i>Stylosomus minutissimus</i> (Germar, 1824) | X | | | | | | | CK | |
| <i>Stylosomus tamaricis</i> (Herrich-Schäffer, 1836) | | N | | | | | | | |
| Eumolpinae Hope, 1840 | | | | | | | | | |
| Bromiini Chapuis, 1874 | | | | | | | | | |
| Moseyko & Sprecher-Uebersax in Cat. Pal. Col., vol. 6, 2010 | | | | | | | | | |
| <i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | N | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Pollicoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Colaspidea nitida</i> P.H. Lucas, 1846 | H | X | | | | | | B | |
| <i>Pachmephorus bistriatus</i> Mulsant & Wachanru, 1852 | X | X | | | | | | | |
| <i>Pachmephorus cylindricus</i> P.H. Lucas, 1849 | | X | | | | | | N | |
| <i>Pachmephorus tessellatus</i> (Duftschmid, 1825) | | N | N | | N | | | | |
| <i>Pachmephorus villosus</i> (Duftschmid, 1825) | X | X | | | | | | | |
| CURCULIONOIDEA Latreille, 1802 Alonso-Zarazaga et. al., 2017, Coop. Cat. Curculionoidea | | | | | | | | | |
| NEMONYCHIDAE Bedel, 1882 | | | | | | | | | |
| <i>Nemonyx lepturoides</i> (Fabricius, 1801) | | | | | | X | | | |
| ANTHRIBIDAE Billberg, 1820 Anthribinae Billberg, 1820 Anthribini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Anthribus fasciatus</i> Forster, 1770 | B | X | | N | | X | X | N | LC |
| Discotenini Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Enedreytes hilaris</i> Fähræus, 1839 | X | X | | | | N | | B | LC |
| <i>Pseudeuparius centromaculatus</i> (Gyllenhal, 1833) | B | X | B | | | | | B | LC |
| <i>Pseudeuparius sepicola</i> (Fabricius, 1792) | | B | | | | | | | LC |
| Piesocorynini Valentine, 1960 | | | | | | | | | |
| <i>Phaenotherion fasciculatum fasciculatum</i> Reitter, 1891 [E] | | X | X | N | B | X | X | B | LC |
| Platyrhinini Imhoff, 1856 | | | | | | | | | |
| <i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763) | X | X | | N | B | X | B | B | LC |
| <i>Ulorhinus bilineatus</i> (Germar, 1819) | H | X | | | B | B | | | LC |
| Platystomini Pierce, 1916 | | | | | | | | | |
| <i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | X | X | N | LC |
| Zygaenodini Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798) | X | | B | | B | X | X | B | LC |
| <i>Noxius curtirostris</i> (Mulsant & Rey, 1861) | B | B | | | | | | | LC |
| <i>Rhaphitropis marchica</i> (Herbst, 1797) | | | | | B | | | | LC |
| <i>Rhaphitropis oxyacanthae</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863) | | | | B | B | N | | | LC |
| Choraginae Kirby, 1819 Choragini Kirby, 1819 | | | | | | | | | |
| <i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1819 | B | | | | | | | | LC |
| Urodontinae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Bruchela flavescens</i> (Küster, 1850) | H | X | X | | | | | N | |
| <i>Bruchela rufipes rufipes</i> (A.G. Olivier, 1790) | B | | | | | | | | |
| ATTELABIDAE Billberg, 1820 Attelabinae Billberg, 1820 Apoderini Jekel, 1860 Apoderina Jekel, 1860 | | | | | | | | | |
| <i>Apoderus coryli</i> (Linnaeus, 1758) | CK | | | CK | CK | X | X | CK | |
| Attelabini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763) | H | X | X | CK | CK | X | X | B | |
| Rhynchitinae Gistel, 1848 Auletini Desbrochers des Loges, 1908 Auletina Desbrochers des Loges, 1908 | | | | | | | | | |
| <i>Auletes tubicen</i> Schönherr, 1826 | B | | | | | | | | |
| Pseudomesauletina Legalov, 2003 | | | | | | | | | |
| <i>Aletinus maculipennis</i> (Jacquelin du Val, 1854) | | | | | | | | B | |
| <i>Eomesauletes politus</i> (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) | H | | | | CK | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Mesautetobius pubescens</i> (Kiesenwetter, 1852) | CK | | | CK | CK | | | | |
| Byctiscini Voss, 1923 | | | | | | | | | |
| Byctiscina Voss, 1923 | | | | | | | | | |
| <i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | N | | X | X | B | |
| <i>Byctiscus populi</i> (Linnaeus, 1758) | | | | CK | | X | | CK | |
| Deporaini Voss, 1929 | | | | | | | | | |
| Chonostropheina Morimoto, 1962 | | | | | | | | | |
| <i>Chonostropheus seminiger</i> (Reitter, 1881) | | | | N | | X | X | B | |
| Deporaina Voss, 1929 | | | | | | | | | |
| <i>Caenorhinus megacephalus</i> (Germar, 1823) | | | | B | | | | | |
| <i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758) | H | CK | | CK | | N | X | CK | |
| Rhynchitini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Involvulus icosandriae icosandriae</i> (Scopoli, 1763) | H | CK | X | | CK | X | X | B | |
| <i>Involvulus pubescens</i> (Fabricius, 1775) | | | | CK | CK | | X | | |
| <i>Lasiorrhynchites cavifrons</i> (Gyllenhal, 1833) | H | X | | | CK | | | | |
| <i>Lasiorrhynchites comatus</i> (Gyllenhal, 1833) | CK | | | | CK | | | | |
| <i>Lasiorrhynchites praeustus</i> (Boheman, 1845) | X | X | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Lasiorrhynchites sericeus</i> (Herbst, 1797) | H | | | CK | CK | X | | B | |
| <i>Mecorhis aethiops</i> (Bach, 1854) | | | | | B | | | | |
| <i>Neocoenorrhinus abeillei</i> (Desbrochers des Loges, 1869) | H | | | | CK | CK | | | |
| <i>Neocoenorrhinus germanicus</i> (Herbst, 1797) | H | | X | | CK | X | X | B | |
| <i>Neocoenorrhinus interpunctatus</i> (Stephens, 1831) | | X | | | CK | X | | B | |
| <i>Neocoenorrhinus minutus</i> (Herbst, 1797) | H | | | | CK | | | | |
| <i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> (Germar, 1823) | H | X | X | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Rhodocyrus cribripennis</i> (Desbrochers des Loges, 1869) | X | | | | CK | | | | |
| <i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763) | H | | X | CK | CK | CK | X | CK | |
| <i>Rhynchites bacchus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | CK | X | X | CK | |
| <i>Rhynchites giganteus</i> Schönherr, 1832 | X | X | | CK | CK | X | X | CK | |
| <i>Tatjanaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767) | H | X | X | N | CK | X | X | B | |
| <i>Temnocerus coeruleus</i> (Fabricius, 1798) | H | X | CK | | CK | X | X | B | |
| <i>Temnocerus nanus</i> (Paykull, 1792) | CK | X | | N | CK | X | X | | |
| BRENTIDAE Billberg, 1820 (sensu lato) | | | | | | | | | |
| Apioninae Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Apionini Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Apionina Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| <i>Apion cruentatum</i> Walton, 1844 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | X | N | | | N | B | |
| <i>Apion haematodes haematodes</i> Kirby, 1808 | X | | | N | | X | X | N | |
| <i>Apion longithorax</i> Desbrochers des Loges, 1889 | | | | | | | X | B | |
| Aplemonina Kissinger, 1968 | | | | | | | | | |
| <i>Perapion affine</i> (Kirby, 1808) | | | | | | | N | | |
| <i>Perapion curtirostre</i> (Germar, 1817) | X | | | N | | X | X | N | |
| <i>Perapion hydrolapathi</i> (Marshall, 1802) | H | X | X | N | N | X | X | | |
| <i>Perapion ilvense</i> (Wagner, 1905) | X | X | | | | X | X | B | |
| <i>Perapion marchicum</i> (Herbst, 1797) | | | | | | | X | B | |
| <i>Perapion violaceum violaceum</i> (Kirby, 1808) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833) | X | | | | N | N | | B | |
| <i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Herbst, 1797) | H | | X | N | N | X | X | | |
| <i>Pseudostenapion simum</i> (Germar, 1817) | | X | | | N | X | X | N | |
| Aspidapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Aspidapion aeneum</i> (Fabricius, 1775) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Aspidapion caprai</i> Giusto, 1993 [E] | | | | B | | | | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Aspidapion radiolus</i> (Marshall, 1802) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Aspidapion soror</i> (Rey, 1895) | | | X | | | X | X | B | |
| Catapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Catapion burdigalense</i> (Wencker, 1859) | H | | | | | | | | |
| <i>Catapion calabricum</i> (A. Solari & F. Solari, 1922) [E] | | | | B | | | X | B | |
| <i>Catapion corsicum</i> (Desbrochers des Loges, 1888) | H | | | | | | | N | |
| <i>Catapion curtisii</i> (Stephens, 1831) | H | | | | | | | B | |
| <i>Catapion jaffense</i> (Desbrochers des Loges, 1896) | X | | X | | N | | X | | |
| <i>Catapion meieri</i> (Desbrochers des Loges, 1901) | | B | | | | | | | |
| <i>Catapion pubescens</i> (Kirby, 1811) | H | X | X | | N | X | X | B | |
| <i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808) | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Catapion seriatosetosulum</i> (Wencker, 1864) | H | | X | | | X | | B | |
| Ceratapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Acentrotypus brummipes</i> (Boheman, 1839) | B | | | | | | | | |
| <i>Ceratapion armatum</i> (Gerstaecker, 1854) | | | | | | | | B | |
| <i>Ceratapion basicorne</i> (Illiger, 1807) | | | X | | | | | | |
| <i>Ceratapion carduorum</i> (Kirby, 1808) | H | X | | B | | X | X | B | |
| <i>Ceratapion cylindricolle</i> (Gyllenhal, 1839) | B | | X | | | B | | | |
| <i>Ceratapion damryi</i> (Desbrochers des Loges, 1894) | | | | | | X | X? | | |
| <i>Ceratapion gibbirostre</i> (Gyllenhal, 1813) | | | X | | | | | | |
| <i>Ceratapion onopordi onopordi</i> (Kirby, 1808) | H | | X | N | | X | X | B | |
| <i>Ceratapion penetrans penetrans</i> (Germar, 1817) | H | | X | | | X | | | |
| <i>Ceratapion robusticorne</i> (Desbrochers des Loges, 1866) | B | | | | | | | | |
| <i>Ceratapion scalptum scalptum</i> (Mulsant & Rey, 1859) | | | | | | | X | | |
| <i>Diplapion confluens</i> (Kirby, 1808) | H | X | X | | | | | B | |
| <i>Diplapion detritum</i> (Mulsant & Rey, 1859) | H | | X | | | | | | |
| <i>Diplapion stolidum</i> (Germar, 1817) | X | | | N | | X | | | |
| <i>Omphalapion dispar</i> (Germar, 1817) | | X | | | | X | X | N | |
| <i>Omphalapion hookerorum</i> (Kirby, 1808) | | | | | | | X | | |
| <i>Omphalapion laevigatum</i> (Paykull, 1792) | | X | | | | | | | |
| Exapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Exapion difficile</i> (Herbst, 1797) | X | | | | | | X | | |
| <i>Exapion elongatulum</i> (Desbrochers des Loges, 1891) | | | | | | X | | | |
| <i>Exapion formaneki</i> (Wagner, 1929) | H | | | N | N | X | | | |
| <i>Exapion fuscirostre fuscirostre</i> (Fabricius, 1775) | | | | | N | X | | | |
| <i>Exapion genistae</i> (Kirby, 1811) | X | | | | | | | | |
| <i>Exapion subparallelum</i> (Desbrochers des Loges, 1888) | | B | | | | | | B | |
| Ixapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Trichopterapion holosericeum</i> (Gyllenhal, 1833) | H | X | | | N | | X | | |
| Kalcapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Kalcapion semivittatum semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833) | H | | | N | | X | N | B | |
| <i>Melanapion minimum</i> (Herbst, 1797) | X | | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Squamapion atomarium</i> (Kirby, 1808) | | | | | | X | | | |
| <i>Squamapion leucophaeatum</i> (Wencker, 1864) | | | X | | | | | N | |
| <i>Squamapion minutissimum</i> (Rosenhauer, 1856) | | | | | | | B | | |
| <i>Squamapion vicinum</i> (Kirby, 1808) | | | | | | | N | | |
| <i>Taeniapion rufescens</i> (Gyllenhal, 1833) | H | | | | | | | N | |
| <i>Taeniapion urticarium urticarium</i> (Herbst, 1784) | H | | | B | N | X | | B | |
| Malvapiina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Malvapion malvae</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | N | N | X | | B | |
| <i>Pseudapion fulvirostre</i> (Gyllenhal, 1833) | H | X | N | | N | N | | | |
| <i>Pseudapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | N | N | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Rhopalapion longirostre</i> (A.G. Olivier, 1807) | N | | | | | | X | | |
| Oxystomatina Alonso-Zarazaga, 1990 | | | | | | | | | |
| <i>Cyanapion afer</i> (Gyllenhal, 1833) | X | | X | | | | | | |
| <i>Cyanapion alcyoneum</i> (Germar, 1817) | | | | | | X | X | | |
| <i>Cyanapion gyllenhali</i> (Kirby, 1808) | H | | | N | | X | X | B | |
| <i>Cyanapion platalea</i> (Germar, 1817) | H | | | | | | | | |
| <i>Cyanapion spencii</i> (Kirby, 1808) | H | | | | | | X | | |
| <i>Eutrichapion ervi</i> (Kirby, 1808) | H | | | N | N | X | | B | |
| <i>Eutrichapion facetum</i> (Gyllenhal, 1839) | | | | N | N | X | X | N | |
| <i>Eutrichapion melancholicum</i> (Wencker, 1864) | | | | | | X | X | | |
| <i>Eutrichapion punctiger</i> (Paykull, 1792) | H | | | N | N | N | | B | |
| <i>Eutrichapion viciae</i> (Paykull, 1800) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Eutrichapion vorax</i> (Herbst, 1797) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Hemirichapion filicorne</i> (Wencker, 1864) | | | | N | | X | | | |
| <i>Hemirichapion juniperi</i> (Boheman, 1839) | | | | | | X | | | |
| <i>Hemirichapion lethierryi</i> (Desbrochers des Loges, 1870) | | | | | | X | | | |
| <i>Hemirichapion pavidum</i> (Germar, 1817) | | | X | | | | | | |
| <i>Hemirichapion reflexum</i> (Gyllenhal, 1833) | | | | N | | X | | N | |
| <i>Holotrichapion aethiops</i> (Herbst, 1797) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Holotrichapion antennale</i> (Desbrochers des Loges, 1896) | | | | | N | X | | B | |
| <i>Holotrichapion gracilicolle</i> (Gyllenhal, 1839) | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Holotrichapion ononis</i> (Kirby, 1808) | H | | X | N | N | X | N | B | |
| <i>Holotrichapion pisi</i> (Fabricius, 1801) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Ischnopterapion cognatum</i> (Hochhuth, 1851) | | | B | N | | X | | | |
| <i>Ischnopterapion fallens</i> (Marseul, 1888) | | | X | | N | X | | | |
| <i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808) | H | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Ischnopterapion modestum</i> (Germar, 1817) | | N | | | | | | | |
| <i>Ischnopterapion plumbeomicans plumbeomicans</i> (Rosenhauer, 1856) | X | X | | | | | | | |
| <i>Ischnopterapion virens</i> (Herbst, 1797) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Oryxolaemus croceifemoratus</i> (Gyllenhal, 1839) | B | X | | | | X | X | B | |
| <i>Oryxolaemus scabiosus</i> (Weise, 1889) | B | | | | N | B | X | B | |
| <i>Oxystoma cerdo</i> (Gerstaecker, 1854) | H | | | N | | X | X | B | |
| <i>Oxystoma cracciae</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | | | X | X | | |
| <i>Oxystoma dimidiatum</i> (Desbrochers des Loges, 1897) | X | | X | N | N | X | | | |
| <i>Oxystoma ochropus</i> (Germar, 1818) | H | X | | | | X | X | N | |
| <i>Oxystoma opeticum</i> Bach, 1854 | | | | | | X | | | |
| <i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798) | | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Oxystoma subulatum</i> (Kirby, 1808) | | | X | B | N | | X | | |
| <i>Pirapion immune</i> (Kirby, 1808) | N | | | | | X | X | | |
| <i>Stenopterapion meliloti</i> (Kirby, 1808) | | N | | | | | | | |
| <i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808) | H | X | X | N | N | X | N | N | |
| <i>Synapion falzonii</i> (Schatzmayr, 1922) | | | | | | X | | | |
| Piezotrachelina Voss, 1959 | | | | | | | | | |
| <i>Protapion angusticolle</i> (Gyllenhal, 1833) | | | X | | | | | | |
| <i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797) | H | X | X | N | N | X | N | B | |
| <i>Protapion assimile assimile</i> (Kirby, 1808) | H | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Protapion dentipes</i> (Gerstaecker, 1854) | H | X | X | N | N | X | | B | |
| <i>Protapion difforme</i> (Germar, 1818) | N | X | | | | | | N | |
| <i>Protapion dissimile</i> (Germar, 1817) | H | | | | | X | | B | |
| <i>Protapion fulvipes fulvipes</i> (Geoffroy, 1785) | N | | X | | N | X | N | N | |
| <i>Protapion interjectum interjectum</i> (Desbrochers des Loges, 1895) | H | X | X | | N | X | | B | |
| <i>Protapion laevicolle</i> (Kirby, 1811) | H | | X | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Protapion nigricrus</i> (Desbrochers des Loges, 1895) | | X | X | N | N | X | X | | |
| <i>Protapion nigrirtarse</i> (Kirby, 1808) | H | X | X | | N | X | X | B | |
| <i>Protapion ononidis</i> (Gyllenhal, 1827) | X | | X | | N | X | X | B | |
| <i>Protapion schoenherri</i> (Boheman, 1839) | H | | X | | N | X | X | N | |
| <i>Protapion trifolii</i> (Linnaeus, 1768) | N | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Protapion varipes</i> (Germar, 1817) | X | X | X | | | | | B | |
| <i>Pseudoprotapion astragali</i> (Paykull, 1800) | | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Pseudoprotapion elegantulum</i> (Germar, 1818) | | | | | | X | | | |
| Brentinae Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Brentini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Eremoxenina Semenov, 1892 | | | | | | | | | |
| <i>Amorphocephala coronata</i> (Germar, 1817) | X | B | X | | B | N | | B | LC |
| Nanophyinae Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Corimaliini Alonso-Zarazaga, 1989 | | | | | | | | | |
| <i>Allomalialia quadrivirgata</i> (A. Costa, 1863) | N | X | | | | | | B | |
| <i>Corimalia pallida</i> (A.G. Olivier, 1807) | | X | | | | | | B | |
| <i>Corimalia postica</i> (Gyllenhal, 1838) | | | | | | | | B | |
| <i>Corimalia tamarisci</i> (Gyllenhal, 1838) | X | X | | | | | | B | |
| <i>Hypophyes pallidulus</i> (Gravenhorst, 1807) | N | N | | | | | | B | |
| Nanophyini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Dieckmanniellus chevrieri</i> (Boheman, 1845) | | | X | | | | | | |
| <i>Dieckmanniellus gracilis</i> (L. Redtenbacher, 1847) | | | | | | | | B | |
| <i>Dieckmanniellus nigrirtarsis</i> (Aubé, 1862) | | | | | | | | B | |
| <i>Dieckmanniellus nitidulus</i> (Gyllenhal, 1838) | H | X | | | | X | X | B | |
| <i>Nanomimus hemisphaericus</i> (A.G. Olivier, 1807) | X | | X | | | | | B | |
| <i>Nanophyes brevis brevis</i> Boheman, 1845 | X | | X | | | | | | |
| <i>Nanophyes brevis fallax</i> Rey, 1893 | | X | | | | | | | |
| <i>Nanophyes marmoratus marmoratus</i> (Goeze, 1777) | | X | X | | | | | | |
| <i>Nanophyes rubricrus</i> Rosenhauer, 1856 | | | N | | | | | | |
| CURCULIONIDAE Latreille, 1802 s.l. | | | | | | | | | |
| Bagoinae C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Bagous argillaceus</i> Gyllenhal, 1836 | | B | X | | | | | B | |
| <i>Bagous biimpressus</i> Fähræus, 1845 | | B | | | | | | | |
| <i>Bagous costulatus</i> Perris, 1869 | | | X | | N | | | N | |
| <i>Bagous limosus</i> (Gyllenhal, 1827) | CK | | X | N | | | | | |
| <i>Bagous longirostris</i> Vitale, 1904 | | | B | | | | | B | |
| <i>Bagous lutulentus</i> (Gyllenhal, 1813) | | X | X | | | | | CK | |
| <i>Bagous robustus</i> H. Brisout de Barneville, 1863 | | CK | | | | | | | |
| <i>Bagous rufimanus</i> Péricart, 1989 | | | X | | | | | | |
| Brachycerinae Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Brachycerini Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| Brachycerina Billberg, 1820 | | | | | | | | | |
| <i>Brachycerus albidentatus</i> Gyllenhal, 1840 | | B | | | | | | B | |
| <i>Brachycerus junix</i> Liechtenstein, 1896 | X | N | | | | | | B | |
| <i>Brachycerus lutosus</i> Gyllenhal, 1833 | X | | | | | | | | |
| <i>Brachycerus muricatus</i> A.G. Olivier, 1790 | H | | | | | | | B | |
| <i>Brachycerus undatus</i> Fabricius, 1798 | H | X | | | N | N | | B | |
| Erirehini Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| Erirehina Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Notaris acridulus</i> (Linnaeus, 1758) | | N | | | | | | | |
| <i>Notaris scirpi</i> (Fabricius, 1792) | X | X | X | | N | N | | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Thryogenes festucae</i> (Herbst, 1795) | | N | | | | | | | |
| Ocladiina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Jekelia notata</i> Mulsant & Godart, 1868 | H | | | | | | | | |
| Raymondionimini Reitter, 1913 | | | | | | | | | |
| <i>Alaocyba marcuzzii</i> G. Osella, 1977 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Ferreria marqueti appenina</i> (Dieck, 1869) [E] | X | | | B | B | | | | |
| <i>Raymondia picei</i> G. Osella, 1977 | N | B | | | N | B | | | |
| Tanysphyrini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Tanysphyrus lemnae</i> (Paykull, 1792) | H | N | X | N | | | | | |
| Conoderinae Schönherr, 1833 Bariditae Schönherr, 1836 Apostasimerini Schönherr, 1844 Zygoberidina Pierce, 1907 | | | | | | | | | |
| <i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777) | | | X | | | | | | |
| <i>Limnobaris t-album</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | N | X | | | |
| Baridini Schönherr, 1836 Baridina Schönherr, 1836 | | | | | | | | | |
| <i>Aulacobaris angusta angusta</i> (Brullé, 1832) | | X | | | | | X | | |
| <i>Aulacobaris caerulea caerulea</i> (Scopoli, 1763) | | X | | | | | | | |
| <i>Aulacobaris chlorizans</i> (Germar, 1823) | H | N | | | | | | | |
| <i>Aulacobaris cupirostris cupirostris</i> (Fabricius, 1787) | H | | | | | | | | |
| <i>Aulacobaris fallax</i> (Heyden, 1868) | X | X | | | | | | | |
| <i>Aulacobaris kaufmanni</i> (Reitter, 1897) | B | | | | | X | X | | |
| <i>Aulacobaris pertusa</i> (Kiesenwetter, 1864) | B | | B | | | | | | |
| <i>Aulacobaris picicornis picicornis</i> (Marshall, 1802) | B | | N | | | | | | |
| <i>Aulacobaris prasina prasina</i> (Boheman, 1836) | | | B | | B | | | | |
| <i>Baris analis analis</i> (A.G. Olivier, 1791) | X | X | N | | | | | | |
| <i>Baris artemisiae</i> (Panzer, 1794) | X | | N | | N | | | | |
| <i>Labiaticola atricolor</i> (Boheman, 1844) | B | | | | | | | | |
| <i>Malvaevora timida timida</i> (P. Rossi, 1792) | X | N | | N | | X | X | | |
| <i>Maurombaris spoliata</i> (Boheman, 1836) | | X | | | | | | N | |
| Madarini Jekel, 1865 Leptoschoinina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Cucubaris villae</i> (Comolli, 1837) | H | | | | | | | | |
| Neosharpiini A. Hoffmann, 1956 | | | | | | | | | |
| <i>Amalus scortillum</i> (Herbst, 1795) | | | | | | X | | | |
| Ceutorhynchini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Calosirus terminatus</i> (Herbst, 1795) | | B | X | B | | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus aeneicollis</i> Germar, 1823 | | X | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792) | H | X | N | B | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus atomus</i> Boheman, 1845 | H | | X | | N | X | X | N | |
| <i>Ceutorhynchus barbareae</i> Suffrian, 1847 | | | | | | X | X | | |
| <i>Ceutorhynchus chalibaeus</i> Germar, 1823 | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus cochleariae</i> (Gyllenhal, 1813) | | | | | N | | | | |
| <i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marshall, 1802) | H | B | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus declivis</i> Colonnelli, 1988 [E] | | | | | N | B | | | |
| <i>Ceutorhynchus duvali</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus fallax</i> Boheman, 1845 | | X | X | | N | X | | | |
| <i>Ceutorhynchus fulvitaris</i> Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860 | H | | | | N | | | | |
| <i>Ceutorhynchus gallorhenanus</i> F. Solari, 1949 | | B | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Ceutorhynchus grenieri</i> Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860 | | X | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus griseus</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 | X | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus hepaticus</i> Gyllenhal, 1837 | | | N | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus hirtulus</i> Germar, 1823 | H | B | | | | X | | B | |
| <i>Ceutorhynchus inaeffectatus</i> Gyllenhal, 1837 | | X | | | | X | | | |
| <i>Ceutorhynchus laetus</i> Rosenhauer, 1856 | H | | | | | X | | | |
| <i>Ceutorhynchus leonhardi</i> F. Solari, 1932 [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus leprieuri</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1881 | X | X | X | | | | | N | |
| <i>Ceutorhynchus littoralis</i> Schultzze, 1898 | X | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus magnanoi</i> Colonnelli, 2011 [E] | | B | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus matthiolae</i> A. Hoffmann, 1955 | | B | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus melitensis</i> Schultzze, 1900 | X | B | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus micans</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 | | B | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus nanus</i> Gyllenhal, 1837 | H | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus obstructus</i> (Marsham, 1802) | | | X | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802) | H | X | X | | N | N | | B | |
| <i>Ceutorhynchus pantellarianus</i> A. Hoffmann, 1964 | | B | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus picitarsis</i> Gyllenhal, 1837 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Ceutorhynchus posthumus</i> Germar, 1823 | H | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus puncticollis</i> Boheman, 1845 | B | | | | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus roberti</i> Gyllenhal, 1837 | | | | | N | | | | |
| <i>Ceutorhynchus rusticus</i> Gyllenhal, 1837 | | | | N | | | | | |
| <i>Ceutorhynchus scrobicollis</i> Neresheimer & Wagner, 1924 | | | | | B | | | | |
| <i>Ceutorhynchus striatellus</i> Schultzze, 1900 | | | X | | | X | | | |
| <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> (Paykull, 1800) | H | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Ceutorhynchus typhae</i> (Herbst, 1795) | H | | | | | X | X | | |
| <i>Ceutorhynchus unguicularis</i> C.G. Thomson, 1871 | H | | X | | | X | | | |
| <i>Ceutorhynchus viridipennis</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 | H | X | | N | | | X | B | |
| <i>Coeliastes lamii</i> (Fabricius, 1792) | | | | | N | | | B | |
| <i>Coeliodes angulipennis</i> F. Solari, 1940 [E] | X | | | | | | X | | |
| <i>Coeliodes ilicis</i> (Bedel, 1885) | | X | X | | | | | | |
| <i>Coeliodes rana</i> (Fabricius, 1787) | H | | | | | | N | | |
| <i>Coeliodes ruber</i> (Marsham, 1802) | H | | X | | N | | | N | |
| <i>Coeliodes transversealbofasciatus</i> (Goeze, 1777) | N | | | | | | | N | |
| <i>Datonychus arquata</i> (Herbst, 1795) | | | | | | | | B | |
| <i>Datonychus melanostictus</i> (Marsham, 1802) | | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Datonychus urticae</i> (Boheman, 1845) | H | | | | N | X | | B | |
| <i>Drupenatus nasturtii</i> (Germar, 1823) | X | B | X | | | | | | |
| <i>Glocianus distinctus</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870) | H | N | X | N | | X | | B | |
| <i>Glocianus maculaalba</i> (Herbst, 1795) | | X | | | | X | | | |
| <i>Glocianus punctiger</i> (C.R. Sahlberg, 1835) | | X | | | | X | X | | |
| <i>Glocianus ragusae</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1884) | H | X | | | | | | B | |
| <i>Hadroplontus trimaculatus</i> (Fabricius, 1775) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Microplontus campestris</i> (Gyllenhal, 1837) | H | | | | | | | | |
| <i>Microplontus fairmairii</i> (C.N.F. Brisout de Barneville, 1881) | | | | N | | X | | | |
| <i>Microplontus molitor</i> (Gyllenhal, 1837) | H | | | | | | | | |
| <i>Microplontus rugulosus</i> (Herbst, 1795) | H | X | | | N | N | | B | |
| <i>Mogulones amplipennis</i> (Schultzze, 1897) | | | X | | N | | | | |
| <i>Mogulones annibal</i> (Desbrochers des Loges, 1896) | | X | | | | | | | |
| <i>Mogulones asperifoliarum</i> (Gyllenhal, 1813) | H | | N | | N | N | X | B | |
| <i>Mogulones aubei</i> (Boheman, 1845) | | | | | | | | B | |
| <i>Mogulones beckeri</i> (Schultzze, 1900) | H | | N | | | | | | |
| <i>Mogulones crucifer</i> (Pallas, 1771) | | | | | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777) | H | X | | N | | X | X | | |
| <i>Mogulones javetii</i> (Gerhardt, 1867) | H | X | | | | | | | |
| <i>Mogulones lucanus</i> (Colonnelli, 1983) [E] | | X | | | N | X | | | |
| <i>Mogulones pallidicornis</i> (Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860) | | | | | | X | | | |
| <i>Mogulones t-album</i> (Gyllenhal, 1837) | X | | | | | X | | | |
| <i>Nedys quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | N | N | X | X | B | |
| <i>Neoprohinus cinnamomeus</i> (Schultze, 1897) | H | X | | | | | X | B | |
| <i>Oprohinus consputus</i> (Germar, 1823) | H | X | X | N | | X | | N | |
| <i>Parethelcus pollinarius</i> (Forster, 1771) | H | | | | | | | | |
| <i>Phoeniconyx gobbii</i> (Colonnelli, 1978) [E] | | X | | | | | | | |
| <i>Phrydiuchus topiarius</i> (Germar, 1823) | H | | | | | | | | |
| <i>Pseudocoeliodes rubricus</i> (Gyllenhal, 1837) | H | | | | | X | | | |
| <i>Sirocalodes depressicollis</i> (Gyllenhal, 1813) | | B | | | | | | | |
| <i>Sirocalodes mixtus</i> (Mulsant & Rey, 1859) | H | | | N | | | | | |
| <i>Stenocarus cardui</i> (Herbst, 1784) | | | X | | C | | | | |
| <i>Stenocarus ruficornis</i> (Stephens, 1831) | | X | | N | | X | | | |
| <i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyllenhal, 1837) | X | | | | | | X | | |
| <i>Thamiocolus sinapis</i> (Desbrochers des Loges, 1893) | H | | | | | | | | |
| <i>Thamiocolus uniformis</i> (Gyllenhal, 1837) | H | | | | | | | | |
| <i>Trichosirocalus horridus</i> (Panzer, 1801) | H | | | N | | X | X | | |
| <i>Trichosirocalus rufulus</i> (Dufour, 1851) | X | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787) | | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Trichosirocalus urens</i> (Gyllenhal, 1837) | | | | | | X | | B | |
| <i>Zacladus exiguus</i> (A.G. Olivier, 1807) | H | X | X | | N | X | | | |
| <i>Zacladus geranii</i> (Paykull, 1800) | H | X | | N | | X | | N | |
| Mononychini LeConte, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784) | H | N | | | | | | | |
| Phytobiini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Neophytobius granatus</i> (Gyllenhal, 1835) | | | | | N | | | | |
| <i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (Fabricius, 1787) | | | X | | | X | | | |
| <i>Phytobius leucogaster</i> (Marsham, 1802) | | N | X | | N | | | | |
| <i>Rhinoncus bruchoides</i> (Herbst, 1784) | | | | B | | | | | |
| <i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linnaeus, 1758) | X | X | N | N | N | X | X | | |
| <i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich, 1797) | H | | X | | N | | | | |
| Scleropterini Schultze, 1902 | | | | | | | | | |
| <i>Scleropteridius fallax</i> Otto, 1897 | | | | | | X | | | |
| Conoderitae Schönherr, 1833 | | | | | | | | | |
| Orobitidini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Orobitis nigrina</i> Reitter, 1885 | | | | | | | | B | |
| Choerorhinini Folwaczny, 1973 | | | | | | | | | |
| <i>Choerorhinus squalidus</i> Fairmaire, 1858 | | CK | | | ! | | | | LC |
| Cossonini Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Mesites cunipes</i> Boheman, 1838 | | X | | N | N | X | | | LC |
| <i>Mesites pallidipennis</i> Boheman, 1838 | CK | X | | | N | | | CK | LC |
| Dryotribini LeConte, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Amaurorhinus mediterraneus</i> Folwaczny, 1973 | | | | | CK | | | | DD |
| <i>Cotaster kostali</i> Diotti, Pesarini & Caldara, 2015 [E] | | | | | | B | B | B | LC |
| <i>Cotaster uncipes</i> (Boheman, 1838) | | | | N | B | X | X | B | LC |
| Onycholipini Wollaston, 1873 | | | | | | | | | |
| <i>Brachytemmus porcatus</i> (Germar, 1823) | CK | B | | N | N | X | X | CK | LC |
| <i>Hexarthrum exiguum</i> (Boheman, 1838) | B | B | | | | | | N | DD |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Stenoscelis submuricata</i> (Schönherr, 1832) | | B | | | | N | X | B | LC |
| <i>Stereocorynes truncorum</i> (Germar, 1823) | | | | | | X | | | LC |
| Rhyncolini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| Phloeophagina Voss, 1955 | | | | | | | | | |
| <i>Melicius cylindrus</i> (Boheman, 1838) | CK | X | | | N | N | ! | | LC |
| <i>Phloeophagus lignarius</i> (Marsham, 1802) | X | B | | | N | X | X | | LC |
| Rhyncolina Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Aphanommata filum</i> (Mulsant & Rey, 1859) | | B | | | | | | | NT |
| <i>Rhyncolus ater ater</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | CK | | | LC |
| <i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Rhyncolus punctatulus</i> Boheman, 1838 | CK | B | | N | N | X | X | | LC |
| <i>Rhyncolus reflexus</i> Boheman, 1838 | CK | B | | | | | | | LC |
| <i>Rhyncolus sculpturatus</i> Waltl, 1839 | | CK | | | | | | | LC |
| Curculioninae Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Acalyptini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792) | | N | | | N | | | | |
| Anoplini Bedel, 1884 | | | | | | | | | |
| <i>Anoplus roboris</i> Suffrian, 1840 | | | | | | | N | | |
| <i>Anoplus setulosus setulosus</i> Kirsch, 1870 | | | | | | | | N | |
| Anthonomini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Anthonomus bituberculatus</i> C.G. Thomson, 1868 | X | X | | | | | | | |
| <i>Anthonomus chevrolati chevrolati</i> Desbrochers des Loges, 1868 | H | X | | | | X | | | |
| <i>Anthonomus kirschi</i> Desbrochers des Loges, 1868 | | | | | | X | | N | |
| <i>Anthonomus multifasciatus</i> Pic, 1926 | X | X | | | | | | | |
| <i>Anthonomus pedicularius</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | | N | X | X | N | |
| <i>Anthonomus pomorium</i> (Linnaeus, 1758) | H | B | | N | N | X | X | N | |
| <i>Anthonomus pyri</i> Gyllenhal, 1835 | | X | | | | N | | | |
| <i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Anthonomus rufus</i> Gyllenhal, 1835 | H | N | | | | | | | |
| <i>Anthonomus stierlini</i> Desbrochers des Loges, 1869 | B | | | | | | | | |
| <i>Anthonomus ulmi</i> DeGeer, 1775 | H | X | | | | | | | |
| <i>Bradybatus creutzeri</i> Germar, 1823 | H | X | | N | N | X | | | |
| <i>Bradybatus elongatulus</i> (Boheman, 1843) | H | | | | N | | | | |
| <i>Bradybatus kellneri</i> Bach, 1845 | H | | N | | N | | | | |
| <i>Cionellus gibbifrons</i> (Kiesenwetter, 1852) | H | | | | | | | | |
| Cionini Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Cionus alauda</i> (Herbst, 1784) | | | | | | | | B | |
| <i>Cionus balianii</i> F. Solari, 1932 | | | | | | X | | | |
| <i>Cionus colonnellii</i> Košťál & Caldara, 2019 | B | | | | | | | | |
| <i>Cionus hortulanus</i> (Geoffroy, 1785) | H | | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Cionus montanus</i> Wingelmüller, 1914 | X | N | | | | X | X | B | |
| <i>Cionus olens</i> (Fabricius, 1792) | X | | X | | | X | | B | |
| <i>Cionus olivieri</i> Rosenschöld, 1838 | H | X | X | | | | | B | |
| <i>Cionus schoenherri</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | | X | | | | | | |
| <i>Cionus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | | | | B | |
| <i>Cionus thapsus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Cionus tuberculatus</i> (Scopoli, 1793) | | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Cleopus solani</i> (Fabricius, 1792) | | | | N | | X | | N | |
| <i>Stereonychus fraxini</i> (DeGeer, 1775) | H | B | | | | | | | |
| Curculionini Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| Archariina Pelsue & O'Brien, 2011 | | | | | | | | | |
| <i>Archarius crux</i> (Fabricius, 1777) | | | | N | | N | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802) | H | X | | N | N | X | X | | |
| <i>Archarius salicivorus</i> (Paykull, 1792) | | X | X | | N | X | X | N | |
| Curculionina Latreille, 1802 | | | | | | | | | |
| <i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal, 1835) | X | | | | | | | | |
| <i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Curculio nucum</i> Linnaeus, 1758 | X | | | N | | X | | | |
| <i>Curculio pellitus</i> (Boheman, 1843) | H | | | N | | X | X | | |
| <i>Curculio propinquus</i> (Desbrochers des Loges, 1868) | X | | X | | | | | | |
| <i>Curculio villosus</i> Fabricius, 1781 | H | | | N | | X | | | |
| Derelomini Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| Derelomina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Derelomus chamaeropsis</i> (Fabricius, 1798) | | X | | | | | | | |
| Ellescini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Dorytomina Bedel, 1886 | | | | | | | | | |
| <i>Dorytomus dejeani</i> Faust, 1883 | X | X | | | | N | N | | |
| <i>Dorytomus filirostris</i> (Gyllenhal, 1835) | | | | | N | | | | |
| <i>Dorytomus hirtipennis</i> Bedel, 1884 | X | X | X | | | | | | |
| <i>Dorytomus ictor</i> (Herbst, 1795) | X | X | X | | N | N | | N | |
| <i>Dorytomus longimanus</i> (Forster, 1771) | N | X | | | N | | | | |
| <i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Paykull, 1792) | | | N | N | | X | | | |
| <i>Dorytomus minutus</i> (Gyllenhal, 1835) | | X | | | | | | | |
| <i>Dorytomus nebulosus</i> (Gyllenhal, 1835) | | | | | B | | | | |
| <i>Dorytomus rubrirostris</i> (Gravenhorst, 1807) | N | X | | | | | | | |
| <i>Dorytomus schoenherri schoenherri</i> Faust, 1883 | | N | | | | | | | |
| <i>Dorytomus suratus</i> (Gyllenhal, 1835) | | N | | N | | | | | |
| <i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781) | N | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Dorytomus tremulae</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | | | |
| <i>Dorytomus villosulus</i> (Gyllenhal, 1835) | | X | | | | | | | |
| Ellescina C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| <i>Ellescus scanicus</i> (Paykull, 1792) | | X | | | | | | | |
| Mecinini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Cleopomiarus distinctus</i> (Boheman, 1845) | | | | B | | X | | | |
| <i>Cleopomiarus graminis</i> (Gyllenhal, 1813) | | | | N | N | X | | | |
| <i>Cleopomiarus plantarum</i> (Germar, 1823) | H | X | X | | N | X | X | | |
| <i>Gymnetron aper</i> Desbrochers des Loges, 1892 | B | | | B | | | | | |
| <i>Gymnetron niloticum</i> Kirsch, 1881 | | | | | | | | B | |
| <i>Gymnetron rostellum</i> (Herbst, 1795) | H | | X | N | B | X | X | | |
| <i>Gymnetron stimulosum</i> (Germar, 1821) | | | | | B | | | | |
| <i>Gymnetron tibiellum</i> Desbrochers des Loges, 1900 | | | B | | | | | | |
| <i>Gymnetron veronicae</i> (Germar, 1821) | | | X | B | B | X | X | B | |
| <i>Gymnetron villosulum</i> Gyllenhal, 1838 | | | X | | | | | B | |
| <i>Mecinus circulator</i> (Marsham, 1802) | | X | | | | | | | |
| <i>Mecinus comosus</i> Boheman, 1845 | | | | | B | | | B | |
| <i>Mecinus haemorrhoidalis</i> (H. Brisout de Barneville, 1862) | B | | | | B | B | | B | |
| <i>Mecinus heydenii</i> Wencker, 1866 | | | | | | | | B | |
| <i>Mecinus ictericus</i> (Gyllenhal, 1838) | X | X | | | N | | B | | |
| <i>Mecinus janthinus</i> (Germar, 1821) | H | | X | | N | X | X | | |
| <i>Mecinus kaemmereri</i> Wagner, 1927 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Mecinus labilis</i> (Herbst, 1795) | X | | X | | N | | | | |
| <i>Mecinus latiusculus</i> (Jacquelin du Val, 1855) | | | N | | | | | | |
| <i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813) | H | B | X | | N | X | X | N | |
| <i>Mecinus pyraister</i> (Herbst, 1795) | H | X | X | N | N | X | X | N | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I.. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Mecinus raphaelis</i> Baviera & Caldara, 2014 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Mecinus simus</i> (Mulsant & Rey, 1859) | | | | | | B | | | |
| <i>Mecinus variabilis</i> (Rosenhauer, 1856) | H | X | | | | N | X | B | |
| <i>Miarus campanulae</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | N | | X | | |
| <i>Rhinusa anthirrhini</i> (Paykull, 1800) | H | X | | | N | X | | B | |
| <i>Rhinusa asellus</i> (Gravenhorst, 1807) | X | | | | | X | | B | |
| <i>Rhinusa bipustulata</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Rhinusa comosa</i> (Rosenschöld, 1838) | B | | | | | B | B | B | |
| <i>Rhinusa herbarum</i> (H. Brisout de Barneville, 1862) | H | | | | | X | | B | |
| <i>Rhinusa incana</i> (Kirsch, 1881) | | | | | | | | B | |
| <i>Rhinusa neta</i> (Germar, 1821) | H | | X | | | | | B | |
| <i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792) | X | X | X | | N | X | X | B | |
| Rhamphini Rafinesque, 1815 | | | | | | | | | |
| Rhamphina Rafinesque, 1815 | | | | | | | | | |
| <i>Orchestes alni</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | | | | | |
| <i>Orchestes betuleti</i> (Panzer, 1795) | | | X | | | | | | |
| <i>Orchestes fagi fagi</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Orchestes jota</i> (Fabricius, 1787) | | | X | | | | | | |
| <i>Orchestes pilosus</i> (Fabricius, 1781) | | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Orchestes quedenfeldti</i> Gerhardt, 1865 | H | B | | | | | | | |
| <i>Orchestes quercus</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | | N | | | |
| <i>Orchestes subfasciatus</i> (Gyllenhal, 1835) | | | | | N | | | | |
| <i>Pseudorchestes flavidus</i> (H. Brisout de Barneville, 1865) | H | | | | | | | | |
| <i>Pseudorchestes pratensis</i> (Germar, 1821) | | | X | | | | | | |
| <i>Pseudorchestes smrecynskii</i> (Dieckmann, 1958) | B | | | | | | | | |
| <i>Rhamphus oxyacanthae</i> (Marsham, 1802) | | X | X | N | N | X | | | |
| <i>Rhamphus pulicarius</i> (Herbst, 1795) | H | N | X | | N | N | X | | |
| <i>Rhamphus subaeneus</i> Illiger, 1807 | X | | | | | | | | |
| <i>Tachyerges decoratus</i> (Germar, 1821) | | | | | | X | | N | |
| <i>Tachyerges rufitarsis</i> (Germar, 1821) | | | | | B | | | | |
| <i>Tachyerges salicis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | N | | | | |
| <i>Tachyerges stigma</i> (Germar, 1821) | | X | X | | | X | | | |
| Smicronychini Seidlitz, 1891 | | | | | | | | | |
| <i>Aubeonymus carinicollis</i> (P.H. Lucas, 1846) | H | X | | | | | | | |
| <i>Pachytychius discithorax</i> (Desbrochers des Loges, 1873) | | | | | | X | | | |
| <i>Pachytychius haematocephalus</i> (Gyllenhal, 1835) | H | X | X | | | | | B | |
| <i>Pachytychius hordei grandicollis</i> (Waltl, 1835) | H | | | | B | | | B | |
| <i>Pachytychius sparsutus</i> (A.G. Olivier, 1807) | X | | | | | | X | B | |
| <i>Smicronyx albosquamosus</i> Wollaston, 1854 | | X | | | | | | | |
| <i>Smicronyx coecus</i> (Reich, 1797) | | | | | | X | | | |
| <i>Smicronyx cyaneus</i> (Gyllenhal, 1835) | H | X | | | | | X | B | |
| <i>Smicronyx italicus</i> Voss, 1953 [E] | | | | | N | | | | |
| <i>Smicronyx jungermanniae</i> (Reiche, 1797) | B | | | | N | | | N | |
| <i>Smicronyx menozzii</i> F. Solari, 1952 | | | | | | | | N | |
| <i>Smicronyx nebulosus</i> Tournier, 1874 | | X | | | | X | X | | |
| <i>Smicronyx reichii</i> (Gyllenhal, 1835) | X | X | | | | X | | | |
| <i>Smicronyx syriacus</i> Faust, 1887 | | | | | | X | | | |
| Styphlini Jekel, 1861 | | | | | | | | | |
| <i>Orthochaetes insignis</i> (Aubé, 1863) | H | | | | | | | | |
| <i>Pseudostyphlus pillumus</i> (Gyllenhal, 1835) | B | | | | | | | | |
| <i>Styphlidius italicus</i> G. Osella, 1981 [E] | | | | | | | | B | |
| Tychiini C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |
| Tychiina C.G. Thomson, 1859 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Sibinia arenariae</i> Stephens, 1831 | | X | | | | | | | |
| <i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1835 | H | X | | B | | X | | B | |
| <i>Sibinia femoralis</i> Germar, 1823 | X | X | | N | | X | X | B | |
| <i>Sibinia pellucens</i> (Scopoli, 1772) | H | | | B | N | X | X | B | |
| <i>Sibinia viscaria</i> (Linnaeus, 1760) | H | | | | | | X | B | |
| <i>Tychius amplicollis</i> Aubé, 1850 | | | | | | | | B | |
| <i>Tychius argentatus</i> Chevrolat, 1859 | X | X | | | N | N | | B | |
| <i>Tychius aureolus</i> Kiesenwetter, 1852 | | X | | | | | | | |
| <i>Tychius bicolor</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | X | X | | N | N | N | X | | |
| <i>Tychius brevisculus</i> Desbrochers des Loges, 1873 | | | X | | | | | N | |
| <i>Tychius caldarai</i> Dieckmann, 1986 | | | X | B | B | X | | N | |
| <i>Tychius capucinus</i> Boheman, 1843 | X | X | | | | | | B | |
| <i>Tychius consputus</i> Kiesenwetter, 1864 | H | | | B | B | | | | |
| <i>Tychius cuprifer</i> (Panzer, 1799) | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Tychius cupriferoideus</i> Ragusa, 1922 | | N | N | | | | B | | |
| <i>Tychius curtirostris</i> Desbrochers des Loges, 1873 | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Tychius decretus</i> Tourmier, 1874 | | N | | | | | | B | |
| <i>Tychius depressus</i> Desbrochers des Loges, 1873 | X | | | | | | | | |
| <i>Tychius flavus</i> Becker, 1864 | | | X | | | | | | |
| <i>Tychius focarilei</i> F. Solari, 1950 [E] | | | | | | X | | | |
| <i>Tychius grandicollis</i> Desbrochers des Loges, 1873 | X | X | X | | B | X | | N | |
| <i>Tychius grenieri</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1862 | B | | | | | | | | |
| <i>Tychius junceus</i> (Reich, 1797) | X | | X | | | X | | | |
| <i>Tychius kulzeri</i> Penecke, 1934 | | | X | N | N | X | | | |
| <i>Tychius lineatulus</i> Stephens, 1831 | B | | | | | | | B | |
| <i>Tychius longicollis</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | X | X | | N | N | X | N | |
| <i>Tychius medicaginis</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | | | X | | | | | | |
| <i>Tychius meliloti</i> Stephens, 1831 | X | X | N | | | N | X | B | |
| <i>Tychius naxiae</i> Faust, 1889 | | B | | | | b | | | |
| <i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787) | X | | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Tychius polylineatus</i> (Germar, 1823) | | | X | | N | | X | B | |
| <i>Tychius pusillus</i> Germar, 1842 | X | X | X | N | N | X | | B | |
| <i>Tychius quinquepunctatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | | | | N | X | | |
| <i>Tychius rufipennis</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 | X | | | N | | | B | | |
| <i>Tychius schneideri</i> (Herbst, 1795) | X | X | | | N | X | X | | |
| <i>Tychius squamulatus</i> Gyllenhal, 1835 | X | X | X | | N | | X | | |
| <i>Tychius stephensi</i> Schönherr, 1835 | | X | | N | N | X | | B | |
| <i>Tychius striatulus</i> Gyllenhal, 1835 | | | X | | | | | | |
| <i>Tychius thoracicus</i> Boheman, 1843 | X | | X | | B | X | | B | |
| <i>Tychius tibialis</i> Boheman, 1843 | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| Cyclomini Schönherr, 1826 | | | | | | | | | |
| Dichotrachelini A. Hoffmann, 1957 | | | | | | | | | |
| <i>Dichotrachelus bensae</i> A. Solari & F. Solari, 1904 [E] | | | | B | | X | | B | |
| Hipporhinini Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Entomoderus deformis</i> (Reiche & Sauley, 1858) | H | | | | | | | | |
| <i>Entomoderus impressicollis peninsularis</i> (F. Solari, 1940) [E] | | | | | N | X | | | |
| <i>Gronops lunatus</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | | X | | |
| Dryophthorinae Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| Dryophthorini Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792) | | B | | | | X | | | NT |
| Rhynchophorini Schönherr, 1833 | | | | | | | | | |
| Litosomina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | | | | |
| <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763) | X | X | | | N | N | X | N | |
| <i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855 | | | | | | N | | N | |
| Rhynchophorina Schönherr, 1833 | | | | | | | | | |
| <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (A.G. Olivier, 1791) | | N | | | | | | N | |
| Sphenophorina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787) | X | B | | | | | | | |
| <i>Sphenophorus meridionalis</i> Gyllenhal, 1838 | | B | | | N | | | B | |
| <i>Sphenophorus parumpunctatus</i> Gyllenhal, 1838 | | | | | N | | | B | |
| <i>Sphenophorus piceus</i> (Pallas, 1771) | H | X | | | | | | | |
| <i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777) | X | | | | | | | | |
| Entiminae Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Brachyderini Schönherr, 1826 | | | | | | | | | |
| <i>Brachyderes incanus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | B | |
| <i>Strophomorphus porcellus</i> (Schönherr, 1832) | X | X | | | N | N | N | B | |
| <i>Strophosoma erinaceus</i> (Chevrolat, 1865) | | | | | | | | B | |
| <i>Strophosoma melanogrammus melanogrammus</i> (Forster, 1771) | | | | N | | X | X | B | |
| Byrsopagini Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Graptus nictitans singularis</i> (Jacquelin du Val, 1854) | H | X | | | N | | X | | |
| <i>Rhytideres plicatus</i> (A.G. Olivier, 1790) | | B | | | | | | | |
| <i>Tropiphorus imperator</i> Pesarini, 1995 [E] | | | | | B | B | | | |
| <i>Tropiphorus obtusus</i> (Bonsdorff, 1785) | | | | | | X | | | |
| Geonemini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Barynotus obscurus</i> (Fabricius, 1775) | | | | | | X | X | | |
| <i>Barynotus solariorum</i> Mainardi, 1907 [E] | X | | | | N | X | X | | |
| Myorhinini Marseul, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Haptemerus lepidus</i> (Brullé, 1832) | H | | | CK | N | | X | | |
| Omiini Shuckard, 1840 | | | | | | | | | |
| <i>Elytrodon bidentatus</i> Boheman, 1834 | X | | | | | | | | |
| <i>Elytrodon italicus</i> Pesarini, 1980 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Euplatus graecus</i> (Stierlin, 1884) | | | | | | | | B | |
| <i>Omius brancsiki</i> (Reitter, 1906) | H | | | | | | | | |
| <i>Rhinomias forticornis</i> (Boheman, 1842) | | | | | | N | | | |
| Otiorrhynchini Schönherr, 1826 | | | | | | | | | |
| <i>Cirrorhynchus pilipes</i> (Leoni, 1907) [E] | H | X | | | B | X | | | |
| <i>Cirrorhynchus sclanoi</i> Abazzi & Magnano, 2003 [E] | | | | | B | B | | | |
| <i>Dodecastichus brevipes tarentinus</i> (A. Solari & F. Solari, 1915) [E] | B | | | | | X | | | |
| <i>Dodecastichus consentaneus</i> (Boheman, 1842) | | | | | CK | X | | | |
| <i>Dodecastichus dalmatinus</i> (Gyllenhal, 1834) | | | | | | | | B | |
| <i>Dodecastichus mastix</i> (A.G. Olivier, 1807) | X | | | | CK | X | | | |
| <i>Dodecastichus ovoideus</i> (Reitter, 1913) [E] | H | | | | | | | | |
| <i>Limatogaster colonnellii</i> (Magnano, 1986) [E] | | | | | B | X | | | |
| <i>Otiorrhynchus abruzzensis</i> Stierlin, 1893 [E] | | | | | B | | | | |
| <i>Otiorrhynchus affaber</i> Boheman, 1842 | B | N | | B | | | | B | |
| <i>Otiorrhynchus alpicola</i> Boheman, 1842 | | | | ! | CH | X | | | |
| <i>Otiorrhynchus alutaceus alutaceus</i> (Germar, 1817) | | | | | | X | X | | |
| <i>Otiorrhynchus alutaceus coarctaticornis</i> A. Solari & F. Solari, 1907 [E] | H | X | B | | | B | | | |
| <i>Otiorrhynchus anthracinus</i> (Scopoli, 1763) | X | X | | N | CK | X | X | B | |
| <i>Otiorrhynchus apulus</i> A. Solari & F. Solari, 1913 [E] | X | | | | | | | B | |
| <i>Otiorrhynchus armatus armatus</i> Boheman, 1842 | | X | | B | B | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Paniano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Solariola fraterna</i> Baviera, 2015 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola hirtula</i> A. Solari & F. Solari, 1923 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola margaritae</i> Bellò, G. Osella & Baviera, 2019 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola pacei</i> Bellò, G. Osella & Baviera, 2019 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola paganettii</i> (Flach, 1905) [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola pentaphyllica</i> Bellò, G. Osella & Baviera, 2019 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola poggii</i> Bellò, G. Osella & Baviera, 2019 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Solariola tedeschi</i> Bellò, G. Osella & Baviera, 2019 [E] | | | | | | | B | B | |
| Phyllobiini Schönher, 1826 | | | | | | | | | |
| <i>Argoptochus schwarzi schwarzi</i> (Reitter, 1888) | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Metacinops rhinomacer</i> Kraatz, 1862 | | | | N | B | X | X | B | |
| <i>Parascythopus baudii</i> Stierlin, 1892 [E] | | | | | | X | | | |
| <i>Phyllobius argentatus argentatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllobius chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | | B | | | | | | | |
| <i>Phyllobius emeryi</i> Desbrochers des Loges, 1873 [E] | | | | | N | | | | |
| <i>Phyllobius etruscus</i> Desbrochers des Loges, 1872 | X | | X | N | N | | X | B | |
| <i>Phyllobius italicus</i> A. Solari & F. Solari, 1904 [E] | | | N | N | N | X | N | B | |
| <i>Phyllobius longipilis</i> Boheman, 1843 [E] | H | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllobius maculicornis</i> Germar, 1823 | H | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | B | | | | | |
| <i>Phyllobius raveræ</i> A. Solari & F. Solari, 1904 [E] | | | | | N | X | X | | |
| <i>Phyllobius reicheidius</i> Desbrochers des Loges, 1873 [E] | | | | | | | X | N | |
| <i>Phyllobius romanus</i> Faust, 1890 [E] | H | | | N | N | X | X | | |
| <i>Phyllobius subdentatus</i> Boheman, 1842 [E] | | | | N | N | X | X | B | |
| <i>Phyllobius virideaeris pedestris</i> Schilsky, 1911 | | | | | | | X | B | |
| <i>Pseudomylocerus neapolitanus</i> (Pic, 1902) | | X | | N | N | X | X | N | |
| <i>Pseudomylocerus sinuatus</i> (Fabricius, 1801) | H | N | | | N | | N | | |
| Polydrusini Schönher, 1823 | | | | | | | | | |
| <i>Auchmerestes kiesenwetteri</i> Kraatz, 1862 | | | | | N | X | X | N | |
| <i>Liophloeus tessulatus</i> (O.F. Müller, 1776) | | X | | | | | | | |
| <i>Polydrusus aeratus aeratus</i> (Gravenhorst, 1807) | | | | | N | N | | N | |
| <i>Polydrusus amplicollis</i> (Desbrochers des Loges, 1902) [E] | X | | | | N | N | | | |
| <i>Polydrusus armipes</i> Brullé, 1832 | | | | | N | | | B | |
| <i>Polydrusus brevicollis</i> Desbrochers des Loges, 1872 | H | X | X | N | N | X | X | | |
| <i>Polydrusus calabricus</i> (Faust, 1890) | X | X | | | | N | | B | |
| <i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus formosus</i> (Mayer, 1779) | | | | B | | | X | | |
| <i>Polydrusus frater</i> Rottenberg, 1872 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882 | X | | | | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus kahri</i> Kirsch, 1865 | | X | | | | X | X | N | |
| <i>Polydrusus lateralis</i> Gyllenhal, 1834 | | | | | | | | N | |
| <i>Polydrusus marginatus</i> Stephens, 1831 | | | | | | | X | | |
| <i>Polydrusus modestus</i> (Stierlin, 1864) | | | N | N | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus neapolitanus</i> Desbrochers des Loges, 1872 | | | | | | | | B | |
| <i>Polydrusus picus picus</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | | | X | | |
| <i>Polydrusus pilosus italicus</i> Schilsky, 1910 [E] | X | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus pirazzolii</i> Stierlin, 1857 | H | N | | N | N | X | X | | |
| <i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840 | | | | | | X | | | |
| <i>Polydrusus raveræ</i> A. Solari & F. Solari, 1904 | | | | B | N | X | X | B | |
| <i>Polydrusus scutellaris</i> (Chevrolat, 1860) | X | | | N | N | X | X | | |
| <i>Polydrusus siculus</i> Desbrochers des Loges, 1872 | | | | | | X | | B | |
| <i>Polydrusus sparsus</i> Gyllenhal, 1834 | X | X | X | N | N | X | X | B | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Polydrusus splendens</i> A. Solari & F. Solari, 1909 | | | | | | N | | | |
| <i>Polydrusus subnotatus</i> Schilsky, 1910 | | | | | | X | X | B | |
| <i>Polydrusus tibialis</i> (Gyllenhal, 1834) | X | X | X | | N | | X | | |
| <i>Polydrusus viridicinctus</i> Gyllenhal, 1834 | X | | | | | | | | |
| Psallidiini Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Mesagroicus amicalis</i> Magnano, G. Osella & Abbazzi, 2008 [E] | | | X | | | | | | |
| Sciaphilini Sharp, 1891 | | | | | | | | | |
| <i>Brachysomus hirtus</i> (Boheman, 1845) | H | | | N | N | N | X | N | |
| <i>Pleurodirus doderoi</i> (D'Amore Fracassi, 1907) | H | | | | | | | | |
| <i>Sciaphobus abbreviatus</i> (Desbrochers des Loges, 1871) [E] | X | | | | | | | | |
| Sitonini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Charagmus cachectus</i> (Gyllenhal, 1834) | X | X | | | | | | | |
| <i>Charagmus gressorius</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | N | X | B | |
| <i>Charagmus intermedius</i> (Küster, 1847) | | | N | | | X | X | B | |
| <i>Charagmus variegatus</i> (Fähræus, 1840) | X | N | | | | | X | | |
| <i>Coelositona cambricus</i> (Stephens, 1831) | | | | | | X | X | | |
| <i>Coelositona cinerascens</i> (Fähræus, 1840) | | | | | | X | | | |
| <i>Coelositona limosus</i> (P. Rossi, 1792) | H | X | | | | X | X | | |
| <i>Sitona callosus</i> Gyllenhal, 1834 | X | | | | | X | X | B | |
| <i>Sitona cinnamomeus</i> Allard, 1863 | | | | N | | | | | |
| <i>Sitona cylindricollis cylindricollis</i> Fähræus, 1840 | X | | X | | N | | | N | |
| <i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal, 1834 | X | X | | N | N | X | | N | |
| <i>Sitona gemellatus</i> Gyllenhal, 1834 | H | | | | | | | B | |
| <i>Sitona goetzelmmi</i> Reitter, 1909 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Sitona hirsutus</i> Desbrochers des Loges, 1884 | | | | | | | X | | |
| <i>Sitona hispidulus</i> (Fabricius, 1777) | | | N | N | | X | | B | |
| <i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831 | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Sitona lividipes lividipes</i> Fähræus, 1840 | | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Sitona macularius macularius</i> (Marshall, 1802) | H | | X | N | N | | N | B | |
| <i>Sitona obsoletus obsoletus</i> (Gmelin, 1790) | | | | | | | X | B | |
| <i>Sitona ophthalmicus</i> Desbrochers des Loges, 1869 | H | | N | | | | X | B | |
| <i>Sitona puncticollis</i> Stephens, 1831 | H | | X | B | | X | X | B | |
| <i>Sitona sekeræ</i> Reitter, 1903 [E] | X | | | | | | X | | |
| <i>Sitona sulcifrons argutulus</i> Gyllenhal, 1834 | H | X | X | B | N | X | X | B | |
| <i>Sitona suturalis</i> Stephens, 1831 | X | X | X | | N | X | X | B | |
| <i>Sitona tenuis</i> Rosenhauer, 1847 | | B | | | N | N | | N | |
| <i>Sitona verecundus</i> (P. Rossi, 1790) | H | | | | N | | | | |
| <i>Sitona waterhousei waterhousei</i> Walton, 1846 | | X | | | | | | | |
| Tanymecini Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| Tanymecina Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Cycloderes canescens</i> (P. Rossi, 1792) | B | B | | | | | | | |
| <i>Cycloderes fritillum</i> (Panzer, 1794) | | X | | | | | | | |
| <i>Cycloderes pomini</i> F. Solari, 1954 [E] | | | | | | | | B | |
| <i>Tanymecus palliatus</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | X | N | |
| <i>Tanymecus submaculatus</i> Chevrolat, 1860 | X | X | | | | | | B | |
| Trachyphloeini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Cathormiocerus aristatus</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | | ! | | |
| <i>Cathormiocerus discors</i> Desbrochers des Loges, 1875 | | | | | | | | ! | |
| <i>Cathormiocerus hircus</i> Desbrochers des Loges, 1896 | | | | | ! | | ! | ! | |
| <i>Cathormiocerus validiscapus</i> Rouget, 1857 | | | | | ! | | | | |
| <i>Pelletierellus calabricus</i> (Borovec, 1986) | | | | | | B | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Romualdius canaliculatus</i> (L.W. Schaufuss, 1867) | X | X | | | B | | B | | |
| <i>Romualdius peyerinhoffi</i> (Formanek, 1910) | B | | | | | | | | |
| <i>Romualdius scaber</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | B | X | | |
| <i>Stuebenius amicalis</i> (Borovec & G. Osella, 1993) | | | | B | B | | ! | | |
| <i>Trachyphloeus alternans</i> Gyllenhal, 1834 | X | | | | | X | ! | ! | |
| <i>Trachyphloeus laticollis</i> Boheman, 1842 | X | | | | CK | X | X | B | |
| <i>Trachyphloeus nodipennis</i> Chevrolat, 1860 | | | X | | | | | | |
| <i>Trachyphloeus spinimanus</i> Germar, 1823 | CK | | | | CK | X | | CK | |
| Hyperinae Marseul, 1863 | | | | | | | | | |
| Hyperini Marseul, 1863 | | | | | | | | | |
| <i>Brachypera crinita</i> (Boheman, 1834) | H | X | | | N | X | | B | |
| <i>Brachypera dauci</i> (A.G. Olivier, 1807) | | | | | | | | B | |
| <i>Brachypera zoilus</i> (Scopoli, 1763) | H | X | | | N | X | X | B | |
| <i>Coniatus suavis</i> Gyllenhal, 1834 | | | | | | | | B | |
| <i>Coniatus tamarisci</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | | N | | | B | |
| <i>Donus brucki</i> (Capiomont, 1868) [E] | | | | | | X | X | | |
| <i>Donus cyrtus</i> (Germar, 1821) | X | | | | | | X | | |
| <i>Donus fiumanus</i> (Petri, 1901) | | | | | N | | | | |
| <i>Donus philanthus</i> (A.G. Olivier, 1807) | H | X | | | | N | | B | |
| <i>Donus salviae</i> (Schränk, 1789) | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Hypera arator</i> (Linnaeus, 1758) | H | | | | | | | | |
| <i>Hypera conmaculata</i> Herbst, 1795 | | X | | B | | | | | |
| <i>Hypera contaminata</i> (Herbst, 1795) | | X | | | | | | | |
| <i>Hypera melancholica</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | | X | X | B | |
| <i>Hypera meles</i> (Fabricius, 1792) | H | X | | | N | N | X | N | |
| <i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775) | H | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Hypera pastinacae</i> (P. Rossi, 1790) | H | | | | | | | | |
| <i>Hypera plantaginis</i> (DeGeer, 1775) | | | N | | | | | B | |
| <i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813) | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Hypera rumicis</i> (Linnaeus, 1758) | | | X | | | | | | |
| <i>Hypera striata</i> (Boheman, 1834) | X | | | | | | X | | |
| <i>Hypera venusta</i> (Fabricius, 1781) | H | X | X | | | X | X | B | |
| <i>Hypera viciae</i> (Gyllenhal, 1813) | X | | | | | | | | |
| <i>Limobius borealis borealis</i> (Paykull, 1792) | H | X | X | N | N | X | | B | |
| Lixinae Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Cleonini Schönherr, 1826 | | | | | | | | | |
| <i>Asproparthenis albicans</i> (Gyllenhal, 1834) | X | | | | | | | | |
| <i>Asproparthenis maculicollis</i> (Chevrolat, 1873) | | B | | | | | | | |
| <i>Bothynoderes affinis</i> (Schränk, 1781) | X | | | | | | | | |
| <i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763) | H | X | X | | N | X | X | N | |
| <i>Coniocleonus excoriatus</i> (Gyllenhal, 1834) | X | | | | | | | | |
| <i>Coniocleonus megalographus</i> (Fähræus, 1842) | X | | | | | | | | |
| <i>Coniocleonus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | ! | | | | | | | B | |
| <i>Coniocleonus nigrosuturatus</i> (Goeze, 1777) | H | | | | | | | | |
| <i>Conorhynchus luigionii</i> A. Solari & F. Solari, 1905 | X | X | | | | | | | |
| <i>Conorhynchus mendicus</i> (Gyllenhal, 1834) | B | B | | | | | | | |
| <i>Cyphocleonus testatus</i> (Gyllenhal, 1834) | H | | | | | | | | |
| <i>Leucophyes pedestris</i> (Poda von Neuhaus, 1761) | H | | | | | | | | |
| <i>Lixomorphus algirus</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | | | X | X | | |
| <i>Mecaspis alternans</i> (Hellwig, 1795) | X | X | | | | X | X | B | |
| <i>Mecaspis emarginata</i> (Fabricius, 1787) | | | | B | ! | X | ! | B | |
| <i>Pachycerus madidus</i> (A.G. Olivier, 1807) | | X | | | | | | | |
| <i>Pachycerus segnis</i> (Germar, 1823) | H | X | | | ! | X | X | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schrank, 1781) | H | | | | | | | B | |
| <i>Pseudocleonus grammicus</i> (Panzer, 1789) | X | | | | | | | | |
| <i>Pseudocleonus italicus</i> F. Solari, 1950 [E] | | | | | | X | | | |
| <i>Rhabdorhynchus echii</i> (Brahm, 1790) | H | X | | | | ! | B | | |
| <i>Temnorhinus mendicus</i> (Gyllenhal, 1834) | X | | | | | ! | | | |
| <i>Trachydemus rugosus</i> (P.H. Lucas, 1846) | | B | | | | | | | |
| Lixini Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| <i>Bangastermus orientalis</i> (Capiomont, 1873) | H | | | | | | | | |
| <i>Larinus carinirostris</i> Gyllenhal, 1835 | H | | | B | | X | X | B | |
| <i>Larinus carlinae</i> (A.G. Olivier, 1807) | | | | | | X | X | | |
| <i>Larinus cynarae</i> (Fabricius, 1787) | H | X | | | N | N | | B | |
| <i>Larinus iaceae</i> (Fabricius, 1775) | | X | N | B | N | X | X | B | |
| <i>Larinus latus</i> (Herbst, 1783) | H | | | B | | | | | |
| <i>Larinus maurus</i> (A.G. Olivier, 1807) | H | | | | | | | | |
| <i>Larinus obtusus</i> Gyllenhal, 1835 | H | | | | N | X | X | B | |
| <i>Larinus planus</i> (Fabricius, 1792) | H | X | X | N | | X | X | B | |
| <i>Larinus pollinis</i> (Laicharting, 1781) | | B | | | | | X | B | |
| <i>Larinus scolymi</i> (A.G. Olivier, 1807) | H | X | | B | | X | | B | |
| <i>Larinus sturnus</i> (Schaller, 1783) | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| <i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1835 | X | X | | B | N | X | X | N | |
| <i>Larinus ursus</i> (Fabricius, 1792) | H | | | | N | | | | |
| <i>Larinus vulpes</i> (A.G. Olivier, 1807) | | | | | | X | | | |
| <i>Lixus abdominalis</i> Boheman, 1835 | X | X | | ! | | X | X | B | |
| <i>Lixus acicularis</i> Germar, 1823 | H | | X | | | X | X | | |
| <i>Lixus albomarginatus</i> Boheman, 1842 | ! | | | | | | X | | |
| <i>Lixus anguinus</i> (Linnaeus, 1767) | | X | | | | | | B | |
| <i>Lixus angustus</i> (Herbst, 1795) | | X | N | B | N | X | X | B | |
| <i>Lixus ascanii</i> (Linnaeus, 1767) | H | | | B | | X | ! | B | |
| <i>Lixus bardanae</i> (Fabricius, 1787) | ! | N | X | | ! | | X | | |
| <i>Lixus cardui</i> A.G. Olivier, 1807 | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Lixus cinerascens</i> Schönherr, 1832 | X | N | | | N | N | | | |
| <i>Lixus curvirostris</i> Capiomont, 1875 | X | | | | | X | | | |
| <i>Lixus cylindrus</i> (Fabricius, 1781) | | X | | | | | | | |
| <i>Lixus fasciculatus</i> Boheman, 1835 | H | X | | | | X | X | B | |
| <i>Lixus filiformis</i> (Fabricius, 1781) | N | N | X | N | N | | ! | N | |
| <i>Lixus iridis</i> A.G. Olivier, 1807 | H | X | X | N | ! | X | X | B | |
| <i>Lixus juncii</i> Boheman, 1835 | X | X | | B | ! | | ! | B | |
| <i>Lixus lateralis</i> (Panzer, 1789) | | | | | | X | | | |
| <i>Lixus mucronatus</i> (A.G. Olivier, 1791) | | | X | | | | | | |
| <i>Lixus myagri</i> A.G. Olivier, 1807 | H | | | | | X | | | |
| <i>Lixus ochraceus</i> Boheman, 1842 | | | | | | | X | | |
| <i>Lixus paraplecticus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | B | |
| <i>Lixus pulverulentus</i> (Scopoli, 1763) | X | X | | | ! | | ! | B | |
| <i>Lixus scolopax</i> Boheman, 1835 | H | X | | | | | | | |
| <i>Lixus tibialis</i> Boheman, 1842 | | | | | | B | | | |
| <i>Lixus umbellatarum</i> (Fabricius, 1787) | H | | | B | | | | | |
| <i>Lixus vilis</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | N | | | X | B | |
| <i>Microlarinus lareynii</i> (Jacquelin du Val, 1853) | X | B | | | | | | | |
| <i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792) | X | X | X | N | N | X | X | B | |
| Mesoptiliinae Lacordaire, 1863 | | | | | | | | | |
| Magdalinini Pascoe, 1870 | | | | | | | | | |
| <i>Magdalis armigera</i> (Geoffroy, 1785) | H | X | | | N | | X | | |
| <i>Magdalis barbicornis</i> (Latreille, 1804) | H | | | | N | X | | | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio I. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Magdalis cerasi</i> (Linnaeus, 1758) | H | X | X | N | N | X | X | N | |
| <i>Magdalis exarata</i> C.N.F. Brisout de Barneville, 1862 | H | | | | N | X | X | N | |
| <i>Magdalis flavicornis</i> (Gyllenhal, 1836) | | | | | | | X | N | |
| <i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827) | | X | | N | | X | X | | |
| <i>Magdalis memnonia</i> (Gyllenhal, 1837) | | | | | | X | X | B | |
| <i>Magdalis nitidipennis</i> Boheman, 1843 | | X | X | | N | | | N | |
| <i>Magdalis rufa</i> Germar, 1823 | X | | | | | | | B | |
| <i>Magdalis ruficornis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | N | |
| <i>Magdalis scutellaris</i> K. Daniel, 1903 | X | | | | | | | | |
| <i>Magdalis violacea</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | | |
| Molytinae Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Cryptorhynchini Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| Cryptorhynchina Schönherr, 1825 | | | | | | | | | |
| <i>Cryptorhynchus lapathi</i> (Linnaeus, 1758) | | B | | | N | | | | LC |
| Tylodina Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Acalles camelus</i> (Fabricius, 1792) | X | X | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Acalles lemur cisalpinus</i> Stüben, 2003 [E] | X | | | N | N | X | X | | NT |
| <i>Acalles papei</i> A. Solari & F. Solari, 1905 | | | | | ! | | | | LC |
| <i>Acalles parvulus</i> Boheman, 1837 | N | B | | N | N | X | N | N | LC |
| <i>Acallocrates denticollis</i> (Germar, 1823) | H | ! | | | N | N | | | LC |
| <i>Acallocrates minutusquamosus</i> (Reiche, 1861) | | X | | N | N | X | X | B | LC |
| <i>Acallorneuma reitteri</i> Mainardi, 1906 [E] | | | | | | N | | | NT |
| <i>Coloracalles humerosus</i> (Fairmaire, 1862) | N | | | | | | | | VU |
| <i>Dichromacalles diocletianus</i> (Germar, 1817) | | X | | | | ! | | N | |
| <i>Dichromacalles dromedarius</i> (Boheman, 1844) | | | | | | | | N | |
| <i>Dichromacalles rolletii</i> (Germar, 1839) | | | | | | | | B | NT |
| <i>Echinodera aspromontensis</i> Stüben, 2008 [E] | ! | ! | | N | B | B | N | B | |
| <i>Echinodera bellieri</i> (Reiche, 1861) | X | X | | | B | B | X | B | NT |
| <i>Echinodera brisouti brisouti</i> Reitter, 1885 | H | X | | N | B | N | | B | LC |
| <i>Echinodera hypocrita</i> (Boheman, 1837) | H | N | | | N | X | X | N | LC |
| <i>Echinodera siciliensis</i> Stüben, 2003 [E] | N | | | | | | | | NT |
| <i>Echinodera variegata</i> (Boheman, 1837) | X | B | | | | X | X | B | NT |
| <i>Elliptacalles longus</i> (Desbrochers des Loges, 1892) | | | | | N | N | | B | NT |
| <i>Kykliacalles aubei</i> (Boheman, 1837) | H | X | | N | N | X | X | N | LC |
| <i>Kykliacalles fausti</i> (P. Meyer, 1896) | | B | | | | X | | | LC |
| <i>Kykliacalles naviesi</i> (Boheman, 1837) | N | | | | N | N | | | LC |
| <i>Kykliacalles roboris</i> (Curtis, 1834) | X | | | N | N | N | | | LC |
| <i>Kykliacalles saccoi</i> (Colonnelli, 1973) [E] | | | | | | X | ! | | NT |
| <i>Kykliacalles solarii</i> (A. Fiori, 1903) [E] | | X | | | N | B | | B | LC |
| <i>Onyxacalles luigionii</i> (A. Solari & F. Solari, 1907) | X | | | | N | X | | ! | LC |
| Ithyporini Lacordaire, 1865 | | | | | | | | | |
| <i>Camptorhinus simplex</i> Seidlitz, 1867 | | | X | | ! | | | | LC |
| <i>Camptorhinus statua</i> (P. Rossi, 1790) | X | X | | | N | X | X | | LC |
| Lepyrini Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Lepyryus palustris palustris</i> (Scopoli, 1763) | X | X | | | N | | | | |
| Molytini Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| Hylobiina Kirby, 1837 | | | | | | | | | |
| <i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | N | X | X | B | LC |
| <i>Hylobius transversovittatus</i> (Goeze, 1777) | | B | | | | | | | LC |
| Molytina Schönherr, 1823 | | | | | | | | | |
| <i>Anisorhynchus barbarus</i> (Boheman, 1834) | | | | | | | X | CK | |
| <i>Anisorhynchus monachus monachus</i> (Germar, 1817) | H | X | | | CK | | CK | CK | |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Xylocleptes bispinus</i> (Duftschmid, 1825) | H | | X | N | | X | | N | LC |
| Hylastini LeConte, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Hylastes angustatus</i> (Herbst, 1763) | | | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836 | | | | | | | X | | LC |
| <i>Hylastes pinicola</i> (Bedel, 1888) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813) | | | | | | | X | N | LC |
| Hylesinini Erichson, 1836 | | | | | | | | | |
| <i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | | | LC |
| <i>Hylesinus taranio</i> (Danthoine, 1788) | | X | | | | N | | | LC |
| <i>Hylesinus varius</i> (Fabricius, 1775) | X | X | | | | N | | | |
| <i>Kissophagus novaki</i> Reitter, 1894 | | X | X | | | | | | LC |
| <i>Kissophagus vicinus</i> (Comolli, 1837) | | N | | | | | | | LC |
| Hylurgini Gistel, 1848 | | | | | | | | | |
| <i>Chaetoptelius vestitus</i> (Mulsant & Rey, 1861) | | X | | | | | | | LC |
| <i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1787) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Hylurgus micklitzii</i> Wachtl, 1881 | X | | | | | | | | LC |
| <i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834) | | | | | | | X | B | LC |
| <i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | B | LC |
| Hypoborini Nüsslin, 1911 | | | | | | | | | |
| <i>Hypoborus ficus</i> Erichson, 1836 | X | X | | | | N | | N | LC |
| Ipini Bedel, 1888 | | | | | | | | | |
| <i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1776) | | | | N | | X | X | N | LC |
| <i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | X | N | LC |
| <i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857) | X | X | | | | N | | | LC |
| <i>Orthotomicus laricis</i> (Fabricius, 1792) | | X | | N | | X | X | | LC |
| <i>Orthotomicus proximus</i> (Eichhoff, 1868) | B | | | | | | | | LC |
| <i>Orthotomicus suturalis</i> (Gyllenhal, 1827) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1783) | | | | | | X | X | | LC |
| <i>Pityogenes bistridentatus</i> (Eichhoff, 1878) | B? | | | | | X | X | N | LC |
| <i>Pityogenes calcaratus</i> (Eichhoff, 1878) | B | | | | | | X | | LC |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1760) | X | | | | | | | | LC |
| <i>Pityogenes trepanatus</i> (Nördlinger, 1848) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (Germer, 1824) | | | | | | X | | | LC |
| Phloeosinini Nüsslin, 1912 | | | | | | | | | |
| <i>Phloeosinus thujae</i> (Perris, 1855) | X | | | | | | | | LC |
| Phloeotribini Chapuis, 1869 | | | | | | | | | |
| <i>Phloeotribus cristatus</i> (Fauvel, 1889) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Phloeotribus rhododactylus</i> (Marsham, 1802) | | N | | | | | | | LC |
| <i>Phloeotribus scarabaeoides</i> (Bernard, 1788) | | X | | | | | | N | LC |
| Polygraphini Chapuis, 1869 | | | | | | | | | |
| <i>Carphoborus pini</i> Eichhoff, 1881 | X | | | | | | | | LC |
| <i>Polygraphus grandiclava</i> C.G. Thomson, 1886 | | | | | | X | | N | LC |
| Scolytini Latreille, 1804 | | | | | | | | | |
| <i>Scolytus amygdali</i> Guérin-Méneville, 1847 | X | | | | | N | | N | LC |
| <i>Scolytus ensifer</i> Eichhoff, 1881 | | X | | | | | | | VU |
| <i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837) | | | | | | | X | | LC |
| <i>Scolytus kirschii kirschii</i> Skalitzky, 1876 | | X | | | | | | | LC |
| <i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham, 1802) | X | X | | N | B | N | X | N | LC |
| <i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787) | | X | | | | | | | LC |
| <i>Scolytus rugulosus</i> (P.W.J. Müller, 1818) | H | X | | | | X | X | | LC |
| <i>Scolytus sulcifrons</i> Rey, 1892 | | N | | | B | | | | LC |

| Species | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | IUCN category |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Xyleborini LeConte, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Anisandrus dispar</i> (Fabricius, 1792) | X | | | | | | | | LC |
| <i>Xyleborinus saxeseni</i> (Ratzeburg, 1837) | H | X | X | N | | | | N | LC |
| <i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837) | H | N | | | | | | | LC |
| <i>Xyleborus eurygraphus</i> (Ratzeburg, 1837) | | | | | | | | B | LC |
| <i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792) | H | | X | | | X | X | | LC |
| Xyloteriini LeConte, 1876 | | | | | | | | | |
| <i>Trypodendron domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | | N | | | | X | X | | LC |
| <i>Trypodendron lineatum</i> sa (A.G. Olivier, 1800) | | | | | | X | | | LC |
| <i>Trypodendron signatus</i> (Fabricius, 1792) | | | | | | X | | | LC |
| Curculionidae taxa incertae sedis | | | | | | | | | |
| <i>Absoloniella servadeii</i> (G. Osella, 1982) [E] | B | | | | | | | | |

CONCLUSIONS

The latest author’s research as well as the data available in literature have greatly increased the number of known species in the surveyed areas. The situation that emerges is summarized in following Table 2.

The presence of saproxylic species in the study sites is rather conspicuous; in fact, they amount to 56.1% of the overall saproxylic species known for Italy. However, this figure should not be misleading, since the last column of following Table 3 shows that the “Critically endangered” (CR) species make up just 25.9% of the total on Italy and the “Endangered” species (EN) and “Vulnerable” (VU) account for 27% and 40% respectively.

It can be deduced that the level of research, especially in some of the areas, is not yet sufficiently exhaustive and that the sites subject of the survey suffer from a considerable degree of anthropization or incorrect management of wooded areas, so that the entomofauna of special conservation interest proves to be, to some extent, impoverished. In many recent papers on saproxylic fauna the need to maintain a certain amount of dead wood in the forests is underlined, a good practice that unfortunately is often not applied.

According to the fifty-year experience of the author researching Coleoptera, it would be necessary to establish integral nature reserves in ancient woodland as well as regulating livestock grazing in grasslands that are increasingly depleted.

It is considered useful and necessary, mainly in the perspective of future research, to comment on the data presented here despite the fact that it is difficult to separate the mere judgment based on sterile numbers from personal sentiment, because these are places that the author investigated for more than four decades (starting from distant 1968) witnessing too many changes, often irreversible, with consequent progressive decline of the fauna.

Particularly, from an examination of the data summarized in Tables 2 and 4, it clearly emerges that only the Coleoptera fauna of Policoro Wood can be considered sufficiently studied. With its 2,353 species collected in an area of just 680 hectares, this site is perhaps one of those that show greater biodiversity throughout the Mediterranean basin. The reasons are many: it is an ancient floodplain forest with a quite varied and dense vegetation so that it preserves a certain microclimate and, although today reduced to a very small portion of those forests that once covered the entire Metapontino, for this same reason it represents a last exiguous shelter for all those forest dwelling species that have undergone the inexorable erosion of their habitat; it is also placed in a favorable position at the mouth of Sinni river which, especially before the construction of the Monte Cotugno dam, during the floods washed downstream huge quantities of debris, and with them species, from inland; last but not least, studies here have been conducted extensively by researchers of several disciplines.

| Site | Species in Angelini's catalogues (1986-1996) | New data by Angelini + in literature + in CKmap | Total species known to date |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Gargano Promontory | 2,291 | 301 | 2,592 |
| Policoro Wood | 1,823 | 530 | 2,353 |
| Pantano Lake of Pignola | 992 | 259 | 1,251 |
| Mount Vulture-Monticchio Lakes | - | 1,427 | 1,427 |
| Central Lucan Apennines | - | 2,315 | 2,315 |
| Pollino Massif | 1,824 | 931 | 2,755 |
| Sila Plateau | 1,741 | 350 | 2,091 |
| Aspromonte | - | 2,715 | 2,715 |

Table 2. The increase in number of known species, from the publication of the catalogues on Coleoptera in the 1980s–1990s to the present.

| IUCN Category | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | Total | Italy total | % |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|-------|-------------|------|
| CR | 4 | 8 | | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 21 | 81 | 25.9 |
| EN | 10 | 15 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 8 | 33 | 122 | 27.0 |
| VU | 31 | 31 | 1 | 7 | 31 | 55 | 36 | 38 | 86 | 215 | 40.0 |
| NT | 80 | 64 | 12 | 20 | 69 | 92 | 77 | 90 | 191 | 348 | 54.9 |
| LC | 395 | 393 | 122 | 243 | 368 | 484 | 372 | 415 | 708 | 977 | 72.5 |
| DD | 25 | 26 | 11 | 8 | 26 | 23 | 14 | 36 | 74 | 240 | 30.8 |
| NA | | 1 | | | | | | 1 | 2 | - | - |
| Total | 545 | 538 | 148 | 286 | 513 | 677 | 517 | 594 | 1,115 | 1,986 | 56.1 |

Table 3. Number of saproxylic species in each of the surveyed areas, compared to the total and percentage for Italy (CR: Critically Endangered; EN: Endangered; VU: Vulnerable; NT: Nearly Threatened; LC: Least Concern; DD: Data Deficient; NA: Not Applicable).

Even the Coleoptera fauna of Pantano Lake of Pignola can be considered sufficiently known taking into account the features and limited extent of this site, as evidenced by the high number of species typical of meadow areas and of lakes shores that it shows.

In the district of Mount Vulture-Monticchio

Lakes, despite the relatively small size, the number of species surveyed is probably less than the expected total considering the peculiar characteristics of the biotope.

Gargano Promontory, although explored at length by several researchers and given the variety of environments and the extension, records a num-

ber of species (2,591) decidedly lower than a realistic estimation. It can be assumed that especially the fauna of the coasts, where saved by the tourist encroachment and pressure, should still reveal many novelties.

Fauna of Central Lucan Apennines, known for over 2/3 on the basis of published or unpublished personal data, could prove to be more abundant, as shown by particularly targeted research conducted by other entomologists in the Gallipoli-Cognato woods.

Faunal total of Pollino Massif, in the light of the many and often interdisciplinary researches it has been subjected to and the fact that most of the data comes from territories located over 1,000 meters above sea level, can be considered sufficiently investigated and close to the real one.

As far as Sila Plateau is concerned, the data possessed or deduced from bibliography are decidedly incomplete; it is to be regarded as the site whose fauna is less well known, especially that of the soil, as will be discussed later about Staphylinidae.

The Aspromonte, curiously, shows a species number almost similar to that of Gargano Promontory with which it shares, broadly, also the territorial extension, despite having been less investigated. And like Gargano Promontory, it is believed that the currently known fauna of Aspromonte, based for 1/3 on mostly previously unpublished personal data, is partially incomplete and that more data may emerge from research aimed at the study mainly of floricolous species both of mountainous areas and of the shorelines least damaged by human impact.

A numerical analysis of the presence of the various families in each of the sites (Table 4) confirms and amplifies what has been remarked above. Taking into account the 12 families represented by over 100 species in this study, the following observations can be made:

- Ptinidae (103 species): in Pollino Massif, Policoro Wood, Aspromonte and Gargano Promontory the number of species varies between 47–54 (equal to approximately 50% of the treated species); the 27 and 34 species recorded for Mount Vulture-Monticchio Lakes and Central Lucan Apennines are believed not to fully represent the actual presence of this family in these areas, while the low number of species known for Pantano Lake of Pignola is to be attributed to the particular features of the site.

- Nitidulidae (113 species): represented on average by 51–68 species, the high and significant number of species known for Pollino Massif (87, that is 77% of total) stands out, while the 30 species known for Mount Vulture-Monticchio Lakes are to be considered heavily underestimated; regarding this family it should however be noted that 7,500 specimens collected by the author are still undetermined.

- Elateridae (117 species): represented on average with about 53–63 species, the positive peak of 77 species for Pollino Massif should be noted while the lesser total of 22 for the Pantano Lake of Pignola is largely imputable to the particular characteristics of the site; Sila Plateau and Aspromonte confirm that they have a similar trend (75 and 72 species respectively).

- Brentidae (sensu lato) (134 species): it is interesting to note how Gargano Promontory, Pollino Massif and Aspromonte are settled on 76–80 species while Policoro Wood has a strange smaller peak of 47 species, similar to that of Central Lucan Apennines. The number of species known for Pantano Lake of Pignola is significant, 52 species, reflecting the high biodiversity of this site regarding the floricolous fauna, a situation also found for other families not discussed here (Coccinellidae).

- Buprestidae (135 species): in this family a high number of known species is recorded for Pollino Massif (96, equal to 71.1% of the total) and Policoro Wood (95); the other sites have 70–77 species while the small number of Pantano Lake of Pignola stands out, 21 species collected only in meadows surrounding the lake, given the almost total absence of trees nearby.

- Tenebrionidae (147 species): family whose species have a remarkably diversified ecology, not by chance for Aspromonte, Gargano Promontory and Policoro Wood, therefore sites that include shorelines, 77–90 species are known (90 for the first site) while Central Lucan Apennines, Pollino Massif and Sila Plateau stand on 48–61 species; the lesser total of just 20 species of Pantano Lake of Pignola is due to its peculiar geomorphological characteristics.

- Scarabaeidae (169 species): the average number in most sites (five) varies between 87 and 99 species; the primacy of known species belongs to Aspromonte (120) and the negative one to Pantano Lake of Pignola (just 29).

| Family | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | Red List of saproxylic | Total |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|-------|
| Sphaeriidae | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Gyrinidae | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | | 9 |
| Rhysodidae | 2 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Carabidae | 233 | 253 | 109 | 172 | 224 | 220 | 201 | 278 | | 475 |
| Halipidae | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 9 |
| Noteridae | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 |
| Hygrobiidae | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| Dytiscidae | 40 | 49 | 23 | 16 | 52 | 45 | 44 | 54 | | 89 |
| Hydrophilidae | 24 | 40 | 26 | 18 | 19 | 30 | 30 | 34 | | 65 |
| Helophoridae | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | | 18 |
| Hydrochidae | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 3 |
| Georissidae | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| Histeridae | 73 | 51 | 11 | 29 | 62 | 55 | 51 | 54 | 26 | 98 |
| Hydraenidae | 15 | 11 | 9 | 6 | 21 | 20 | 18 | 27 | | 53 |
| Ptiliidae | 19 | 18 | 11 | 12 | 20 | 17 | 11 | 27 | 28 | 45 |
| Agyrtidae | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Leiodidae | 40 | 30 | 17 | 31 | 47 | 50 | 32 | 44 | 24 | 75 |
| Silphidae | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | | 13 |
| Staphylinidae | 368 | 319 | 222 | 198 | 396 | 400 | 230 | 431 | 96 | 853 |
| Geotrupidae | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | | 11 |
| Trogidae | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
| Lucanidae | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Ochodaeidae | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Hybosoridae | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Scarabaeidae | 97 | 87 | 29 | 68 | 88 | 99 | 90 | 120 | 14 | 169 |
| Eucinetidae | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Clambidae | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Scirtidae | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 18 |
| Dascillidae | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Buprestidae | 70 | 95 | 21 | 39 | 77 | 96 | 74 | 72 | 96 | 135 |
| Byrrhidae | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Elmidae | | | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | | 12 |
| Dryopidae | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | 12 |
| Limnichidae | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 3 | | 4 |
| Heteroceridae | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 7 |
| Artematopodidae | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Eucnemidae | 2 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Throscidae | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 |
| Lycidae | 3 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lampyridae | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 5 |
| Cantharidae | 35 | 21 | 12 | 28 | 30 | 58 | 40 | 40 | | 77 |
| Omalisidae | | 2 | | | 1 | | | | | 2 |
| Elateridae | 62 | 53 | 22 | 39 | 63 | 77 | 75 | 72 | 36 | 117 |
| Derodontidae | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Nosodendridae | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Dermestidae | 22 | 20 | 9 | 11 | 12 | 26 | 18 | 12 | 11 | 42 |
| Bostrichidae | 9 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 12 | 17 | 18 |

Table 4/1. Number of species, per family, in each of the sites, in the Italian Red List of saproxylic Coleoptera and total.

| Family | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | Red List of saproxylic | Total |
|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|-------|
| Ptinidae | 47 | 53 | 10 | 27 | 34 | 54 | 30 | 50 | 65 | 103 |
| Lymexylidae | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Byturidae | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 2 |
| Biphyllidae | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Peltidae | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lophocateridae | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Trogossitidae | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Thymalidae | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rhadalidae | 2 | 3 | | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 |
| Melyridae | 41 | 32 | 22 | 30 | 41 | 52 | 37 | 45 | 17 | 77 |
| Cleridae | 13 | 12 | 6 | 7 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 20 |
| Sphindidae | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Erotylidae | 8 | 8 | | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 14 | 15 |
| Monotomidae | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 |
| Kateretidae | 6 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 9 |
| Nitidulidae | 56 | 45 | 32 | 30 | 45 | 87 | 51 | 68 | 26 | 113 |
| Cryptophagidae | 31 | 31 | 22 | 15 | 36 | 32 | 20 | 39 | 30 | 68 |
| Silvanidae | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| Cucujidae | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Phalacridae | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 17 | 10 | 12 | | 23 |
| Laemophloeidae | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Cybocephalidae | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Bothrideridae | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Teredidae | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| Cerylonidae | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Latridiidae | 24 | 30 | 23 | 15 | 30 | 27 | 19 | 38 | 42 | 55 |
| Alexiidae | 3 | | | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Corylophidae | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 | 18 |
| Anamorphidae | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 3 |
| Endomychidae | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 15 | 5 | 19 |
| Mycetaeidae | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coccinellidae | 44 | 42 | 44 | 28 | 34 | 41 | 42 | 41 | | 77 |
| Mycetophagidae | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| Ciidae | 12 | 16 | 4 | 9 | 11 | 23 | 9 | 11 | 27 | 30 |
| Tetratomidae | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Melandryidae | 3 | 2 | | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Mordellidae | 21 | 16 | 2 | 1 | 4 | 23 | 14 | 2 | 1 | 35 |
| Ripiphoridae | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 |
| Zopheridae | 11 | 9 | 3 | 8 | 14 | 14 | 10 | 13 | 20 | 20 |
| Tenebrionidae | 78 | 77 | 20 | 30 | 48 | 61 | 58 | 90 | 49 | 147 |
| Prostomidae | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Oedemeridae | 14 | 16 | 8 | 13 | 19 | 18 | 16 | 18 | 11 | 23 |
| Meloidae | 20 | 11 | 6 | 9 | 13 | 15 | 19 | 20 | | 27 |
| Mycteridae | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 3 |
| Pyrochroidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Salpingidae | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| Anthicidae | 26 | 33 | 16 | 10 | 15 | 22 | 17 | 30 | | 48 |

Table 4/2. Number of species, per family, in each of the sites, in the Italian Red List of saproxylic Coleoptera and total.

| Family | Gargano Promontory | Policoro Wood | Pantano Lake of Pignola | M. Vulture Monticchio L. | Central Lucan Apennines | Pollino Massif | Sila Plateau | Aspromonte | Red List of saproxylic | Total |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|-------|
| Aderidae | 3 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Scraptiidae | 18 | 17 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 8 | 8 | 25 |
| Vesperidae | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Cerambycidae | 107 | 84 | 25 | 73 | 105 | 120 | 101 | 89 | 150 | 181 |
| Megalopodidae | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Orsodacnidae | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Chrysomelidae | 237 | 181 | 161 | 107 | 210 | 223 | 176 | 205 | | 427 |
| Nemonychidae | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Anthribidae | 11 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 13 | 15 |
| Attelabidae | 23 | 12 | 7 | 17 | 23 | 20 | 17 | 19 | | 30 |
| Brentidae | 80 | 47 | 52 | 44 | 47 | 80 | 66 | 76 | 1 | 134 |
| Curculionidae | 382 | 304 | 157 | 159 | 258 | 350 | 259 | 320 | 113 | 750 |
| Totals | 2,592 | 2,353 | 1,251 | 1,427 | 2,315 | 2,755 | 2,091 | 2,715 | 1,115 | 5,130 |

Table 4/3. Number of species, per family, in each of the sites, in the Italian Red List of saproxylic Coleoptera and total.

- Cerambycidae (181 species): the numerical dynamics of this family that accounts for the greatest quantity of saproxylic species is particularly important and significant; while Pollino Massif shows up for the greater number of species (120), Pantano Lake of Pignola is confirmed as having the least diverse fauna with just 25 species; indicative is the clear difference, generally not perceptible, between the fauna of Gargano Promontory and that of Aspromonte, 107 and 89 species respectively, while strangely Policoro Wood with 84 species places itself below Sila Plateau and Central Lucan Apennines which count, respectively, 101 and 105.

- Chrysomelidae (427 species): Gargano Promontory with 237 species has the highest expression of biodiversity, while the discrepancy between Pollino Massif (223 species) and Aspromonte (205) validates what has already been said regarding the further research needed on the latter. Sila Plateau as well, with just 176 species (181 for Policoro Wood), confirms how little this area has been investigated. Mount Vulture-Monticchio Lakes with 107 species require further in-depth research, while Pantano Lake of Pignola with 161 species corroborate a high biodiversity for the species linked to the meadows.

- Carabidae (475 species): Aspromonte (278 species) is the significantly richest area, while four

sites follow with a number of species ranging between 201 (Sila) and 233 (Gargano); Policoro Wood, despite its small size, with 253 known species far exceeds the remaining sites.

- Curculionidae (750 species): it is perhaps the only case in which Gargano Promontory shows the greatest richness with 382 species and reaffirms the contrast already noted with Aspromonte which counts only 320; Sila Plateau and Central Lucan Apennines stand respectively on 259 and 258 species, while Pantano Lake of Pignola and Mount Vulture-Monticchio Lakes have only 157 and 159 species; the Pollino Massif with 350 species sees its high biodiversity confirmed.

- Staphylinidae (853 species): particularly interesting and enlightening for future research and to understand the current state of the same is the analysis of the presence of this important family, mainly linked to the soil: Aspromonte stands out with 431 species that is 201 more than the nearby Sila Plateau (which would be the last, if not for the much smaller sites of Pantano Lake of Pignola and Mount Vulture-Monticchio Lakes); Gargano Promontory, Central Lucan Apennines and Pollino Massif vary between 368 and 400 species, while Policoro Wood, despite its small surface area, numbers 319 species; it should however be emphasized that the writer's contribution to the knowledge of this family was

much lower than for other families, as 17,000 collected specimens are still unidentified.

On the basis of what has just been explained, it can be concluded that the research on the floricolous and saproxylic beetles of Aspromonte should be further increased, and that the fauna of the soil is still to be investigated more widely and in more detail, mainly in the Sila Plateau and Gargano Promontory. Policoro Wood and the Pollino Massif show a state of knowledge that can be considered acceptable, while Mount Vulture-Monticchio Lakes are further to be studied at a general level.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank my colleagues and friends who, with effective collaboration and generosity, have spent time reviewing the families of their competence, sending papers and sharing valuable data, thus making it possible to accomplish this study and bring it up to date: Paolo Audisio (Università la Sapienza, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, Roma, Italy), Xavier Bellés (Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF), Barcelona, Spain), Cesare Bellò (Castelfranco Veneto, Italy), Alessandro B. Biscaccianti (Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata (LEEA), Dipartimento PAU, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italy), Lech Borowiec (Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Poland), Milan Boukal (Pardubice, Czech Republic), Roberto Caldera (Milano, Italy), Benjamin Calmont (Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny, Aubière, France), Enzo Colonnelli (Roma, Italy), Gianfranco Curletti (Museo Civico di Storia Naturale, Carmagnola, Italy), Mauro Daccordi (Verona, Italy), Luciano Diotti (Cinisello Balsamo, Italy), Michael Eifler (Pinneberg, Germany), Roberto Fabbri (Museo Civico, Sezione Naturalistica, Bagnacavallo, Italy), Gabriele Franzini (Milano, Italy), Carlo Giusto (Recco, Italy), Jiří Hájek (Department of Entomology, National Museum, Praha, Czech Republic), Jiří Háva (Private Entomological Laboratory and Collection, Prague-west, Czech Republic), Francesco Izzillo (Napoli, Italy), Jiří Kolibáč (Moravian Museum, Department of Entomology, Brno, Czech Republic), Ondřej Konvička (Institute

of Entomology, Biology Centre AS CR, České Budějovice, Czech Republic), Robin Kundera (Department of Zoology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic), Leonardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale, Verona, Italy), Piero Leo (Cagliari, Italy), Carlo Leonardi (Museo Civico di Storia Naturale, Milano, Italy), Gianfranco Liberti (Uboldo, Italy), Andrea Liberto (Roma, Italy), Gianluca Magnani (Cesena, Italy), Paolo Magrini (Firenze, Italy), Alessandro Mascagni (Firenze, Italy), Jan Matějček (Hradec Králové, Czech republic), Antonio Mazzei (Università della Calabria, Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Rende, Italy), Josef Mertlik (Opatovice nad Labem, Czech Republic), Heinrich Meybohm (Großhansdorf, Germany), Vittorio Monzini (San Giuliano Milanese, Italy), Gianluca Nardi (Centro Nazionale Biodiversità Carabinieri “Bosco Fontana”, Marmirolo, Italy), José Carlos Otero (Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Santiago de Compostela, Spain), Roberto A. Pantaleoni (Dipartimento di Protezione delle Piante, sezione di Entomologia agraria, Università degli Studi, Sassari, Italy), Guido Pedroni (Parco Regionale del Corno alle Scale, Marzabotto, Italy), Emanuele Piattella (Università la Sapienza, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, Roma, Italy), Giuseppe Platia (Gatteo, Italy), Pavel Průdek (Brno, Czech Republic), Pierpaolo Rapuzzi (Prepotto, Italy), Roberto Rattu (Cagliari, Italy), Johannes Reibnitz (Tamm, Germany), Antonio Rey (Genova, Italy), Saverio Rocchi (Firenze, Italy), Vito Antonio Romano (Potenza, Italy), Wolfgang Rücker (Neuwied, Germany), Rafal Ruta (Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Poland), Jan Růžička (Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Praha, Czech Republic), Enrico Ruzzier (Mirano, Italy), Davide Sassi (Castelmarte, Italy), Mikael Sörenson (Department of Biology, Lund University, Ecology Building, Lund, Sweden), Zdeněk Švec (Praha, Czech Republic), Dmitry Telnov (Natural History Museum, London, United Kingdom), Wioletta Tomaszewska (Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland), Jiří Ch. Vávra (Ostrava Museum, Ostrava, Czech Republic), Pierpaolo Vienna (Lido di Venezia, Italy), Vincenzo Vomero (Roma, Italy), Piotr

Węgrzynowicz (Institute of Forest Sciences, University of Łódź, Branch in Tomaszów, Tomaszów Mazowiecki, Poland), Rafael Yus Ramos (Vélez-Málaga, Málaga, Spain), Petr Zahradník (Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště, Czech Republic), Adriano Zanetti (Verona, Italy), Iuri Zappi (Casalecchio di Reno, Italy), Stefano Ziani (Imola, Italy).

My special gratitude for advice, support in bibliographical research and careful review of chapters during the manuscript realization goes to Luca Bartolozzi (Museo di Zoologia “La Specola” dell’Università di Firenze, Italy), Maura Bocci (Centro Nazionale Biodiversità Carabinieri “Bosco Fontana”, Marmirolo, Italy), Roberto Poggi (Museo Civico di Storia Naturale, Genova, Italy) and Ignazio Sparacio (Palermo, Italy). I’d like to thank my friend Jonathan Cooter (Oxford University, Museum of Natural History, United Kingdom) for linguistic revision of the text.

REFERENCES

- Abbazzi P., Bartolozzi L. & Calamandrei S., 1999. Contributo alla conoscenza degli Anthribidae italiani (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 93: 57–106.
- Abbazzi P. & Maggini L., 2009. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionoidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). *Aldrovandia*, 5: 29–216.
- Abbazzi P. & Magnano L., 2003. Una nuova specie di *Cirrorhynchus* Apfelbeck, 1898 dell’Italia meridionale (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Atti Accademia Roveretana degli Agiati*, ser. VIII, 3B: 73–80.
- Abbazzi P. & Zinetti F., 2013. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionoidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). 2. Addenda e corrigenda. *Memorie della Società entomologica italiana*, 90: 89–104.
- Adorno A. & Zanetti A., 2013. Descrizione di tre nuove specie del genere *Sunius* Curtis, 1829 con note sulle specie italiane e su alcune specie mediterranee occidentali (Coleoptera, Staphylinidae: Paederinae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 27, Botanica Zoologia: 31–44.
- Alekseev V.I., Bukejs A. & Bellés X., 2019. *Dignoptinus*, a new genus for fossil *Dignomus regiomontanus* Alekseev from Eocene Baltic amber, and new status for *Bruchoptinus* Reitter and *Pseudoptinus* Reitter (Coleoptera: Ptinidae). *Fossil Record*, 22: 65–72. <https://doi.org/10.5194/fr-22-65-2019>
- Alekseev V.I., Bukejs A. & Bellés X., 2019. *Dignoptinus*, a new genus for fossil *Dignomus regiomontanus* Alekseev from Eocene Baltic amber, and new status for *Bruchoptinus* Reitter and *Pseudoptinus* Reitter (Coleoptera: Ptinidae). *Fossil Record*, 22: 65–72.
- Aliquò V. & Massa B., 1976. Contributo allo studio di *Anoxia scutellaris* s.l. e descrizione di *Anoxia scutellaris argentea* n. ssp. di Sicilia. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 108: 151–157.
- Alonso-Zarazaga M.A., 2010. *Gompelia*, a replacement name for *Olotelus* Mulsant & Rey, 1866 (Coleoptera, Aderidae). *Graellsia*, 66: 299–301. <https://doi.org/10.3989/graelisia.2010.v66.026>
- Alonso-Zarazaga M.A., 2013. Case 3624. A proposal for the rejection of 38 names in Anthicidae (Coleoptera). *Bulletin of Zoological Nomenclature*, 70: 171–184.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlavá P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J. & Yunakov N.N., 2017. Co-operative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas SEA 8*, Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A., www.sea-entomologia.org, November 2, 2017.
- Angelini F., 1972. Hydroadephaga inediti per Puglia e Lucania. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 104: 179–194.
- Angelini F., 1973a. Hydroadephaga nuovi per Calabria e Sila. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 105: 7–12.
- Angelini F., 1973b. Hydrophilidae inediti per Puglia e Lucania. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 105: 75–79.
- Angelini F., 1973c. Descrizione di una nuova sottospecie dello *Scarodytes halensis* F. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 20 (1972): 51–54.
- Angelini F., 1975. Nuovi reperti di Hydroadephaga. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 107: 56–70.
- Angelini F., 1978. Haliplidae, Dytiscidae e Gyrinidae della Lucania. *Entomologica, Bari*, 14: 63–135.
- Angelini F., 1984. Catalogo topografico dei Coleoptera Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae e Gyrinidae d’Italia. *Memorie della Società entomologica italiana*, 61/A (1982): 45–126.
- Angelini F., 1986. Coleotterofauna del Massiccio del Pollino (Basilicata-Calabria). *Entomologica*, 21: 37–125.
- Angelini F., 1987. Coleotterofauna del Promontorio del Gargano. *Atti del Museo civico Storia naturale Grosseto*, 11–12: 5–84.

- Angelini F., 1988. Gli Anisotomini del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 129: 305–366.
- Angelini F., 1991. Coleotterofauna dell'Altipiano della Sila (Calabria, Italia) (Coleoptera). Memorie della Società entomologica italiana, 70: 171–254.
- Angelini F., 1995. Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere *Agathidium* Panzer (Coleoptera, Leiodidae, Agathidiini). Monografie Museo regionale Scienze naturali di Torino, 18: 1–484.
- Angelini F., 1996. Coleotterofauna della Riserva Naturale WWF Lago di Pignola. Tipografia Alfagrafica Volonnino, Lavello, 135 pp.
- Angelini F., 1998. Coleotterofauna reperita mediante trappola luminosa in due stazioni umide dalla Basilicata (Italia meridionale). Quaderni Stazione Ecologica Museo civico di Storia naturale di Ferrara, 11: 7–37.
- Angelini F., 2005. Insecta Coleoptera Cryptophagidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 215–216 + CD-ROM.
- Angelini F. & De Marzo L., 1985. Descrizione di una nuova specie e di una nuova sottospecie del genere *Agathidium* Panzer. Bollettino della Società entomologica italiana, 117: 172–177.
- Angelini F. & Ferro G., 1974. Hydrophilidae della Sila. Rivista di Idrobiologia, Istituto di Idrobiologia e Piscicoltura G.B. Grassi Università Perugia, 13: 399–416.
- Angelini F. & Montemurro F., 1986. Coleotterofauna del bosco di Policoro (Matera). Biogeographia, Lavori della Società italiana di Biogeografia, 10 (1984): 545–604.
- Angelini F. & Rücker H.W., 1999. Contributo alla conoscenza dei Merophysiidae e Latridiidae dell'Italia meridionale e della Sicilia (Coleoptera). Memorie della Società entomologica italiana, 77 (1998): 213–240.
- Angelini F. & Sörensson M., 1997. Materiali per una coleotterofauna dell'Italia meridionale e della Sicilia. Ptiliidae. (Coleoptera). Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 91: 555–587.
- Assing V., 1996. A revision of the European species of *Calodera* Mannerheim (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). Beiträge zur Entomologie, 46: 3–24. <https://doi.org/10.21248/contrib.entomol.69.1.001-032>
- Assing V., 2002. A taxonomic and phylogenetic revision of *Amarochara* Thomson. I. The species of the Holarctic region (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). Beiträge zur Entomologie, 52: 111–204.
- Assing V., 2006. A revision of Western Palaearctic *Medon*: the species of the Atlantic Islands, the Western Mediterranean, and Europe, except for the south-east (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). Bonner zoologische Beiträge, 54 (2005): 25–95.
- Assing V., 2007. A revision of the species of *Pronomaea* Erichson of the Western Palaearctic region, including Middle Asia (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Pronomaeini). Beiträge zur Entomologie, 57: 367–396.
- Assing V., 2014. On the *Bolitochara* species of the West Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Neue Serie 7: 33–63.
- Assing V., 2019. Revision of the *Baeoglena* species of the West Palaearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Contributions to Entomology, 69: 1–32.
- Assing V. & Wunderle P., 2008. On the *Alevonota* species of the Western Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini). Beiträge zur Entomologie, 58: 145–189.
- Astrin J.J. & Stüben P.E., 2008. Phylogeny in cryptic weevils: molecules, morphology and new genera of western Palaearctic Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). Invertebrate Systematics, 22: 503–522.
- Audisio P., 1973. Primo contributo alla conoscenza dei Silfidi d'Italia. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 28: 55–58.
- Audisio P., 1975. Note su alcune specie italiane del genere *Meligethes* Steph. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 30: 2–16.
- Audisio P., 1976. Note su alcune *Epuraea* italiane. Bollettino della Società entomologica italiana, 108: 95–96.
- Audisio P., 1986. I Kateretidae e i Nitidulidae dell'Italia Meridionale: distribuzione attuale e ipotesi sul popolamento. Biogeographia, Lavori Società italiana di Biogeografia, 10 (1984): 605–627.
- Audisio P., 1993. Fauna d'Italia. XXXII. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Ed. Calderini, Bologna, 971 pp.
- Audisio P., Baviera C., Carpaneto G.M., Biscaccianti A.B., Battistoni A., Teofili C. & Rondinini C., 2014. Lista Rossa IUCN dei Coleotteri saproxilici Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, 132 pp.
- Audisio P., Brustel H., Carpaneto G.M., Coletti G., Mancini E., Piattella E., Trizzino M., Dutto M., Antonini G. & De Biase A., 2007. Updating the taxonomy and distribution of the European *Osmoderma*, and strategies for their conservation (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). Fragmenta entomologica, 39: 273–290.

- Audisio P., Brustel H., Carpaneto G.M., Coletti G., Mancini E., Trizzino M., Antonini G. & De Biase A., 2009. Data on molecular taxonomy and genetic diversification of the European Hermit beetles, a species-complex of endangered insects (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae, *Osmoderma*). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, 47: 88–95. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0469.2008.00475.x>
- Audisio P., Cline A.R., De Biase A., Antonini G., Mancini E., Trizzino M., Costantini L., Strika S., Lamanna F. & Cerretti P., 2009. Preliminary reexamination of genus-level taxonomy of the Pollen Beetle subfamily Meligethinae (Coleoptera: Nitidulidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 49: 341–504.
- Audisio P. & De Biase A., 1995. Materiali per un'analisi biogeografica delle specie italiane dei generi *Hydraena* ed *Haenydra* (Coleoptera Hydraenidae). *Fragmenta entomologica*, 27: 163–189.
- Audisio P. & De Biase A., 1996. Taxonomic revision, phylogeny and biogeography of the beetle genus *Dapsa* Latreille (Coleoptera Endomychidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, 74 (1995): 65–130.
- Audisio P. & De Biase A., 2005a. Insecta Coleoptera Hydraenidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, Sezione Scienze della Vita 16: 169–170 + CD-ROM.
- Audisio P. & De Biase A., 2005b. Insecta Coleoptera Nitidulidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, Sezione Scienze della Vita 16: 207–209 + CD-ROM.
- Audisio P., De Biase A. & Zampetti M.F., 1992. Le specie italiane del genere *Dapsa* Latreille. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 124: 65–74.
- Audisio P., Ferro G. & De Biase A., 2000. Nuovi dati sulla distribuzione in Italia di alcune specie di Hydraenidae (Coleoptera). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 132: 117–121.
- Audisio P., Trizzino M., De Biase A., Rossetti G., Mancini E. & Antonini G., 2010. Molecular and morphological evidence of a new sibling species of *Calobius* (Coleoptera: Hydraenidae) of the *C. quadricollis* complex from peninsular Italy. *Italian Journal of Zoology*, 77: 29–37. <https://doi.org/10.1080/11250000902845738>
- Baiocchi D., 2015. Taxonomic notes on the genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829 (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini) 1. *Zootaxa* 3941 (3): 339–357. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3941.3.2>
- Baiocchi D. & Magnani G., 2018. A revision of the *Anthaxia* (*Anthaxia*) *midas* Kiesenwetter, 1857 species-group (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini). *Zootaxa* 4370 (3): 201–254. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4370.3.1>
- Ballerio A., Krell F.-T., Bezděk A., Frolov A., Huchet J.-B., Keith D., López-Colón J.I., Matthews E., Ocampo F., Rey A. & Vaz-de-Mello F.Z., 2018. Case 3768 - *Hybosorus illigeri* Reiche, 1853 (Insecta, Coleoptera): proposed conservation by giving it precedence over *Hybosorus pinguis* Westwood, 1845, *Hybosorus roei* Westwood, 1845 and *Hybosorus carolinus* LeConte, 1847. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, 75: 152–164. <http://dx.doi.org/10.21805/bzn.v75.a032>
- Ballerio A., Rey A., Uliana A. & Colla A., 2011. Coleoptera Scarabaeoidea nuovi o interessanti per la fauna italiana. *Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo*, 25: 69–74.
- Ballerio A., Rey A., Uliana A., Rastelli M., Rastelli S., Romano M. & Colacurcio L., 2010. Piccole Faune. Coleotteri Scarabaeoidei d'Italia. DVD. M. Serra Tarantola ed., Brescia: 1–13 + dvd.
- Baraud J., 1965. Revision du genre *Homaloptia* Steph. (Col. Scarab.). *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, Milano*, 104: 393–448.
- Baraud J., 1991. Revision des especes du genre *Anisoplia* Fischer, 1824 (Coleoptera Scarabaeoidea Rutelidae) (deuzieme partie). *Beiträge zur Entomologie*, 60: 353–384.
- Bartolozzi L., 1989. Descrizione di una nuova sottospecie di *Aesalus scarabaeoides* (Panzer, 1794) di Basilicata. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 121: 104–107.
- Bartolozzi L. & Maggini L., 2005. Insecta Coleoptera Lucanidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 191–192 + CD-ROM.
- Baudi di Selve F., Piccioli F. & Cavanna G., 1882. Al Vulture ed al Pollino. Parte II. Catalogo degli animali raccolti al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale. Coleoptera. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 14: 63–81.
- Baviera C. & Audisio P., 2014. The Nitidulidae and Kateretidae (Coleoptera: Cucujoidea) of Sicily: recent records and updated checklist. *Atti dell'Accademia peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali*, 92: A1–A32. <http://doi.org/10.1478/AAPP.922A1>
- Baviera C. & Biondi M., 2015. The Alticini (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) of Sicily: recent records and updated checklist. *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali*, 93: 1–50. <http://doi.org/10.1478/AAPP.932A2>

- Bellò C. & Pierotti H., 1992. Nuovi Peritelini della fauna italiana (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta entomologica*, 3: 369–387.
- Bellò C., Osella G.B. & Baviera C., 2019. A taxonomic monograph of the genus *Solariola* Flach, 1908 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 4676 (1): 1–261. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4676.1>
- Bertolini S., 1876. Escursioni entomologiche nella Calabria. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 8: 48–53.
- Bertrand H., 1956. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XX. Coleoptera. 10. Coléoptères aquatiques de Calabre. *Annuario dell’Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 8: 1–8.
- Besuchet C., 1964. Psélaphides paléarctiques. Espèces nouvelles et notes synonymiques. II. Coleoptera. *Revue Suisse de Zoologie*, 71: 411–443.
- Besuchet C., 1976. Contribution à l’étude des Ptiliides paléarctiques (Coleoptera). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 49: 51–71.
- Besuchet C., 1980. Contribution a l’étude des Coleopteres Pselaphides d’Italie et du Tessin. *Revue suisse de Zoologie*, 87: 611–635.
- Bezdek L. & Baselga A., 2015. Revision of western Palearctic species of the *Oulema melanopus* group, with description of two new species from Europe (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 55: 273–304.
- Binaghi G., 1934. Appunti sugli Elateridi italiani. I. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 66: 150–153.
- Binaghi G., 1939. I Melanotini della fauna italiana. *Spheniscosomus* Schw. e *Melanotus* Eschs. *Memorie della Società entomologica italiana*, 17: 205–239.
- Binaghi G., 1948. Note di caccia (III). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 78: 77–79.
- Binaghi G., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XII. Coleoptera. 2. Elateridae, Melasidae, Throscidae e Dascillidae. *Annuario dell’Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 7: 1–19.
- Binaghi G., 1958. Materiali per lo studio delle *Hydraena* italiane (1° contributo). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 88: 70–83.
- Binaghi G., 1970. Revisione degli *Scotonomus*. Analisi di un genere paleotirrenico. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 102: 118–137.
- Binaghi G., 1974. Contributi alla geonemia della coleottero-fauna italiana. II. *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 80: 119–129.
- Binaghi G., 1978. Revisione degli *Stenolophus* del gruppo *teutonius* (Schrank) (Coleoptera Carabidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, 56 (1977): 21–34.
- Binaghi G., Dellacasa G. & Poggi R., 1969. Nuovi caratteri diagnostici per la determinazione degli *Onthopagus* del gruppo *ovatus* (L.) e geonemia controllata delle specie italiane del gruppo. *Memorie della Società entomologica italiana*, 48 B: 29–46.
- Biondi M., 1982. Le specie appenniniche del genere *Crepidodera* Chevrolat sensu Foudras. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 8: 45–66.
- Biondi M., 1983. Contributo alla conoscenza delle Alticinae della fauna italiana. *Fragmenta entomologica*, 17: 151–158.
- Biondi M., 1989. Note faunistiche su alcune specie di Chrysomelidae Alticinae della fauna italiana. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 121: 98–103.
- Biondi M., 1990. Elenco commentato dei Crisomelidi Alticini della fauna italiana. *Fragmenta entomologica*, 22: 109–183.
- Biondi M., 1995. Descrizione di una nuova specie di *Cryptocephalus* del sottogenere *Burlinius* Lopatin dell’Italia Meridionale (Coleoptera Chrysomelidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 127: 39–44.
- Biondi M., 2005. Insecta Coleoptera Chrysomelidae Alticinae In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 227–229 + CD-ROM.
- Biscaccianti A.B., 2002. Nuovi dati geonemici su alcuni Cerambicidi italiani (Coleoptera, Cerambycidae). *Bollettino dell’Associazione romana di Entomologia*, 57: 49–62.
- Biscaccianti A.B., 2003. Dati faunistici e biologici inediti e rettifiche sulla geonemia di alcuni Longicorni della fauna italiana (Coleoptera, Cerambycidae). *Bollettino dell’Associazione romana di entomologia*, 58: 77–86.
- Biscaccianti A.B., 2005. Osservazioni su alcuni longicorni della fauna italiana (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). *Aldrovandia*, 1: 71–80.
- Biscaccianti A.B., Manti F., Castiglione E., Bonacci T., Siclari A., Pelle L. & Bonsignore C.P., 2016. Coleotteri saproxilici e specie in Direttiva Habitat del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 11° Convegno Nazionale sulla Biodiversità, Matera 9 e 10 Giugno 2016, Sessione II, Biodiversità degli habitat naturali: 150.
- Bocek M., Fancello L., Motyka M., Bocakova M. & Bocak L., 2017. The molecular phylogeny of Omalidae (Coleoptera) defines the family limits and demonstrates low dispersal propensity and ancient vicariance patterns. *Systematic Entomology*, 42: 1–12. <http://doi:10.1111/syen.12271>
- Bologna M.A., 1975. Problemi sistematici e zoogeografici di alcune specie di Meloidae italiani. *Bollettino dell’Associazione romana di entomologia*, 30: 36–45.

- Bologna M.A., 1976. Reperti di Oedemeridae dell'Italia centromeridionale e insulare. Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia, 31: 29–32.
- Bologna M.A., 1988. Note su *Eurymeloe* e revisione delle specie euromediterranee del gruppo *rugosus* (Coleoptera, Meloidae). Fragmenta entomologica, 20: 233–301.
- Bologna M.A., 1991. Fauna d'Italia. XXVIII. Coleoptera Meloidae. Ed. Calderini, Bologna, 541 pp.
- Bologna M.A., 2005. *Zonitis fernancastroi*, a new Species for the Italian Fauna, and additional Records of Meloidae and Oedemeridae (Coleoptera). Bollettino della Società entomologica italiana, 137: 107–114.
- Bologna M.A., 2016. Range extension of Two Oedemeridae species in the Italian peninsula and other faunistic new records. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 71 (2015): 21–25.
- Bocakova, M., Constantin, R. & Bocak, L., 2011. Molecular phylogenetics of the melyrid lineage (Coleoptera: Cleroidea). Cladistics, 27: 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2011.00368.x>
- Bonacci T., Mazzei A., Horak J. & Brandmayr P., 2012. *Cucujus tulliae* sp. n. an endemic Mediterranean saproxylic beetle from genus *Cucujus* Fabricius, 1775 (Coleoptera, Cucujidae), and keys for identification of adults and larvae native to Europe. ZooKeys 212: 63–79. <https://doi.org/10.3897/zookeys.212.3254>
- Bonavita P. & Vigna Tagliati A., 1993. Note sulle specie di *Ocydromus* (*Bembidionetolizkya*) del gruppo *fasciolatus* (Coleoptera Carabidae). Fragmenta entomologica, 25: 67–90.
- Bonavita P. & Vigna Taglianti A., 2010. *Ocydromus* subg. *Nepha* Motschulsky, 1864: revisione tassonomica, filogenesi e biogeografia (Coleoptera Carabidae). Memorie della Società entomologica italiana, 89: 7–180.
- Bongiovanni G.C., 1966. La geonemia italiana dei Cleoni della Bietola da zucchero. Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Università di Bologna, 28: 1–12.
- Bonsignore C.P., 2012. *Apate monachus* (Fabricius, 1775), a Bostrichid Pest of Pomegranate and Carob Trees in Nurseries. Short Communication. Plant Protection Science, 48: 94–97.
- Bordoni A., 1972. Revisione degli *Xantholinus* della fauna italiana. Redia, 53: 151–237.
- Bordoni A., 1973. Gli *Astenus knizi* Bernh. e le forme italiane del sottogenere *Eurysunius* Reitt. XXV Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Staphylinidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 105: 155–161.
- Bordoni A., 1974. Studi sulla sistematica e la geonemia del genere *Quedius* Steph. III. Le specie italiane appartenenti al sottogenere *Microsaurus* (Steph.) sensu Gridelli, 1924. Redia, 55: 1–82.
- Bordoni A., 1975. *Neobisnius cerrutii* Gridelli, 1943 è sinonimo di *latrobioides* (Baudi, 1848). Bollettino del Museo di Zoologia Università di Torino, 2: 81–84.
- Bordoni A., 1976. Studi sulla sistematica e la geonemia del genere *Quedius* Steph. IV. I *Quedius* s. str. della fauna italiana. Redia, Firenze, 59: 85–107.
- Bordoni A., 1982. Fauna d'Italia. XIX. Coleoptera Staphylinidae: Generalità-Xantholoninae. Ed. Calderini, Bologna, 434 pp.
- Bordoni A., 1983. Una nuova *Choleva* della Calabria (Coleoptera, Catopidae). Fragmenta entomologica, 17: 101–104.
- Bordoni A. & Castellini G., 1973. Sulle specie paleartiche del genere *Mastigus* Latreille con osservazioni su due specie dell'Africa Australe (Coleoptera Scydmaenidae). Redia, 54: 295–323.
- Borovec R. & Osella G.B., 1993. *Trachyphloeus amicalis* n. sp. della regione appenninica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 125: 179–185.
- Bouchard P., Bousquet Y., Davies A.E., Alonso-Zarazaga M.A., Lawrence J.F., Lyal C.H.C., Newton A.F., Reid C.A.M., Schmitt M., Ślipiński S.A., Smith A.B.T., 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). ZooKeys, 88: 1–972. <https://doi.org/10.3897/zookeys.88.807>
- Bousquet Y., 2016. Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes. ZooKeys, 583: 1–776. <https://doi.org/10.3897/zookeys.583.7084>
- Bowstead S., 1999. A revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palearctic Region. Muséum d'Histoire Naturelle, Genève, Instrumenta Biodiversitatis, 3: 1–203.
- Brancucci M., 1979. Contribution a l'étude des Malthinini d'Italie. III. *Malthodes cordiger* Kiesw. et quelques especes voisines (Coleoptera Cantharidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 111: 70–75.
- Brandmayr P., Cagnin M., Mingozi T. & Pizzolotto R., 1996. Map of zoocoenoses and evaluation for the Menta River Dam in Aspromonte (Calabria, Italy), Zeitschrift zur Ökologie und Naturschutz, 5: 15–28.
- Brandmayr P. & Zetto Brandmayr T., 1986. Le comunità a Coleotteri geoadefagi di alcune faggete ed abetine appenniniche, dal Casentino al M. Pollino. Biogeographia, Lavori Società italiana di Biogeografia, Bologna, 10 (1984): 685–700.
- Bruce N., 1936. Monographie der europäischen Arten der Gattung *Cryptophagus* Herbst. Acta Zoologica Fennica, 20: 1–167.
- Bruno S., 1966. Sul *Callicnemis latreillei* Lap. in Italia (Col. Scarabaeidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 21: 43–45.

- Bucciarelli I., 1959. Coleotteri Anthicidi dell'Aspromonte (Appennino Calabrese). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 7: 183–189.
- Bucciarelli I., 1961. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956–1957–1958. VIII. Coleoptera Anthicidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 91: 102–131.
- Bucciarelli I., 1973. Note sui “*Notoxus*” mediterranei. Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste, 28: 471–484.
- Bucciarelli I., 1978. Anticidi nuovi, nuovi per l'Italia e sinonimie. Bollettino della Società entomologica italiana, 110: 154–163.
- Bucciarelli I., 1980. Coleoptera. Anthicidae. Fauna d'Italia, XVII. Ed. Calderini, Bologna, 240 pp.
- Burlini M., 1939. Primo contributo alla maggiore conoscenza della distribuzione geografica dei Coleotteri in Italia. Bollettino della Società entomologica italiana, 71: 181–186.
- Burlini M., 1942. Nuove forme di coleotteri italiani. Bollettino della Società entomologica italiana, 74: 126–128.
- Burlini M., 1955a. Revisione dei *Cryptocephalus* italiani e della maggior parte delle specie di Europa. Memorie della Società entomologica italiana, 34: 1–287.
- Burlini M., 1955b. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIX. Coleoptera. 9. Due nuovi *Pachybrachys* italiani (Chrysomelidae). Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 8: 1–7.
- Burlini M., 1968. Revisione delle specie italiane e della maggior parte delle specie europee del genere *Pachybrachis* Chev. (XXII contributo alla conoscenza dei Cryptocephalini). Memorie della Società entomologica italiana, 47: 11–116.
- Caldara R., 1971. Note geonemiche su alcuni Curculionidi italiani. Bollettino della Società entomologica italiana, 103: 212–214.
- Caldara R., 1975. Considerazioni su alcune specie del gruppo *Tychius pusillus* Germar (VII Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 107: 31–40.
- Caldara R., 1977. Revisione dei *Pachytychius* paleartici (Col. Curculionidae). Memorie della Società entomologica italiana, 56: 131–216.
- Caldara R., 1978. I generi *Apeltarius* Desbrochers, *Xenotychius* Reitter e *Pseudolignydes* Pic. Bollettino della Società entomologica italiana, 110: 23–34.
- Caldara R., 1985. Revisione delle *Sibinia* paleartiche (Col. Curculionidae). Memorie della Società entomologica italiana, 62/63 (1983/84): 24–105.
- Caldara R., 1990. Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere *Tychius* Germar (Coleoptera Curculionidae). Memorie della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 25: 53–238.
- Caldara R., 2008. Revisione delle specie paleartiche del genere *Gymnetron* (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). Aldrovandia, 4: 27–103.
- Caldara R., 2014. *Rhinusa* Stephens: a taxonomic revision of the species belonging to the *R. tetra* and *R. bipustulata* groups (Coleoptera Curculionidae). Journal of Insect Biodiversity, 2: 1–46. <http://dx.doi.org/10.12976/jib/2014.2.19>
- Caldara R. & Angelini F., 1997. Su alcuni Curculionoidea nuovi per l'Italia o per varie regioni italiane (Coleoptera). Bollettino della Società entomologica italiana, 129: 241–249.
- Caldara R. & Fogato V., 2013. Systematics of the weevil genus *Mecinus* Germar, 1821 (Coleoptera: Curculionidae). I. Taxonomic treatment of the species. Zootaxa 3654: 1–105.
- Caldara R. & O'Brien C.W., 1998. Systematics and evolution of Weevils of the genus *Bagous*. VI. Taxonomical treatment of the species of the Western Palearctic Region (Coleoptera Curculionidae). Memorie della Società entomologica italiana, 76 (1997): 131–347.
- Canepari C., 1961. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. VII. Coleoptera Coccinellidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 91: 154–158.
- Canepari C., 1983. Le specie italiane del gruppo dello *Scymnus frontalis* Fab. con descrizione di due nuove specie. Giornale Italiano di Entomologia, 1: 179-204.
- Canepari C., 2000. The *Nephus* subgenus *Sidis* in Italy (Coleoptera Coccinellidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 132: 49–62.
- Canepari C., 2009. New data on some Coccinellidae (Coleoptera) from the Mediterranean Region. Zootaxa 2318: 394–399.
- Canepari C., Fursch H. & Kreissl E., 1985. Die *Hyperaspis*-Arten von Mittel-West- und Sudeuropa. Systematik und Verbreitung. Giornale Italiano di Entomologia, 2: 223–252.
- Canzoneri S., 1968. Materiali per una monografia delle *Phaleria* del sottogenere *Phaleria* Latr. Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 47: 117–167.
- Canzoneri S., 1977. Contributo alla conoscenza dei Tenebrionidi Appenninici. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 227–285.
- Canzoneri S., 1981. Su alcuni interessanti coleotteri Tenebrionidi dell'Italia meridionale. Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, Venezia, 6: 85-86.
- Carpaneto G.M., 1974a. Endemismi italiani. 15. *Aphodius (Acrossus) siculus* Harold. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 29: VI.

- Carpaneto G.M., 1974b. Note sulla distribuzione geografica ed ecologica dei Coleotteri Scarabaeoidea Laparosticti nell'Italia appenninica. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 29: 32–54.
- Carpaneto G.M., Baviera C., Biscaccianti A.B., Brandmayr P., Mazzei A., Mason F., Battistoni A., Teofili C., Rondinini C., Fattorini S. & Audisio P. (Eds.), 2015. A Red List of Italian Saproxylic Beetles: taxonomic overview, ecological features and conservation issues (Coleoptera). *Fragmenta entomologica*, 47: 53–126.
- Carpaneto G.M., Chiari S., Audisio P., Leo P., Liberto A., Jansson N. & Zauli A., 2012. Biological and distributional overview of the genus *Eledonoprius* (Coleoptera: Tenebrionidae): Rare fungus-feeding beetles of European old-growth forests. *European Journal of Entomology*, 110: 173–176. <http://www.eje.cz/pdfs/110/1/173>
- Carpaneto G.M., Piattella E. & Valerio L., 2005. Insecta Coleoptera Scarabaeoidea. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 193–197 + CD-ROM.
- Casale A. & Giachino P.M., 1985. Un nuovo *Pterostichus* dell'Appennino Lucano (Coleoptera, Carabidae). *Bollettino del Museo Regionale di Scienze naturali di Torino*, 3: 427–436.
- Casale A., Sturani M. & Vigna Taglianti A., 1982. Fauna d'Italia. XVIII. Coleoptera Carabidae. I. Introduzione, Paussinae, Carabinae. Ed. Calderini, Bologna, 499 pp.
- Casale A., Vigna Taglianti A., Brandmayr P. & Colombetta G., 2005. Insecta Coleoptera Carabidae (Carabini, Cychrini, Trechini, Abacetini, Stomini, Pterostichini. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 159–163 + CD-ROM.
- Cassola F., 1974. Studi sui Cicindelidi. XI. Validità specifica di *Cicindela majalis* Mandl. e problemi di conservazione degli ambienti golenali italiani (Coleoptera). *Lavori della Società italiana di Biogeografia*, 4 (1973): 57–75 + 3 tav.
- Cassola F., 2012. Studi sui Cicindelidi. CLXXXVI. Le cicindele di Policoro (Coleoptera, Cicindelidae). *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 67: 37–42.
- Castellini G., 1987. *Scydmorephes* italiani nuovi o poco noti. *Atti del Museo civico Storia naturale Grosseto*, 11/12: 119–129.
- Castellini G., 1994. Revisione del genere *Leptomastax* Pirazzoli, 1855. *Atti del Museo civico Storia naturale Grosseto*, Suppl. al n.15, 137 pp.
- Castellini G., 2006. Pensieri sulla tassonomia e note su alcuni Scydmaenidae paleartici (Coleoptera). *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 98: 1–121.
- Cavanna G., 1882. Al Vulture ed al Pollino. Parte I. Narrazione della escursione fatta al Vulture ed al Pollino nel luglio del 1880 da A. Biondi, C. Caroti e G. Cavanna. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 14: 3–29.
- Ceccolini F., Terzani F. & Paggetti R., 2013. Contributo alla corologia dei Lici di italiani. (Coleoptera: Lycidae). *Onychium*, 10: 119–126.
- Cecconi G., 1908. Contributo alla fauna delle Isole Treme. *Bollettino del Museo di Zoologia, Anatomia comparata, Università di Torino*, 23 (583): 1–53.
- Chiesa A., 1959. Hydrophilidae Europae. Coleoptera Palpicornia. Tabelle di determinazione. Arnaldo Forni Editore, Bologna, 200 pp.
- Ciceroni A., 1990. Una nuova specie di *Atrechus* dell'Italia meridionale (Coleoptera, Staphylinidae). *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 44 (1989): 55–59.
- Ciceroni A., 1994. Revisione delle specie italiane del genere *Leptacinus* Erichson con note sinonimiche su alcuni Xantholinini europei e nordafricani (Coleoptera, Staphylinidae: Xantholininae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 18 (1991): 97–119.
- Cline A.R., Smith T.R., Miller K., Moulton M., Whiting M. & Audisio P., 2014. Higher phylogenetics of Nitidulidae: assessment of subfamilial and tribal classifications, and formalization of the family Cybocephalidae (Coleoptera: Cucujoidea). *Systematic Entomology*, 39: 758–772. <http://doi:10.1111/syen.12084>
- Colonnelli E., 1972. Una nuova specie di *Acalles* Schönherr del Massiccio del Pollino, *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 27: 25–30.
- Colonnelli E., 1974a. Gli Attelebidi ed i Curculionidi del Massiccio del Pollino (Coleoptera). *Fragmenta entomologica*, Roma, 10 (2): 107–218.
- Colonnelli E., 1974b. Osservazioni sulla distribuzione e sulla sistematica di alcune specie di Curculionidi. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 29 (3–4): 33–63.
- Colonnelli E., 1976. Note su alcuni Ceutorhynchinae italiani. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 31: 51–54.
- Colonnelli E., 1978. Una nuova specie di *Paroxyonyx* Hustache dell'Italia meridionale. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 33: 80–87.
- Colonnelli E., 1980. Revisione del Genere *Acallocrates* Reitter. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 121: 3–16.

- Colonnelli E., 1991. Note sui Curculionidi della Riserva Naturale “Bosco Pantano” (Basilicata) e descrizione di un nuovo *Bothynoderes* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell’Associazione romana di entomologia, 45 (1990): 89–113.
- Colonnelli E., 2003. A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). Zootaxa 337: 1–142. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.337.1>
- Colonnelli E., 2011. Two new Italian *Ceutorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta entomologica, 43: 179–186.
- Contarini E., Garagnani P. & Zanetti A., 1985. La Coleottero fauna delle “Valli di Comacchio” (Ferrara) (2° contributo: Staphylinidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 10: 121–140.
- Costa A., 1863. Nuovi studi sulla Entomologia della Calabria ulteriore. Atti Reale Accademia Scienze fisica e matematica, Napoli, 1: 1–80.
- Costa A., 1881. Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nella state del 1876. Atti Reale Accademia Scienze fisica e matematica, Napoli, 9 (4): 1–62.
- Costa O.G., 1839. Fauna di Aspromonte e sue adiacenze. Letta nella tornata de’ 12 Febrajo 1828. Atti Reale Accademia Scienze Napoli, 4: 61–173.
- Crovato P. & Izzillo F., 1995. Nuovi reperti di Buprestidi dell’Italia centro-meridionale (Coleoptera, Buprestidae). Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 49 (3-4) (1994): 155–160.
- Curletti G., 1990. Nuovi Buprestidi mediterranei. Bollettino della Società entomologica italiana, 122: 102–106.
- Curletti G., 1994. I Buprestidi d’Italia. Catalogo Tassonomico, Sinonimico, Biologico, Geonemico. Monografie Natura bresciana, 19: 1–318.
- Curletti G., 2005. Insecta Coleoptera Buprestidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 205–206 + CD-ROM.
- Curletti G., 2013. Considerazioni su alcune specie di *Agrilus* Curtis, 1825 presenti in Italia e su alcuni sottogeneri proposti di recente (Coleoptera, Buprestidae). Fragmenta entomologica, 45: 71–82.
- D’Alessandro P. & Biondi M., 2007. Analisi zoogeografica della crisomelidofauna appenninica legata ai piani altitudinali montano, subalpino e alpino (Coleoptera, Chrysomelidae). Biogeographia, Lavori della Società italiana di Biogeografia, 28: 461–494.
- Daccordi M., Lavarini N. & Ruffo S., 1991. Considerazione faunistiche e biogeografiche sulle *Gonioctena* italiane (Coleoptera, Chrysomelidae). Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA): 93–101.
- Daccordi M. & Ruffo S., 1976. Le specie appenniniche del genere *Oreina* (Coleoptera, Chrysomelidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 3: 379–411.
- Daccordi M. & Ruffo S., 1979. Le *Chrysolina* italiane del sottogere *Threnosoma* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 6: 305–332.
- Daccordi M. & Ruffo S., 1988. Considerazioni sistematiche e biogeografiche sulle *Timarcha* italiane. Atti XV Congresso nazionale italiano Entomologia, L’Aquila: 343–351.
- Daccordi M. & Ruffo S., 2005. Considerazioni biogeografiche sulle *Chrysolina* delle province appenninica e sicula con descrizione di *Chrysolina* (*Stichoptera*) *bourdonnei* n. sp. (Coleoptera, Chrysomelidae). Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica, 81 (2004): 113–127.
- Dahlgren G., 1964. Kafer aus Kalabrien. Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste, 24: 133–137.
- Danilevsky M.L., 2019. Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea. On-line version Updated: 09.04.2019 (<http://www.cerambycidae.net/catalog.pdf>).
- De Marzo L., 1995. Appunti sulla presenza di *Cybocephalus rufifrons* Reitt. in suditalia (Coleoptera: Cybocephalidae). Entomologica, 29: 135–147.
- Degiovanni A., 1999. Coleotteri Anticidi del Museo civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo (Insecta Coleoptera Anthicidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 11, suppl.: 33–40.
- Degiovanni A. & Fancello L., 1987. Nuovi dati geonemici su alcuni Anthicidae italiani. Acta Coleopterologica, 3: 41–44.
- Degiovanni A. & Pezzi G., 2007. *Anthicus catalanus* Bonadonna, 1953 nuovo per l’Italia e reperti di altre specie (Insecta, Coleoptera Anthicidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 24: 69–77.
- Dellacasa G., 1983. Sistematica e nomenclatura degli Aphodiini italiani. Museo Regionale Scienze naturali Torino, Monografie, I: 463 pp.
- Dellacasa G. & Dellacasa M., 2006. Fauna d’Italia XLI. Coleoptera Aphodiidae, Aphodiinae. Ed. Calderini, Bologna, I–XII + 484 pp.
- Diotti L., 2008. *Otiorhynchus* (*Nehrodistus*) *pesarinii*, nuova specie del Massiccio del Monte Sirino, S Italia (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 149: 3–8.
- Diotti L., Pesarini C. & Caldara R., 2015. Revisione sistematica del genere *Cotaster* Motschulsky: nuove sinonimie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Giornale italiano di Entomologia, 14: 223–240.

- Dodero A., 1919a. Appunti Coleotterologici. IV. Bollettino della Società entomologica italiana, 54: 67–76.
- Dodero A., 1919b. Materiali per lo studio dei Coleotteri italiani con descrizioni di nuove specie. IV. Fam. Psephenidae. Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova, ser. 3, 8 (48): 172–250.
- Eberle J., Bazzato E., Fabrizi S., Rossini M., Colomba M., Cillo D., Uliana M., Sparacio I., Sabatinelli G., Warnock R.C.M., Carpaneto G. & Ahrens D., 2018. Sex-Biased Dispersal Obscures Species Boundaries in Integrative Species Delimitation Approaches. *Systematic Biology*, 68: 441–459. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syy072>
- Easton A.M., 1960. On the identity of *Meligetes moestus* Erichson and *M. moestus* Auctt. (Col. Nitidulidae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 8: 335–343.
- Endrödy-Younga S., 1960. Monographie der Paläarktischen Arten der Gattung *Clambus*. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 6: 257–303.
- Endrödy-Younga S., 1961. Revision der Gattung *Calypotomerus* Redtb. (Coleoptera: Clambidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 7: 401–412.
- Esser J., 2016a. Revision der Gattung *Typhaeola* Ganglbauer, 1899 (Coleoptera: Mycetophagidae) - 1. Teil: Paläarktische Arten. *Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld*, 126: 169–175.
- Esser J., 2016b. Über die Identität von *Cryptophilus integer* (HEER, 1841) (Coleoptera: Erotylidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 60: 213–218.
- Esser J., 2017. Revision der Gattung *Pteryngium* Reitter, 1888 (Coleoptera, Cryptophagidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 61: 103–105.
- Evers M.A., 1965. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XI. Coleoptera Malachidae. *Bollettino della Società entomologica italiana, Genova*, 95: 135–136.
- Fabrizi R. & Allemand R., 1997. Nuovi dati corologici su *Byrrhus* (*Byrrhus*) *numidicus* Normand, 1935 (Insecta, Coleoptera, Byrrhidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 8: 49–54.
- Faggioli D., 1955. Campagna di ricerche dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Bologna nella “Foresta Umbra” (Gargano). II. Elenco delle specie raccolte (primo lotto). *Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Università di Bologna*, 21: 167–177.
- Fanti F., 2014. Catalogo critico delle Cantharidae d'Italia (Insecta, Coleoptera). *Memorie della Società entomologica italiana*, 91: 61–132.
- Fanti F. & Vitali F., 2013. *Lygistopterus anorachilus* Ragusa, 1883 (Coleoptera, Lycidae), morphological and faunistic remarks. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 154: 71–75.
- Fattorini S., 2001. Nuovi dati regionali e altre note di distribuzione su Tenebrionidi italiani (Coleoptera Tenebrionidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 133: 43–53.
- Ferrer J., 2015. Revisión del género *Leptoderis* Billberg, 1820 y comentarios sobre el origen, composición, anatomía y necrofilia de la Tribu Elenophorini (Coleoptera, Tenebrionidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 57: 19–38.
- Ferrer J., 2018. Contribución al conocimiento del Género *Pachychila* Eschscholtz, 1831 y descripción de dos especies nuevas de la Península Ibérica y una de Italia (Coleoptera, Tenebrionidae, Pimeliinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 62: 35–54.
- Ferrer J., Martínez Fernández J.C. & Castro Tovar A., 2008. Aportación al conocimiento del género *Akis* Herbst, 1799 (Coleoptera; Tenebrionidae, Pimeliinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 43: 153–172.
- Ferro G., 1971. Su alcuni reperti inediti di Idrofilidi nelle regioni meridionali italiane (Coleoptera). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 103: 150–152.
- Ferro G., 1974. Reperti inediti di Idrofilidi nelle regioni meridionali italiane. II contributo. *Bollettino della Società entomologica italiana, Genova*, 106: 22–23.
- Ferro G., 1976. Diagnosi preliminare di una nuova specie di Hydrobiini. *Rivista di Idrobiologia Istituto Idrobiologico Pesc. G.B. Grassi Università di Perugia*, 15: 433–435.
- Ferro G., 1979. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956–1957–1958. XVIII. Coleoptera Palpicornia. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 111: 25–33.
- Ferro G., 1990. Due nuovi *Ochthebius* (*Hymenodes*) Palearctici (Coleoptera Hydraenidae). XXIII. Contributo alla conoscenza degli Hydraenidae. *Bulletin et Annales de la Societe Royale Belge d'Entomologie*, 126: 51–54.
- Fery H., 1991. Revision der “*minutissimus*-Gruppe” der Gattung *Bidessus* Sharp (Coleoptera: Dytiscidae). *Entomologica Basiliensia*, 14: 57–91.
- Fery H. & Nilsson A.N., 1993. A revision of the *Agabus chalconatus*- and *erichsoni*-groups (Coleoptera: Dytiscidae), with a proposed phylogeny. *Entomologica Scandinavica*, 24: 79–108.
- Fiori A., 1894. Alcune nuove specie e varietà di Staphylinidae. *Il Naturalista siciliano*, 4: 86–100.
- Fiori A., 1903. Note di Corologia e di Caccia. Nuove indicazioni topografiche. *Rivista Coleotterologica italiana*, 1: 198–205.
- Fiori A., 1904. Note di Corologia e di Caccia. Nuove indicazioni topografiche. *Rivista Coleotterologica italiana*, 2: 131–136.

- Fiori A., 1914a. Le *Cantharis* di Sicilia confrontate con quelle di altri paesi. Rivista Coleotterologica italiana, 12: 1–18.
- Fiori A., 1914b. Descrizione di alcune specie di Coleotteri mirmecofili del Gargano, Sicilia e Cirenaica. Rivista Coleotterologica italiana, 12: 105–120.
- Fiori A., 1915a. Appunti sulla fauna coleotterologica dell'Italia Meridionale e della Sicilia. Rivista Coleotterologica italiana, 12 (1914): 166–191.
- Fiori A., 1915b. Nuove specie italiane dei generi *Malthinus* e *Malthodes*. Rivista Coleotterologica italiana, 13: 45–56.
- Fiori A., 1915c. Appunti sulla fauna coleotterologica dell'Italia Meridionale e della Sicilia. Rivista Coleotterologica italiana, 13: 57–84.
- Fiori G., 1948. I *Byrrhus* L. s. str. italiani. Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Università di Bologna, 17: 1–21.
- Fiori G., 1951. Alcuni appunti sui *Byrrhus* L. s. str. Europei. II contributo alla conoscenza della famiglia Byrrhidae. Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Università di Bologna, 18: 293–304.
- Fiori G., 1953. I *Seminolus* Muls. et Rey. III contributo alla conoscenza della famiglia Byrrhidae. Redia, 38: 85–110.
- Flach K., 1907. Beiträge zur Käferfauna Kalabriens. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 52: 15–17.
- Focarile A., 1949. I Contributo alla conoscenza dei Trechini paleartici (Coleoptera: Carabidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 79: 71–79.
- Focarile A., 1959. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico di Puglia, Lucania e Calabria. Campagna 1956-1957-1958. I. Notizie introduttive, Coleoptera Carabidae. Memorie della Società entomologica italiana, 38: 17–109.
- Focarile A., 1960a. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. III. Coleoptera Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae. Memorie della Società entomologica italiana, 39: 41–114.
- Focarile A., 1960b. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. V. Coleoptera Helodidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 90: 112–113.
- Focarile A., 1961. Revisione dei coleotteri Helodidae conservati nel Museo Civico di Storia naturale di Milano. I. Genere *Cyphon* Payk. Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 100: 257–268.
- Focarile A., 1964. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. X. Coleoptera Staphylinidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 94: 49–70.
- Fogato W., 1978. Note sui *Luperus* bicolori italiani e descrizione di *L. leonardii* n. sp. Memorie della Società entomologica italiana, 57: 46–64.
- Francia F., 1986. I *Polydrosus* del sottogenere *Thomso-neonymus* Desbrochers. Memorie della Società entomologica italiana, 64 (1985): 53–72.
- Franciscolo M.E., 1956. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVIII. Coleoptera. 8. Mordellidae, Scaptiidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 8: 1–7.
- Franciscolo M.E., 1961. Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae dei Monti Picentini e dell'Aspromonte. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 9: 155–172.
- Franciscolo M.E., 1964. Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae della Sila e dei Monti Siculi. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12: 173–220.
- Franciscolo M.E., 1997. Fauna d'Italia. XXXV. Coleoptera Lucanidae. Ed. Calderini, Bologna, XI+228 pp.
- Franzini G., 2019. Contribution to the knowledge of the genus *Clanoptilus* Motschulsky, 1854 in Italy (Coleoptera: Cleroidea, Malachiidae). Fragmenta entomologica, 51: 201–216.
- Gardini G., 1979. Nuovi dati sui Tenebrionidi dell'Arcipelago Toscano. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 6: 73–77.
- Gardini G., 2005. Insecta Coleoptera Tenebrionidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 217–218 + CD-ROM.
- Gardini G., 2010. *Boromorphus italicus* n. sp. dell'Italia meridionale (Coleoptera, Tenebrionidae). Doriana, supp. Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 8 (368): 1–7.
- Gentile E. & Chiesa A., 1975. Revisione dei *Laccobius* Palearctici (Col. Hydrophilidae). Memorie della Società entomologica italiana, 54: 5–187.
- Gerecke R., 1990. Ein Beitrag zur Kenntnis der Dryopidae und Elmidae in Fließgewässern und Quellen Suditaliens. Lauterbornia, 5: 27–41.
- Gerini F., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XV. Coleoptera. 5. Buprestidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 7: 1–7.
- Gimmel M.L., Bocakova M., Gunter N.L. & Leschen R.A.B., 2019. Comprehensive phylogeny of the Cleroidea (Coleoptera: Cucujiformia). Systematic Entomology, 44: 1–32. <http://doi:10.1111/syen.12338>
- Gimmel M.L., Leschen R.A.B. & Esser J., 2019. Revised type species designations for *Cryptophylus* Reitter, 1874 and *Pteryngium* Reitter, 1887 (Coleoptera: Cu-

- cujoidea: Erotylidae, Cryptophagidae). The Coleopterists Bulletin, 73: 528–530. <http://doi.org/10.1649/0010-065X-73.3.528>
- Giusto C., 1987. Note su *Apion* (*Synapion*) *perrauderi* Desbrochers, 1884 ed *Apion* (*Synapion*) *falzonii* Schatzmayr, 1922. Bollettino della Società entomologica italiana, 119: 45–50.
- Giusto C., 1993. *Aspidapion* (*s. str.*) *caprai* n. sp. dell'Italia centro-meridionale (Coleoptera: Apionidae: Apioninae). Memorie della Società entomologica italiana, 71 (1992): 551–558.
- Giusto C., 1997. Revisione del genere *Oryxolaemus* Alonso-Zarazaga, 1990. (Coleoptera: Apionidae: Apionine). Bollettino del Museo Regionale di Scienze naturali di Torino, 15: 313–353.
- Gobbi G., 1970. Contributo alla conoscenza dei coleotteri Buprestidi d'Italia. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 25: 35–45.
- Gobbi G., 1971a. Ricerche entomologiche dell'A.R.D.E sull'Appennino Lucano e sul Massiccio del Pollino. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 26: 27–29.
- Gobbi G., 1971b. I Buprestidi dell'appennino lucano. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 26: 33–64.
- Gobbi G., 1973a. Interessanti reperti coleotterologici sull'appennino lucano. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 28: 33–41.
- Gobbi G., 1973b. Aggiunte inedite di Paolo Luigioni al catalogo "I Coleotteri d'Italia". Bollettino della Società entomologica italiana, 105: 29–35.
- Gobbi G., 1974. Note geonemiche ed ecologiche su alcuni Buprestidi italiani. Bollettino della Società entomologica italiana, 106: 112–119.
- Gobbi G., 1981. Interessanti reperti di Buprestidi italiani e diagnosi di *Anthaxia liae* n. sp. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, Roma, 36: 33–41.
- Gobbi G., 1983. Appunti su Coleotteri Cleroidei predatori xilofagi (Coleoptera Trogositidae, Cleridae, Melyridae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 38: 51–62.
- Gobbi G., 1993. Nuovi reperti di Buprestidi nell'Italia meridionale (Coleoptera). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 47 (1992): 75–79.
- Gobbi G., 1994. Interessanti reperti di Cerambycidae italiani, specialmente delle regioni centro-meridionali. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 48 (1993): 83–101.
- Gobbi G., 1996. Due notevoli reperti coleotterologici nel Parco Nazionale del Pollino (Coleoptera Trogositidae, Melandryidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 50 (1995): 65–66.
- Gobbi G., 2003. Nuovi reperti di Coleotteri nel biotopo di Policoro (Matera) ed in altre aree protette della Lucania (Coleoptera). Annali del Museo civico di Storia naturale di Ferrara, 5 (2002): 41–50.
- Gobbi G., 2011. Il contributo dell'Associazione Romana di Entomologia (ARDE) alle ricerche faunistiche in Lucania. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 66: 89–95.
- Gobbi G., 2018. Ricerche entomologiche nel biotopo di Policoro (Matera). 2. I Coleotteri Buprestidi (Coleoptera, Buprestidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 73: 39–64.
- Gobbi G. & Piattella E., 2008. Ricerche entomologiche nel biotopo di Policoro (Matera). 1. Nota introduttiva. I Coleotteri Lamellicorni. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 63 (2007): 3–41.
- Grandi G., 1956. Campagna di ricerche dell'Istituto di Entomologia Agraria dell'Università di Bologna alla "Foresta Umbra" (Gargano). Accademia Italiana di Scienze Forestali: 405–418.
- Gridelli E., 1949a. Il problema delle specie a diffusione transadriatica. La Ricerca Scientifica, 19: 654–665.
- Gridelli E., 1949b. Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F.P. Pomini. IX. Coleotteri. Acta Pontificia Academia Scientiarum, 13: 145–196.
- Gridelli E., 1950. Il problema delle specie a diffusione transadriatica con particolare riguardo ai Coleotteri. Memorie di Biogeografia adriatica, 1: 7–299.
- Gridelli E., 1956a. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXI. Coleoptera. 11. Staphylinidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, VIII (5): 1–29.
- Gridelli E., 1956b. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIII. Coleoptera 13. Tenebrionidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, VIII (9): 1–6.
- Grimm R., 1985. Zur kenntnis der Tenebrioniden aus Suditalien. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A, 379: 1–32.
- Gudenzi I. & Neri P., 1988. *Ocydromus fuliginosus* (Nesolitzkt) buona specie (Coleoptera, Carabidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 14 (1987): 531–538.
- Hájek J. & Fery H., 2019. Catalogue of Palearctic Gyrinidae (Coleoptera). Internet version 2019-01-01. http://www.waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Gyrinidae_2019.pdf
- Háva J., 2015a. World Catalogue of Insects. Volume 13. Dermestidae (Coleoptera). Leiden/Boston, Brill, xxvi + 419 pp.
- Háva J., 2015b. Review of Dermestidae (Coleoptera: Bostrichiformia) deposited in the Museo Civico di Scienze Naturali Trieste. Studies and Reports, Taxonomical Series, 11: 247–266.
- Háva J. & Nardi G., 2007. Notes on some *Attagenus* from Italy (Insecta, Coleoptera: Dermestidae). Aldrovandia, 3: 121–124.
- Holdhaus K., 1911. Über die Coleopteren und Molluskenfauna des Monte Gargano. Denkschriften der

- Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, 87: 431–465.
- Izzillo F., Liberto A., Baiocchi D. & Crovato P., 2002. *Buprestis humeralis* nuovo per l'Italia ed altri interessanti reperti di Buprestidi dalle regioni centro meridionali e Sardegna (Coleoptera, Buprestidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 57: 11–25.
- Izzillo F. & Sparacio I., 2011. A new subspecies of *Perotis lugubris* Fabricius, 1777 from Southern Italy (Coleoptera, Buprestidae). Biodiversity Journal, 2: 153–159.
- Jäch M.A., 1990. Revision of the Palearctic species of the genus *Ochthebius* Leach. V. The subgenus *Asiobates* (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau, 60: 37–105.
- Jäch M.A., 1991a. Revision of the Palearctic species of the genus *Ochthebius* Leach. VII. The subgenus *Enicocerus* Stephens (Coleoptera: Hydraenidae). Elytron, 5: 139–158.
- Jäch M.A., 1991b. Revision of the Palearctic species of the genus *Ochthebius* Leach. XI. The subgenus *Calobius* Wollaston, 1854 (Insecta: Coleoptera: Hydraenidae). Reichenbachia, 30: 33–45.
- Jäch M.A., 1993. Taxonomic revision of the Palearctic species of the genus *Limnebius* Leach, 1815 (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau, 63: 99–187.
- Jelínek J., Audisio P., Hájek J., Baviera C., Moncoutier B., Barnouin T., Brustel H., Genç H., & Leschen R.A.B., 2016. *Eपुरaea imperialis* (Reitter, 1877), new invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and Mediterranean areas. Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 94: 1–24. [http://doi: 10.1478/AAPP.942A4](http://doi.org/10.1478/AAPP.942A4)
- Kapp A., 2005. Die palaarktischen Arten der Gattung *Taxicera* Mulsant & Rey, 1873 und *Discerota* Mulsant & Rey, 1873 (Staphylinidae, Aleocharinae, Subtribus Taxicerina). Linzer biologische Beiträge, 37/2: 1277–1323.
- Kapp A., 2019. Revision der westpaläarktischen Arten der Gattungen *Oligota* Mannerheim, 1830 und *Holobus* Solier, 1849 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Hypocyphini). Linzer biologische Beiträge, 51(1): 587–698.
- Klausnitzer B., 1987. Neue Arten aus der *Helodes minuta*-Gruppe. Entomologische Nachrichten und Berichte, 31: 247–252.
- Klausnitzer B., 2009. Insecta: Coleoptera: Scirtidae. In: Suswasserfauna von Mitteleuropa. Begründet von A. Brauer, herausgegeben von P. Zwick. Band 20/17. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 326 pp.
- Koch C., 1933a. Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro Della Torre e Tasso in Italia. I. *Anthophagus*. Bollettino della Società entomologica italiana, 65: 27–30.
- Koch C., 1933b. Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro Della Torre e Tasso in Italia. II. *Anthicus*. Bollettino della Società entomologica italiana, 65: 149–159.
- Koch C., 1937. Appunti sugli Staphilinidi italiani. III. Bollettino della Società entomologica italiana, 69: 83–88.
- Koch C., 1938. Appunti sugli Staphilinidi italiani. IV. Bollettino della Società entomologica italiana, 70: 135–141.
- Konstantinov A.S., Baselga A., Grebennikov V.V., Prena J. & Lingafelter S.W., 2011. Revision of the Palearctic *Chaetocnema* species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini). Pensoft Publishers, Series Faunistica, 95, 363 pp.
- Košťal M. & Caldara R., 2019. Revision of Palaearctic species of the genus *Cionus* Clairville (Coleoptera: Curculionidae: Cionini). Zootaxa, 4631: 1–144. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4631.1.1>
- Kundrata R., Baena M. & Bocak L., 2015. Classification of Omalidae based on molecular data and morphology, with description of Paradrilinae subfam. nov. (Coleoptera: Elateroidea). Zootaxa 3915 (3): 413–422. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3915.3.6>
- Kundrata R. & Bocak L., 2011. The phylogeny and limits of Elateridae (Insecta, Coleoptera): is there a common tendency of click beetles to soft-bodiedness and neoteny? Zoologica Scripta, 40: 364–378. [http://doi: 10.1111/j.1463-6409.2011.00476.x](http://doi:10.1111/j.1463-6409.2011.00476.x)
- Kundrata R., Bocakova M. & Bocak L., 2013. The phylogenetic position of Armatopodidae (Coleoptera: Elateroidea), with description of the first two *Eurypogon* species from China. Contributions to Zoology, 82: 199–208.
- Kundrata R., Bocakova M. & Bocak L., 2014. The comprehensive phylogeny of the superfamily Elateroidea (Coleoptera: Elateriformia). Molecular Phylogenetics and Evolution, 76: 162–171. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2014.03.012>
- Kundrata R., Gunter N.L., Janosikova D. & Bocak L., 2018. Molecular evidence for the subfamilial status of Tetralobinae (Coleoptera: Elateridae), with comments on parallel evolution of some phenotypic characters. Arthropod Systematics & Phylogeny, 76: 137–145. https://www.senckenberg.de/wp-content/uploads/2019/07/08_asp_76-1_kundrata_137-145.pdf
- Kundrata R., Jäch M.A. & Bocak L., 2016. Molecular phylogeny of the Byrrhoidea-Buprestoidea complex (Coleoptera, Elateriformia). Zoologica Scripta, 46: 150–164. <https://doi:10.1111/zsc.12196>

- Kundrata R., Kubackova M., Prosvirov A.S., Douglas H.B., Fojtikova A., Costa C., Bousquet Y., Alonso-Zarazaga M.A. & Bouchard P., 2019. World catalogue of the genus-group names in Elateridae (Insecta, Coleoptera). Part I: Agrypninae, Campyloxeninae, Hemiopinae, Lissominae, Oestodinae, Parablacinae, Physodactylinae, Pityobiinae, Subprotelaterinae, Tetralobinae. *ZooKeys* 839: 83–154. <https://doi:10.3897/zookeys.839.33279>
- La Greca M., 1967. Considerazioni sulla origine del popolamento faunistico pugliese. *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano*, 43, 4^a serie, 11: 297–320.
- Leo P., 1982. Gli *Pseudoseriscius* italiani del gruppo *helvolus* (Kuster). *Natura*. Società italiana Scienze naturali, Museo civico di Storia naturale e Acquario civico di Milano, 73: 97–107.
- Leo P., 1985. Segnalazioni faunistiche italiane. 54. *Dichillus minutus* (Solier) (Coleoptera Tenebrionidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 117: 64.
- Leo P., 2008. Osservazioni su *Dichillus corsicus* e descrizione di tre nuove specie del Mediterraneo occidentale (Coleoptera, Tenebrionidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 99: 603–627.
- Leonardi C., 1971. Considerazioni sulle *Psylliodes* del gruppo *napi* e descrizione di una nuova specie (Coleoptera Chrysomelidae). *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 112: 485–533.
- Leonardi C., 1972. La "*Psylliodes wachsmanni*" Csiki specie distinta e suo inquadramento nel gruppo della "*Psylliodes picina*". *Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste*, 28: 137–146.
- Leonardi C., 1975. Le *Psylliodes* appenniniche del Museo Civico di Storia naturale di Verona. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2: 51–90.
- Leonardi C., 1976. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XVII. Coleoptera Chrysomelidae, Alticinae. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 117: 46–58.
- Leonardi C., 2007. Dati inediti sul genere *Psylliodes* Latreille, con descrizione di quattro nuove specie mediterranee (Coleoptera Chrysomelidae). *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 148: 161–240.
- Leonardi C., 2014. Indagine critica su *Psylliodes laevifrons* Kutschera con descrizione di due nuove specie (Coleoptera Chrysomelidae). *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 154: 81–114.
- Leonardi C. & Sassi D., 1997. I Crisomelidi (Coleoptera Chrysomelidae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). *Memorie della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 27: 189–227.
- Leonardi C. & Sassi D., 2001. Studio critico sulle specie di *Cryptocephalus* del gruppo *hypochaeridis* (Linné, 1758) e sulle forme ad esse attribuite (Coleoptera Chrysomelidae). *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 142: 3–96.
- Leseigneur L., 1967a. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XII. Coleoptera Elateridae, Throscidae, Melasidae. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 97: 116–123.
- Leseigneur L., 1967b. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XIII. Coleoptera Cerambycidae. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 97: 123–129.
- Leseigneur L., 1969. Contribution a l'étude du genre *Adrastus* Eschsch. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 99-101: 86–95.
- Leseigneur L., 1996. *Trixagus atticus* Reitter et *T. minutus* Rey, deux especes meconnues d'Europe occidentale presentes en France (Coleoptera Throscidae). *Bulletin mensuel de la Societe Linneenne de Lyon*, 65: 181–192.
- Leseigneur L., 1997. Rehabilitation de *Trixagus gracilis* Wollaston (Coleoptera Throscidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 102: 137–142.
- Leseigneur L., 2005a. Description de *Trixagus meybohmi* n. sp. et note sur la morphologie des *Trixagus* du groupe *carinifrons* (Coleoptera, Throscidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 110: 89–96.
- Leseigneur L., 2005b. *Trixagus angelinii* n. sp. (Coleoptera, Throscidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 110: 181–184.
- Liberti G., 1978. Revisione delle specie italiane del genere *Danacaea*, primo gruppo. *Memorie della Società entomologica italiana*, 57: 29–45.
- Liberti G., 1981. Description of a new *Danacaea* from Calabria (Italy) (Col., Dasytidae). *Entomologica Basiliensia*, 6: 420–421.
- Liberti G., 1984. III Contributo alla conoscenza del Genere *Danacaea*. Revisione delle specie italiane del 4° gruppo. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 125: 159–179.
- Liberti G., 1985a. IV contributo alla conoscenza del genere *Danacaea* Cast. (Col., Dasytidae). Descrizione del sottogenere nuovo *Allodanacaea* e revisione delle specie italiane. *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 85: 333–362.

- Liberti G., 1985b. V Contributo alla conoscenza del genere *Danacaea* (Col., Dasytidae). Revisione delle specie italiane del II e III gruppo. *Entomologica Basiliensia*, 13: 279–302.
- Liberti G., 1995. Revisione delle specie italiane del genere *Aplocnemus*. *Memorie della Società entomologica italiana*, 73 (1994): 153–194.
- Liberti G., 2004. Il genere *Dasytes* Paykull in Italia. Revisione e catalogo topografico, sinonimico e bibliografico delle specie italiane (Coleoptera, Dasytidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 96: 253–340.
- Liberti G., 2007. Descrizione di tre nuove specie di *Danacaea* subg. *Allodanacaea* Liberti della fauna italiana (Coleoptera, Cleroidea, Dasytidae). *Doriana*, Supplemento agli Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova, 8 (355): 1–10.
- Liberti G., 2012. A contribution to the knowledge of the european *Trichoceble* Thomson, 1859 (Coleoptera, Cleroidea, Dasytidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 104: 191–252.
- Liberti G., 2015. Le specie di *Malthodes* Kiesenwetter, 1852 d’Italia nord-occidentale (Coleoptera, Cantharidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 107: 1–151.
- Liberti G., 2016. Le specie di *Malthodes* Kiesenwetter, 1852 delle Alpi (Coleoptera, Cantharidae) (*Malthodes* del Nord-Est: 3° contributo alla conoscenza del genere *Malthodes* in Italia). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 108: 89–198.
- Liberti G., 2017. Le specie appenniniche di *Malthodes* Kiesenwetter, 1852 (Coleoptera, Cantharidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 110: 33–164.
- Liberti G. & Constantin R., 2009. The *Enicopus* Stephens, 1830 species East of the Iberian Peninsula: *E. ater* (Fabricius, 1787) and *E. pilosus* (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Dasytidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 100: 293–321.
- Liberti G. & Plonski I.S., 2019. The *Psilothrix* Küster, 1850 of the group *viridicoerulea* Geoffroy, 1785 (Coleoptera: Melyridae: Dasytinae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 71: 153–170.
- Liberti G. & Poggi R., 2018. I *Malthodes* (Coleoptera, Cantharidae) della collezione di Agostino Dodero, conservata nel Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova. *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 111: 241–303.
- Liberti G. & Zinetti F., 2009. Nota su alcuni *Aplocnemus* italiani nuovi o poco noti, con descrizione di *Aplocnemus etruscus* n. sp. (Coleoptera, Dasytidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 141: 45–53.
- Liberto A., 1993. Osservazioni sistematiche ed ecologiche su *Anostirus* (*Parastirus*) *cerrutii* Binaghi (Coleoptera, Elateridae). *Bollettino dell’Associazione romana di entomologia*, 47 (1992): 81–85.
- Liberto A. & Gigli M., 2003. *Agrilus viscivorus* Bily, un buprestide nuovo per la fauna italiana (Coleoptera, Buprestidae). *Bollettino dell’Associazione romana di entomologia*, 58: 47–51.
- Löbl I., 1970. Revision der palaarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* Leach und *Caryscapha* Ganglbauer der Tribus Scaphisomini. *Revue suisse Zoologie*, 77: 727–799.
- Löbl I. & Löbl D. (eds.), 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 2. Revised and updated edition. Hydrophiloidea-Staphylinoidea. Brill, Leiden, Boston, XXV + 1702 pp.
- Löbl I. & Löbl D. (Eds.), 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3. Revised and updated edition. Scarabaeoidea-Scirtoidea-Dascilloidea-Buprestoidea-Byrrhoidea. Brill, Leiden, Boston, XXVIII + 983 pp.
- Löbl I. & Löbl D. (Eds.), 2017. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Revised and updated edition. Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Brill, Leiden, Boston, XXXIV + 1443 pp.
- Löbl I. & Smetana A. (Eds.). 2007. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea-Derodontoidea-Bostrichoidea-Lymexyloidea-Cleroidea-Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
- Löbl I. & Smetana A. (Eds.). 2008. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.
- Löbl I. & Smetana A. (Eds.) 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- Lohse A., 1991. *Ernobius angelinii* n. sp., eine neue Anobiidae aus Italien (Coleoptera Anobiidae). *Acta Coleopterologica*, 7: 49–51.
- Longo S., Russo A. & Palmieri V., 1991. Sulla diffusione in Italia di *Coccotrypes dactyliperda* e *Dactylotrypes longicollis* (Coleoptera: Scolytidae). *Atti XVI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Bari-Martina Franca (TA) 23/28 settembre 1991*: 711–715.
- Luigioni P., 1929. I Coleotteri d’Italia. Catalogo sinonimico-topografico-bibliografico. *Memorie Pontificia Accademia delle Scienze, “Nuovi Lincei”*, Roma, ser. 2, 13: 1–1160.
- Magistretti M., 1953. Le specie italiane del genere *Mylabris* F. *Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova*, 62: 30–54.
- Magistretti M., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XI. Coleoptera I. Carabidae. *Annuario dell’Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 8: 1–30.
- Magistretti M., 1956. Ricerche Zoologiche sul Massiccio

- del Pollino. XIII. Coleoptera 3. Oedemeridae, Meloidae, Alleculidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, V7: 1-6.
- Magistretti M., 1960a. Coleotteri Cicindelidi e Carabidi dell'Aspromonte. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 111-158.
- Magistretti M., 1960b. Coleotteri Edemeridi, Pitidi, Aderidi, Meloidi, Serropalpidi, Lagriidi, Alleculidi dell'Aspromonte. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 159-167.
- Magistretti M., 1962a. Coleotteri Cicindelidi e Carabidi della Sila. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 10: 121-194.
- Magistretti M., 1962b. Coleotteri Odemeridi, Pitidi, Pirocroidi, Meloidi, Lagriidi, Alleculidi della Sila. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 10: 195-205.
- Magistretti M., 1962c. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria; Campagne 1956-1957-1958. IX, Coleoptera Oedemeridae, Pyrochroidae, Meloidae, Lagriidae, Alleculidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 92: 83-92.
- Magistretti M., 1965. Coleoptera. Cicindelidae, Carabidae. Catalogo topografico. Fauna d'Italia, VIII. Ed. Calderini, Bologna, 512 pp.
- Magistretti M., 1966. Coleotteri Cicindelidi e Carabidi della Puglia. Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 45: 5-110.
- Magistretti M., 1967. Catalogo degli Oedemeridae italiani. Memorie della Società entomologica italiana, 46: 181-200.
- Magistretti M., 1969. Catalogo topografico dei Coleoptera Cicindelidae e Carabidae d'Italia. I Supplemento. Memorie della Società entomologica italiana, 47: 177-217.
- Magistretti M. & Ruffo S., 1961. Considerazioni sulla diffusione nell'Italia appenninica di alcuni generi di Coleotteri Carabidi e Chrysomelidi. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Rendiconti, 8: 137-179.
- Magistretti M. & Ruffo S., 1969. Quindici anni di ricerche del Museo Civico di Storia naturale di Verona sulla fauna appenninica (1954-1969). Memorie della Società entomologica italiana, 48, fasc. 3: 385-401.
- Magnano L., 1957a. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIV. Coleoptera. 14. Curculionidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 9: 1-53.
- Magnano L., 1957b. Contributi alla conoscenza dei Coleotteri Curculionidi - IV. Appunti per servire alla migliore conoscenza della distribuzione geografica dei Curculionidi italiani. Bollettino della Società entomologica italiana, 87: 138-141.
- Magnano L., 1964. I Coleotteri Curculionidi dell'Aspromonte. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 107-148.
- Magnano L., 1986. Attuali conoscenze sui *Limatogaster* Apfelbeck (1898) e del gruppo *Dialonedus* Reitter (1913) (Coleoptera Curculionidae Otiiorhynchinae). Frustula entomologica, n.s., 7-8 (20-21): 647-666.
- Magnano L., 1993a. Note sugli *Otiiorhynchus* del subg. *Arammichnus*. 3. Le specie dei gruppi *lubricus*, *hellenicus* e *torretassoi*. Fragmenta entomologica, 24 (1992): 219-242.
- Magnano L., 1993b. Note sugli *Otiiorhynchus* del subg. *Arammichnus*. 4. Le specie dei gruppi *setosulus* e *umbilicoides* (Coleoptera Curculionidae). Fragmenta entomologica, 25: 129-154.
- Magnano L., 1996. Note sugli *Otiiorhynchus* del subg. *Arammichnus* Gozis. 5. Le specie dei gruppi *villosus*, *ferrarii* e *juvencus* (Coleoptera Curculionidae). Fragmenta entomologica, 27: 377-398.
- Magnano L., 1998. *Otiiorhynchus (Prodeminus) angelinii* n. sp. dell'Italia meridionale e note sulle specie del sottogenere *Prodeminus* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 130: 155-158.
- Magnano L., 1999a. Note sugli *Otiiorhynchus* del sottogenere *Podoropelmus* Reitter, 1912 (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 23: 247-307.
- Magnano L., 1999b. Note sugli *Otiiorhynchus* del subg. *Arammichnus* Gozis. 6. Le specie dei gruppi *concaurostris*, *velutinus*, *mandibularis*, *calabrensis* e *championi* (Coleoptera Curculionidae). Fragmenta entomologica, 31: 117-172.
- Magnano L., Osella G.B. & Abbazzi P., 2008. Una nuova specie italiana di *Mesagroicus* Schöenherr e ridefinizione delle specie paleartiche occidentali del genere. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 63: 63-81.
- Magrini P., 1984. *Trechus angelae* n. sp. dell'Appennino Calabro-Lucano. Redia, 67: 247-252.
- Magrini P., 1987. *Nebria pennisii*, nuova specie del Monte Sirino (Coleoptera, Carabidae). Sezione Fiorentina C.A.I., Notiziario n. 2: 3 pp.
- Magrini P., 1990. Note su alcuni *Anillus* italiani con descrizione di tre nuove specie (Coleoptera, Carabidae, Anillini). Redia, 76: 71-82.
- Magrini P., 1993. Note su alcuni *Trechus* italiani (Coleoptera, Carabidae). Redia, 73: 275-282.
- Magrini P., 1997. Première revision des *Duvalius* s. str. Italiens (première partie) (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). Les Comptes-rendus du L.E.F.H.E., 2: 202-292.
- Magrini P., 1999. Descrizione del maschio di *Nebria pennisii* Magrini, 1987 e considerazioni sulla sua validità specifica (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae). Acta Entomologica Slovenica, 7: 25-30.

- Magrini P., 2014. Revisione delle specie italiane del genere *Anillus* Jacquelin Du Val, 1851 di Italia e Corsica, con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini, Anillina). *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 106: 133–171.
- Magrini P. & Casale A., 2015. Revisione del genere *Rhegmatoebius* Jeannel, 1937, con descrizione di una nuova specie e una nuova sinonimia (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini, Anillina). *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 107 (2014): 285–325.
- Magrini P., Meoli C. & Abbazzi P., 2005. Tre nuove specie italiane di *Otiorhynchus* del sottogenere *Lixorrhynchus* Reitter, 1914 e note su *O. (Lixorrhynchus) camaldulensis* (Rottenberg, 1870) (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova*, 96 (2004): 215–239.
- Magrini P. & Sciaky R., 1995. Note sui *Rhegmatoebius* italiani, con descrizione di *R. solaris* n. sp. (Coleoptera Carabidae Anillini). *Redia*, 78: 235–241.
- Magrini P. & Vanni S., 1990. Ridescrizione di *Duvalius caoduroi* Pace, 1986 e considerazioni sulle sue affinità sistematiche (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). *Redia*, 73: 181–185.
- Marcuzzi G., 1962. Studi ecologici e faunistici sui Tenebrionidi della Puglia. *Memorie di Biogeografia Adriatica*, 6: 1–79.
- Marcuzzi G., 1970. Contributo alla conoscenza dei Tenebrionidi delle Tremiti (XV Contributo alla conoscenza dei Tenebrionidi). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 102: 35–38.
- Marcuzzi G. & Turchetto Lafisca M., 1977. Ricerche sui Coleotteri della Puglia raccolti da G. Marcuzzi (1960–63). I elenco delle specie. *Quaderni di Ecologia Animale*, 9: 1–186.
- Marek O., 1961. Eine gebirgsausbeute von Nitiduliden aus den Apenninen. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 9: 1–4.
- Mariani G., 1958. Revisione delle specie italiane di *Geotrupes* subgen. *Trypocoprins*. *Memorie della Società entomologica italiana*, 38: 23–43.
- Mariani G., 1959. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria. Campagne 1956–1957–1958. II. Lamellicornia (Scarabaeidae-Lucanidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, fasc. spec., 38: 143–184.
- Mariani G., 1969. Sugli *Aphodius* del sottogenere *Agrilinus* Muls., della Regione Italiana. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 99–101: 171–192.
- Mariani G., 1971. Zoogeografia degli Scarabeidi Laparosticti orofili dell'Appennino centrale (Coleoptera Scarabaeoidea). *Biogeographia, Lavori Società italiana di Biogeografia, Bologna, (N. S.)*, 2: 225–270.
- Mascagni A., 1995. Nuovi dati su alcuni coleotteri italiani (Limnichidae, Dryopidae, Elmidae et Georissidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 127: 122–126.
- Mascagni A., 2005a. Insecta Coleoptera Georissidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 171–172 + CD-ROM.
- Mascagni A., 2005b. Insecta Coleoptera Dryopoidea. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 199–200 + CD-ROM.
- Mascagni A., 2014. The variegated mud-loving beetles of Europe (first part) (Coleoptera: Heteroceridae). *Onychium*, 10 (2013): 78–118.
- Masutti L., 1964. Considerazioni preliminari sui Coleotteri Scolitidi della foresta di Campigna e notizie su alcune specie reperibili lungo la catena appenninica. *Memorie della Società entomologica italiana*, 43: 172–183.
- Masutti L., 1968. Coleotteri Scolitidi dei Pini d'altitudine in alcuni biotopi delle Alpi e sul Massiccio del M. Pollino. *Archivio Botanico e Biogeografico Italiano, Forlì*, 44: 213–223.
- Mazzei A., Audisio P., Vigna Taglianti A. & Brandmayr P., 2019. Geographical distribution and conservation status of the threatened saproxylic beetles *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787), *Clinidium canaliculatum* (O.G. Costa, 1839) and *Omoglymmius germari* (Ganglbauer, 1891) in Italy (Coleoptera: Rhysodidae). *Fragmenta entomologica*, 51: 89–96.
- Mazzei A., Bonacci T. & Brandmayr P., 2012. La diversità funzionale della "Guild" di Coleotteri Carabidi lungo la successione ecologica secondaria nel bioma delle sclerofille in Calabria. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 36: 79–87.
- Mazzei A., Bonacci T., Brandmayr P. & Dutto M., 2015. *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) in Calabria (Italia Meridionale) (Coleoptera Cetoniidae). *Il Naturalista siciliano*, 39: 51–57.
- Mazzei A., Bonacci T., Contarini E. & Brandmayr P., 2011. Coleotteri saproxilobionti del Parco Nazionale della Sila (Calabria) (Insecta Coleoptera). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 32: 81–93.
- Mazzei A., Bonacci T., Contarini E., Zetto T. & Brandmayr P., 2011. Rediscovering the "umbrella species" candidate *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) in Southern Italy (Coleoptera Cucujidae), and notes on bionomy. *Italian Journal of Zoology*, 78: 264–270. <https://doi.org/10.1080/24750263.2018.1449906>
- Mazzei A., Bonacci T., Gangale C., Luzzi G., Pizzolotto R. & Brandmayr P., 2014. La carabidofauna delle al-

- nete della Sila: influenza dei fattori di antropizzazione. XXIV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Orosei (Sardegna), 9–14 giugno 2014, poster.
- Mazzei A., Bonacci T., Gangale C., Pizzolotto R. & Brandmayr P., 2015. Functional species traits of carabid beetles living in two riparian alder forests of the Sila plateau subject to different disturbance factors (Coleoptera: Carabidae). *Fragmenta entomologica*, 47: 37–44.
- Mazzei A., Bonacci T., Horak J. & Brandmayr P., 2018. The role of topography, stand and habitat features for management and biodiversity of a prominent forest hotspot of the Mediterranean Basin: Saproxyllic beetles as possible indicators. *Forest Ecology and Management*, 410: 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.12.039>
- Mazzei A., Bonacci T., Laudati M., Luzzi G., Dutto M. & Brandmayr P., 2014. Osservazioni sul ritrovamento di *Osmoderma italicum* Sparacio, 2000 (Coleoptera Scarabaeidae Cetoniinae) nel Parco Nazionale della Sila (Calabria, Italia) e revisione della presenza storica nell'Italia Meridionale. *Il Naturalista siciliano*, 38: 331–337.
- Mazzei A. & Brandmayr P., 2016. I coleotteri del Parco nazionale della Sila. Specie saproxilobionti di maggior interesse comunitario, faunistico e conservazionistico. Parco Nazionale della Sila, serie “Parco”, Nr. 14, 190 pp.
- Mazzei A. & Brandmayr P., 2018. *Agonum tulliae* sp. n. from the Sila National Park (Calabria, southern Italy) (Coleoptera: Carabidae: Platynini). *Journal of Entomological and Acarological Research*, 49: 48–53. <https://doi.org/10.4081/jeur.2017.6677>
- Mazzei A., Brandmayr P., Contarini E. & Luzzi G., 2016. I Coleotteri del Parco Nazionale della Sila. Ente Parco Nazionale della Sila, 190 pp
- Mazzei A., Gangale C., Laurito M., Luzzi G., Menguzzato G., Pizzolotto R., Scalise C., Uzunov D. & Brandmayr P., 2017. I Coleotteri Carabidi (Coleoptera, Carabidae) come indicatori di passati interventi selvicolturali in foreste vetuste del Parco Nazionale della Sila (Calabria, Italia). *Forest*, 14: 162–174. <https://doi.org/10.3832/efor2351-014>
- McKenna D.D., Farrell B.D., Caterino M.S., Farnum C.W., Hawks D.C., Maddison D.R., Seago A.E., Short A.E.Z., Newton A.F. & Thayer M.K., 2014. Phylogeny and evolution of Staphyliniformia and Scarabaeiformia: forest litter as a stepping stone for diversification of nonphytophagous beetles. *Systematic Entomology*, 40: 35–60. <https://doi.org/10.1111/syen.12093>
- Meggiolaro G., 1960. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956–1957–1958. IV. Coleoptera Pselaphidae. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 90: 80–94.
- Meggiolaro G., 1966a. Descrizione di alcuni nuovi Pselaphidae paleartici e note sinonimiche. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 96: 150–161.
- Meggiolaro G., 1966b. Su alcuni euplectini paleartici. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 96: 163–168.
- Meggiolaro G., 1967. Studi sugli Pselaphidae dell'Appennino centro-meridionale. *Fragmenta entomologica*, 5: 133–151.
- Meregalli M., 1985. Revisione del genere *Plintus* Germar. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2 serie, 5: 1–133.
- Migliaccio E. & Zampetti M.F., 1988. *Megabruchidius dorsalis* e *Acanthoscelidis pallidipennis*, specie nuove per la fauna italiana. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 43: 63–69.
- Miksic R., 1959. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXIX. Coleoptera. 15. Beitrag zur Kenntnis der Lamellicornis-Fauna der Apenninen. *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 11: 1–24.
- Miksic R., 1961. Beitrag zur Kenntnis der Lamellicornis-Fauna der Apenninen. IV. Aspromonte. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 9: 5–24.
- Minelli A. & Vittorelli S., 1976. Il Rassenkreis *Timarcha tenebricosa* (F.). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 3: 1–33.
- Mochi O., Terzani F. & Bartolozzi L., 2019. Contributo alla conoscenza della distribuzione italiana di *Amorphocephala coronata* (Germar, 1817) (Insecta: Coleoptera: Brentidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 49: 137–140.
- Monzini V. & Angelini F., 1997. Nuovi dati geonemici su Carabidi dell'Italia meridionale. *Bollettino della Società entomologica italiana*, Genova, 129: 39–50.
- Monzini V. & Romano V.A., 2001. I Coleotteri Carabidi del fiume Basento (Potenza): nuovi dati per l'Italia meridionale e per la regione Basilicata. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 133: 27–35.
- Moscardini C., 1962. Tre nuove specie appenniniche del genere *Cantharis* del gruppo *tristis* Fabr. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 10: 105–119.
- Moscardini C., 1964. Osservazioni sulle *Cantharis pellicuda* Fabr., *C. pellicuda rauterbergi* Reitt. e *C. baudii* Fiori. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 94: 167–171.
- Moscardini C., 1965. Osservazioni sulle *Cantharis nigricans* Mull., *alpestris* Fiori e sulle specie affini. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 95: 112–123.
- Moscardini C., 1967. *Cantharis puncticollis* Levrat, *C. erichsoni* Bach e descrizione di una nuova specie.

- Bollettino della Società entomologica italiana, 97: 28–33.
- Moscardini C., 1968. I Coleotteri Cantaridini della Regione Appenninica (Col. Cantharidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 16: 49–96.
- Müller G., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVI. Coleoptera. 6. Histeridae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 7: 1–7.
- Müller G., 1960. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria. Campagne 1956-1957-1958. VI. Coleoptera Histeridae. Bollettino della Società entomologica italiana, 90: 136–140.
- Muscarella C., Sparacio I., Liberto A. & Nardi G., 2013. The genus *Lichenophanes* Lesne, 1899 in Italy (Coleoptera Bostrichidae) and short considerations on the saproxylophagous beetle-fauna of Nebrodi Mountains (Sicily). Biodiversity Journal, 4: 451–466.
- Mutinelli F., Federico G., Carlin S., Montarsi F. & Audisio P., 2016. Preliminary investigation on other Nitidulidae beetles species occurring on rotten fruit in Reggio Calabria province (south-western Italy) infested with small hive beetle (*Aethina tumida*). Journal of Apicultural Research, 54: 1–3. <http://dx.doi.org/10.1080/00218839.2016.1142733>
- Nadein K., 2009. Revision of the genus *Mniophila* Stephens, 1831 (Coleoptera: Chrysomelidae). Beiträge zur Entomologie, 59: 103–131.
- Nardi G., 1994. Note su alcuni Coleotteri rinvenuti sui Monti Lepini e nelle aree limitrofe (Lazio) (Coleoptera Histeridae, Bothrideridae, Tenebrionidae, Curculionidae). Quaderni Museo storia Naturale di Patrica, 6: 99–117.
- Nardi G., 2007. Nomenclatorial and faunistic notes on some world Aderidae (Coleoptera). Zootaxa 1481: 21–34.
- Nardi G. & Biscaccianti A.B., 2017. New Italian records of *Lichenophanes varius* (Illiger, 1801) (Coleoptera, Bostrichidae). Nature Conservation, 19: 219–229. <https://doi.org/10.3897/natureconservation.19.12449>
- Nardi G. & Hava J., 2013. Italian Dermestidae: notes on some species and an updated checklist (Coleoptera). ZooKeys 360: 45–81. <https://doi.org/10.3897/zookeys.360.6023>
- Nardi G. & Zahradnik P., 1998. Nuovi dati geonemici su Anobidi di Spagna, Italia e Transcaucasia (Coleoptera, Anobiidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 53: 33–40.
- Neri P., 1982. Un nuovo *Ocydromus* dell'Appennino. (Coleoptera, Carabidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 157–163.
- Neri P., Bonavita P., Gudenzi I., Magrini P. & Toledano L., 2011. Bembidiina della fauna italo-corsa: chiavi di identificazione (Insecta Coleoptera Carabidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 33: 1–183.
- Neri P. & Gudenzi I., 2011. Descrizione di *Bembidion* (*Philochtus*) *demartini* n. sp. dell'Appennino Meridionale (Insecta Coleoptera Carabidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 32: 95–104.
- Neri P. & Magrini P., 2011. Note concernenti i *Bembidion* appartenenti al sottogenere *Lymnaeum* Stephens, 1828 (Insecta Coleoptera Carabidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 31 (2010): 135–154.
- Neri P. & Pavesi M., 1989. *Ocydromus* (*Peryphiolus*) *lucifugus* n. sp. dell'Italia meridionale (Coleoptera, Carabidae, Bembidiinae). Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 130: 217–227.
- Nilsson A.N. & Hájek J., 2019. Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2019-01-01 (http://www.waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Dytiscidae_2019.pdf).
- Norbiato M. & Bartolozzi L., 2017. Contributo alla conoscenza geonemica degli Antribidi italiani (Insecta: Coleoptera: Curculionioidea: Anthribidae: Anthribinae, Choraginae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 45: 125–154.
- Nyholm T., 1948. Studien über die familie Helodidae arten. III: Neue Palaarktische arten der Gattung *Cyphon* Payk. Arkiv för Zoologi, 41: 1–7.
- Olmi M., 1972. The palearctic species of the genus *Dyops* Olivier (Col. Dryopidae). Bollettino Museo di Zoologia Università di Torino, 5: 69–132.
- Olmi M., 1976. Revisione delle specie italiane del genere *Limnius* Illiger con note sulle altre specie paleartiche. Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia, 28: 1–15.
- Olmi M., 1977. Coleoptera. Dryopidae, Elminthidae. Fauna d'Italia, XII. Ed. Calderini, Bologna, 272 pp.
- Osella G.B., 1967. Revisione delle specie italiane del genere *Dichotrachelus* Stierlin. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 15: 349–445.
- Osella G.B., 1977. Revisione della sottofamiglia Raymondionyminae (Coleoptera, Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 1: 1–162.
- Osella G.B., 1981a. Il genere *Styphlidius* Pececke, 1936. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 7 (1980): 57–77.
- Osella G.B., 1981b. *Ruffodytes servadeii* nuova specie di Eirirrhinae del Gargano. Memorie della Società entomologica italiana, 60: 273–277.
- Osella G.B. & Andretti A., 1996. *Pseudostyphlus pillumus* (Gillenhal, 1836): prima segnalazione per la fauna italiana (Coleoptera Curculionidae: Notarinae). Redia, Firenze, 79: 11–25.

- Osella G.B. & Bellò C., 2010. Revisione di *Minyops* Schoenherr, 1823 e *Paraminyops* nov. gen. (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 19: 3–133.
- Osella G.B., Biondi S., Di Marco C., Magnano L. & Zuppa A.M., 2005. Insecta Coleoptera Curculionoidea. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 231–234 + CD-ROM.
- Osella G.B. & Lodos N., 1979. *Hoplopteridius lutosus* (Frivaldsky): brevi note sistematiche (Coleoptera: Curculionidae-Hylobiinae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi, Izmir, 3: 161–170.
- Osella G.B. & Magnano L., 1986. I Coleotteri Attelabidi e Curculionidi a diffusione transadriatica. Biogeographia, Lavori Società italiana di Biogeografia, Bologna, 10 (1984): 701–792.
- Osella G.B., Pannunzio G. & Zanetti A., 2009. Il popolamento ad Artropodi dei muschi igropetrici del Parco Nazionale del Gran Sasso d'Italia e Monti della Laga. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia, 33: 3–26.
- Osella G.B. & Zuppa A.M., 1994a. Gli *Otiiorhynchus* Germar, 1824 del Monte Nerone e montagne viciniori (Appennino umbro-marchigiano). Biogeographia, Lavori della Società italiana di Biogeografia, Bologna, 17 (1993): 367–397.
- Osella G.B. & Zuppa A.M., 1994b. Anthribidae, Api-onidae, Attelabidae e Curculionidae del Monte Nerone (e territori viciniori) (Appennino umbro-marchigiano) (Coleoptera Curculionidae). Biogeographia, Lavori della Società italiana di Biogeografia, Bologna, 17 (1993): 399–426.
- Osella G.B., Zuppa A. & Altea T., 1994. Il popolamento a Curculionoidea delle Montagne Gemelle dei Fiori e di Campi (Marche-Abruzzo). Rivista Museo Scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo, 16: 45–78.
- Otero J.C., 2002. Morphometric study of the species *Hypocopus latridioides* Motschulsky, 1839 and *H. quadricollis* Reitter, 1877 (Coleoptera: Atomariinae). Entomologica Fennica, 13: 139–145.
- Otero J.C., 2011. Coleoptera, Monotomidae, Cryptophagidae. In: Fauna Iberica, vol. 35, Ramos M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid, 365 pp.
- Otero J.C., 2012. *Telmatophilus* Heer, 1841 (Coleoptera: Cryptophagidae) of western Palaearctic region. Entomologica Fennica, 23: 113–120.
- Otero J.C., 2013. Cryptophaginae (Coleoptera) de la Región Paleártica occidental. Asociacion Europaea de Coleopterologia, Barcelona, Coleopterological Monographs, 4: 7–295.
- Otero J.C. & Angelini F., 1981. Su alcuni *Cryptophagus* italiani nuovi o poco conosciuti (Coleoptera, Cryptophagidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 113: 96–100.
- Otero J.C. & Angelini F., 1984. Contributo alla conoscenza dei Cryptophagidae italiani. Entomologica, 19: 81–96.
- Otero J.C. & Angelini F., 1996. Segnalazione di dodici specie di Cryptophagidae nuove per la fauna italiana. Bollettino della Società entomologica italiana, 128: 125–136.
- Otero J.C. & López M.J., 2016. Coleoptera Latridiidae. In: Ramos M.A. et al. (Eds.), Fauna Iberica, vol. 42, Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid, 288 pp.
- Pace R., 1974a. Tre nuove specie di Pselaphidae dell'Italia meridionale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 1: 121–134.
- Pace R., 1974b. Otto nuove specie di Leptotyphlinae dell'Italia centro-meridionale (Coleoptera Staphylinidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 1: 135–166.
- Pace R., 1977a. Dodici nuove specie di Leptotyphlinae dell'Italia peninsulare (Coleoptera Staphylinidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 155–201.
- Pace R., 1977b. Nuove specie di *Geostiba* Thomson dell'Italia e della Jugoslavia. Nouvelle Revue Entomologie, 7: 299–305.
- Pace R., 1977c. Quindici nuove specie di Stafilinidi ipogei dell'Italia centro-meridionale. Redia, 60: 125–177.
- Pace R., 1977d. Nuove specie di Scydmaenidae della Toscana e della Puglia (Coleoptera). Redia, 60: 211–219.
- Pace R., 1977e. Studio sul genere *Geostiba* Thomson con descrizione di nuove specie italiane. Fragmenta entomologica, 13: 183–229.
- Pace R., 1978. *Leptusa* Kr. nuove o poco note del Museo Civico di Storia naturale di Genova. Annali del Museo civico di Storia naturale “G. Doria” di Genova, 82: 295–322.
- Pace R., 1979. Una nuova specie di *Vulda* della fauna d'Italia (Coleoptera Staphylinidae). Nouvelle Revue Entomologie, 9: 107–109.
- Pace R., 1985. Descrizione di *Allotyphlus sipontinus* nuova specie del Gargano e di *Metrotyphlus viti* nuova specie della Liguria. Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, 10: 59–63.
- Pace R., 1986. Descrizione di *Duvalius caoduroi*, nuova specie della Grotta di Trecchina (Lucania). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12: 149–151.
- Pace R., 1989. Monografia del genere *Leptusa* Kraatz. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 1–307.

- Pace R., 1996. Coleoptera. Staphylinidae Leptotyphlinae. Fauna d'Italia, XXXIV. Ed. Calderini, Bologna, 328 pp.
- Pace R., 2002. Nuove specie del genere *Geostiba* Thomson (Coleoptera, Staphylinidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 26: 3–25.
- Pace R. & Zanetti A., 1977. I *Philonthus* (sensu lato) appenninici del Museo Civico di Storia naturale di Verona. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 287–305.
- Paganetti-Hummeler G., 1910. Beitrag zur Kenntnis der Halticinenfauna Mittel- und Südtaliens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, 6: 169–171.
- Palm T., 1939. En exkursionsdag på Monte Pollino. Entomologbladet, 3: 58–69.
- Palmeri V. & Campolo O., 2006. Sulla presenza di *Phoracantha recurva* Newman e *Phoracantha semipunctata* F. (Coleoptera Cerambycidae) in Calabria. Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura, 38: 251–254.
- Palmeri V., Scirtò G., Malacrino A., Laudani F. & Campolo O., 2015. A new pest for European honey bees: first report of *Aethina tumida* Murray (Coleoptera: Nitidulidae) in Europe. Apidologie, 46: 527–529. <https://doi.org/10.1007/s13592-014-0343-9>
- Pan A. & Bologna M.A., 2014. Taxonomy, Bionomics and Faunistics of the Nominated Subgenus of *Mylabris* Fabricius, 1775, with the description of five new species (Coleoptera: Meloidae: Mylabrini). Zootaxa 3806: 1–78. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3806.1.1>
- Pantaleoni R.A., 2012. Achille Costa (1823–1898), Entomologo Naturalista Esploratore: tratteggio biografico. Il Naturalista siciliano, 36: 3–17.
- Pardo Alcaide A., 1961. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXI. Coleoptera 16. Lycidae y Malachiidae de los Montes Pollino y Aspromonte (Italia meridionale). Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 17: 1–8.
- Pardo Alcaide A., 1967. Notas sobre Malachiidae del Mediterraneo Occidental (Col.) V. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 15: 97–104.
- Pasqual C. & Angelini F., 2001. Malachiini dell'Italia meridionale e della Sicilia (Coleoptera, Melyridae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia, 25: 101–126.
- Pederzani F., 1999. *Hydroporus* (*Sternoporus*) *jurjuren-sis* Régimbart, 1895 nel Massiccio del Pollino. Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 11, suppl.: 3–4.
- Pederzani F. & Rocchi S., 2005. Due interessanti *Hydroporus* Clairville del Parco Nazionale d'Abruzzo: *Hydroporus* (*Sternoporus*) *apenninus* n. sp. e *Hydroporus* (*Hydroporus*) *sanfilippo* Ghidini, 1958 (Coleoptera Dytiscidae). Atti Accademia Roveretana degli Agiati, ser. 8, 5B: 317–324.
- Pedroni G., 2004. Nuovi dati geonemici ed ecologico-biologici sugli Anthribidae italiani (Coleoptera Curculionoidea). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia, 28: 39–50.
- Pedroni G., 2012. Le specie italiane del gruppo di *Leiosoma scrobiferum* con descrizione di sei specie nuove (Coleoptera, Curculionidae, Molytini). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 36: 73–90.
- Pesarini C., 1964. Appunti per una migliore conoscenza delle specie circummediterranee del genere *Sphenophorus* Schoenherr (I Contributo alla conoscenza dei Coleotteri Curculionidi). Bollettino della Società entomologica italiana, 94: 159–164.
- Pesarini C., 1972. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XV. Coleoptera Curculionidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 104: 75–85.
- Pesarini C., 1974. Note sulla geonomia di alcune specie italiane di Curculionidi della sottofamiglia Cleoninae (XIX Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 106: 170–174.
- Pesarini C., 1975. Su alcuni Curculionidi paleartici nuovi o poco conosciuti (XVII Contributo alla conoscenza dei Coleotteri Curculionidi). Memorie della Società entomologica italiana, 53: 39–55.
- Penati F. & Vienna P., 2005. Insecta Coleoptera Histeridae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 173–175 + CD-ROM.
- Petagna V., 1787. Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae. Varentrapp et Werner. Francofurti et Magontiae apud Varrentrapp et Wenner: I-VI, 1-46.
- Petagna L., Terrone G. & Tenore M., 1827. Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata e della Calabria Citeriore effettuato nel 1826. Tipografia Francese, Napoli, 152 pp. https://books.google.it/books?id=VIqEX5dlMkMC&hl=it&source=gbs_book_other_versions
- Pierotti H., 1974. Gli *Aphodius* italiani del sottogenere *Melinopterus* Mulsant. Bollettino della Società entomologica italiana, 106: 24–37.
- Pierotti H., 1976. Ritrovamento dell'*Aphodius ragusae* Reitt. in Basilicata e in Sicilia. Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, 1: 37–41.
- Pierotti H., 1977. Contributo alla conoscenza degli *Aphodius* della Calabria e del Pollino. Bollettino della Società entomologica italiana, 109: 173–198.
- Pierotti H., 1980. Deux nouveaux *Rhysssemus* italiens (Col. Aphodiidae). L'Entomologiste, 36: 22–25.
- Pierotti H., 2011a. Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XIII. Una nuova *Pseudomeira*

- Stierlin, 1881, dell'Italia meridionale (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société entomologique de France, 116: 15–16.
- Pierotti H., 2011b. Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-paleartici. VIII. Revisione delle specie europee del genere *Heteromeira* Solari, 1955 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société entomologique de France, 116: 195–239.
- Pierotti H. & Bellò C., 1994. Peritelini nuovi o interessanti della fauna tirrenica. 3° contributo alla conoscenza della Tribu Peritelini. Il Naturalista siciliano, 18: 107–122.
- Pilon N., 1998. Atlante faunistico degli Staphylinini italiani con note sinonimiche (Coleoptera). Memorie della Società entomologica italiana, 76: 61–129.
- Pilon N., 2005. Insecta Coleoptera Staphylinidae Staphylininae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 187–188 + CD-ROM.
- Pittino R., 1978. Revisione del genere *Psammodius* Fallen, 1: le specie paleartiche del gruppo *nocturnus*. Bollettino della Società entomologica italiana, 110: 106–137.
- Pittino R., 1979. Note su alcuni Coleotteri Scarabaeoidea Laparosticta della fauna italiana. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 34: 32–41.
- Pittino R., 2006. New or noteworthy records of Western Palearctic species of the genus *Ochodaeus* (Coleoptera, Ochodaeidae). Fragmenta entomologica, 38: 75–81.
- Pittino R. & Mariani G., 1993. *Aphodius (Agrilinus) convexus* Erichson: a misinterpreted valid species from the Western Palearctic fauna. Bollettino della Società entomologica italiana, 125: 131–142.
- Platia G., 1983. Nuovi dati sulla distribuzione italiana di alcune specie del genere *Ampedus* Dejean. Giornale italiano di Entomologia, 1: 141–144.
- Platia G., 1985. Descrizione di due nuove specie di Elateridi paleartici. Bollettino della Società entomologica italiana, 117: 93–96.
- Platia G., 1994. Fauna d'Italia. XXXIII. Coleoptera Elateridae. Ed. Calderini, Bologna, 429 pp.
- Platia G., 2005. Insecta Coleoptera Elateridae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 201–203 + CD-ROM.
- Platia G. & Bartolozzi L., 1988. Contributo alla conoscenza degli Elateridi della Calabria. Redia, 71: 61–97.
- Platia G. & Gudenzi I., 1985. Descrizione di un nuovo *Cidnopus* Thomson della fauna europea. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 10 (1983): 21–29.
- Platia G. & Gudenzi I., 1986. Note sistematiche, ecologiche e geonemiche sull'*Agriotes aequalis* Schwarz con descrizione della larva (Coleoptera Elateridae). Bollettino della Società entomologica italiana, 118: 43–48.
- Platia G. & Gudenzi I., 1998. Descrizione di una nuova specie di *Athous* Eschscholtz, 1829 e della femmina di *Athous pedemontanus* Platia, 1988, del Piemonte, con nuovi dati geonemici su alcuni Elateridi della fauna italiana. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 19: 267–273.
- Platia G. & Gudenzi I., 2005. Description of eleven new species of click-beetles of the Palearctic region, a case of teratology and new records of some species of the Italian fauna (Insecta Coleoptera Elateridae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 21: 109–127.
- Platia G. & Sama G., 1981. Nuovi dati geonemici su Coleotteri Carabidi italiani. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 36: 23–32.
- Poggi R., 1971. Brevi note corologiche su due *Scopaeus* dell'Italia meridionale. Bollettino della Società entomologica italiana, 103: 41–42.
- Poggi R., 1983. Note di caccia. V. Reperti di specie italiane rare o poco note. Bollettino della Società entomologica italiana, 115: 156–160.
- Poggi R., 1984. Note su alcuni Pselaphidae paleartici, con descrizione di *Bryaxis pescaroloi* n. sp. delle Alpi Pennine. Bollettino della Società entomologica italiana, 116: 89–95.
- Poggi R., 1985. Caratteri diagnostici e distribuzione delle specie italiane del genere *Diodesma* Latreille. Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 85: 363–374.
- Poggi R., 1994. Appunti sinonimici su *Tychobythinus gularis* (Dod.) e *T. anellii* (Kar.) (Coleoptera Pselaphidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 126: 141–144.
- Poggi R., 1995. Note su *Derodontus raffrayi* Gouvelle e *D. macularis* (Fuss) (Coleoptera Derodontidae). Bollettino della Società entomologica italiana, 126 (1994): 249–254.
- Poggi R., 2009. Agostino Dodero (1864-1937). Appunti per una biografia - In: Bottelli F. & Giachino P.M. (Eds.), Contributo alle conoscenze naturalistiche della Valle Oropa (Biella, Italia). Memorie Associazione naturalistica piemontese, 11: 75–82.
- Poggi R. & Sabella G., 2005. Insecta Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 183–184 + CD-ROM.
- Przeżożny M., 2019. Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2019-01-

- 01 (http://www.waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Hydrophiloidea_2019.pdf).
- Puppin O., 1974. *Dictyoptera aurora caprai* n. subsp. ed illustrazioni di altri Dictyopterini. Bollettino della Società entomologica italiana, 106: 40–46.
- Puthz V., 1986. Über drei italienische Vertreter der Gattung *Stenus* Latr. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12 (1985): 419–429.
- Ranius T., Aguado L.O., Antonsson K., Audisio P., Balterio A., Carpaneto G.M., Chobot K., Gjurašin B., Hanssen O., Huijbregts H., Lakatos F., Martin O., Neculiseanu Z., Nikitsky N.B., Paill W., Pirnat A., Rizun V., Ruicănescu A., Stegner J., Süda I., Szwalko P., Tamutis V., Telnov D., Tsinkevich V., Versteirt V., Vignon V., Vögeli M. & Zach P., 2005. *Osmoderma eremita* (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation, 28: 1–44.
- Rapuzzi P. & Arcorace L., 2018. *Purpuricenus* (*s. str.*) *coccineus* Breit, 1917: a distinct species endemic from Calabria, Italy (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae Purpuricenini). Biodiversity Journal, 9: 89–94.
- Rapuzzi P. & Sama G., 2014. Descriptions of nine new species of Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Munis Entomology and Zoology Journal, 9: 1–16.
- Ratti E., 2000. Note faunistiche ed ecologiche sui Cucuidi italiani (Coleoptera Cucujidae). Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia, 50: 103–129.
- Ratti E., 2005. Insecta Coleoptera Cucujidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 211–213 + CD-ROM.
- Ratti E., 2007. I coleotteri Silvanidi in Italia (Coleoptera Cucujoidea Silvanidae). Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia, 58: 83–137.
- Ravizza C., 1972. I *Pogonus* dei litorali italiani. Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia, 22–23: 7–65.
- Ravizza C., 1973. Cicindelidi e Carabidi raccolti sul Massiccio del Sirino (Appennino Lucano). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 20: 55–69.
- Regalin R., 1978. Dati geonemici su alcuni alticini italiani. Bollettino della Società entomologica italiana, 110: 202–204.
- Regalin R., 1980. Le specie italiane del genere *Labidostomis* Redtenbacher. Memorie della Società entomologica italiana, 59: 37–48.
- Reibnitz J., Graf R. & Coray A., 2013. Verzeichnis der Ciidae (Coleoptera) der Schweiz mit Angaben zur Nomenklatur und Ökologi. Checklist of the Ciidae (Coleoptera) of Switzerland, with comments on nomenclature and ecology. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 86: 63–88.
- Robertson J.A., Ślipiński A., Moulton M., Shockley F.W., Giorgi A., Lord N.P., McKenna D.D., Tomaszewska W., Forrester J., Miller K.B., Whiting M.F. & McHugh J.V., 2015. Phylogeny and classification of Cucujoidea and the recognition of a new superfamily Coccinelloidea (Coleoptera: Cucujiformia). Systematic Entomology, 40: 745–778. <https://doi.org/10.1111/syen.12138>
- Rocchi S., 2000. Segnalazione di nuovi reperti di Ditisicidi in Italia (Insecta Coleoptera Dytiscidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 13, suppl.: 11–16.
- Rocchi S., 2002. Reperti inediti di Hydrophiloidea in Italia (Insecta Coleoptera Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 16, suppl.: 43–48.
- Rocchi S., 2005a. Insecta Coleoptera Hydroadephaga. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 165–166 + CD-ROM.
- Rocchi S., 2005b. Insecta Coleoptera Hydrophiloidea. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 167–168 + CD-ROM.
- Rocchi S., 2005c. Nuovi dati geonemici su alcuni Coleotteri Idroadefagi italiani (Coleoptera Haliplidae, Gyrinidae, Dytiscidae). Onychium, 3: 17–20.
- Rocchi S., 2007. Il genere *Oreodytes* Seidlitz, 1887 negli Appennini (Coleoptera, Dytiscidae). Onychium, 5: 29–33.
- Romano M., 2006. La ricerca entomologica in Sicilia: protagonisti, cultori e collezioni a cavallo di tre secoli. Il Naturalista siciliano, 30: 151–226.
- Rössner E. & Fery H., 2014. *Aphodius* (*Biralus*) *mahunkaorum* (Ádám, 1983) in Europa (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae). Entomologische Zeitschrift, 124: 113–122.
- Rössner E. & Krell F.T., 2009. Identität und taxonomischer Status von *Amphimallon ochraceum* (Knoch, 1801) und *A. fallenii* (Gyllenhal, 1817) sowie weiterer mit *A. solstitialis* (Linnaeus, 1758) verwandter Taxa (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). Vernate Fortsetzung der Veröffentlichungen des Naturkundemuseum Erfurt, Erfurt, 27: 221–261.
- Roubal J., 1932. Addition à liste des Coléoptères de Monte Gargano. Bollettino della Società entomologica italiana, 64: 66.
- Rücker W.H., 1998. Una nuova specie italiana di Latridiidae: *Dienerella angelinii* nov. sp. (Coleoptera). Do-

- riana, supp. Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 7 (306): 1–7.
- Rücker W.H., 2006. Revision von *Corticaria crenulata* (Gyllenhal, 1827) und *Corticaria olympiaca* Reitter, 1875 mit Beschreibung vier neuer Arten (Coleoptera: Latridiidae). Entomologische Zeitschrift, 116: 277–281.
- Rücker W.H., 2018. Latridiidae und Merophysiiidae der West-Paläarktis. Wolfgang H. Rücker Selbstverlag, Neuwied, 676 pp.
- Rücker W.H. & Jonson C., 2007. Revision of *Melanophthalma taurica* (Mannerheim, 1844) species-group and description of three new species. (Coleoptera: Latridiidae). Latridiidae, 5: 11–24.
- Rücker W.H. & Poggi R., 2013. Descrizione di *Dienerella polyhymnia*, nuova specie mediterranea di Latridiidae, con note su *Dienerella elongata* (Curtis, 1839) (Coleoptera). Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 105: 447–458.
- Ruffo S., 1957. Sulle ricerche faunistiche nell'Appennino. Bollettino della Società entomologica italiana, 87: 64–67.
- Ruffo S., 1964a. Contributi alla conoscenza della distribuzione dei Coleotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. I. Orsodacnini, Donaciini, Criocerini. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12: 41–96.
- Ruffo S., 1964b. Contributo alla conoscenza della distribuzione dei Coleotteri Crisomelidi nella Regione Appenninica. 2. Alticini: generi *Sphaeroderma*, *Argopus*. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 12: 97–106.
- Ruffo S. & Vigna Taglianti A., 1988. Appunti per una storia delle ricerche entomologiche nell'Appennino centro-meridionale. Atti del XV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, L'Aquila, 13–17 giugno 1988: 7–30.
- Ruzzier E., 2013. Taxonomic and faunistic notes on Italian Mordellidae (Coleoptera Tenebrionidea) with re-description of *Falsopseudotomoxia agyropleura* (Franciscolo, 1942) n. comb. Bollettino della Società entomologica italiana, 143: 103–115.
- Sabatinelli G., 1976. Note su alcuni Scaraboidea floricoli dell'Italia Meridionale e descrizione di *Amphimallon pseudomajale* n. sp. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 31: 35–46.
- Sabella G., 1997. *Brachygluta angelinii*, a new species from Southern Italy (Insecta, Coleoptera, Pselaphidae). Spixiana, 20: 137–140.
- Sabella G. & Angelini F., 2001. Gli Pselaphidi dell'Aspromonte (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia, 25: 9–61.
- Sabella G. & Poggi R., 1997. Revisione dei *Tychus* Leach del gruppo *florentinus* Reitt. con descrizione di nuove specie. Annali del Museo civico Storia naturale "G. Doria" di Genova, 91: 383–409.
- Salamanna G., 1968. Osservazioni sugli Scarabeidi delle Isole Tremiti. Atti VII Congresso Nazionale di Entomologia, Verona (1967): 134–135.
- Salfi M., 1951. Ricerche faunistiche sul Massiccio del Pollino. La Ricerca Scientifica, 21: 79–84.
- Salfi M., 1963. Viaggi di naturalisti in Calabria. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 15: 1–22.
- Sama G., 1979. Note ecologiche e geonemiche su alcuni Buprestidi italiani. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 34: 16–17.
- Sama G., 1981. Materiali per una fauna dei Cerambycidae d'Italia. Annali del Museo civico Storia naturale "G. Doria" di Genova, 83: 473–522.
- Sama G., 1988. Fauna d'Italia. XXVI. Coleoptera Cerambycidae. Catalogo topografico e sinonimico. Ed. Calderini, Bologna, 216 pp.
- Sama G., 2005. Insecta Coleoptera Cerambycidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 219–222 + CD-ROM.
- Sama G. & Rapuzzi P., 2011. Una nuova Checklist dei Cerambycidae d'Italia (Insecta Coleoptera Cerambycidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 32: 121–164.
- Sanfilippo N., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XVII. Coleoptera 7. Dytiscidae, Gyrinidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 7: 1–4.
- Sassi D., 1994. Le Cassidine appenniniche del Museo di Storia naturale di Verona (Coleoptera Chrysomelidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 18 (1991): 53–90.
- Sassi D., 2001. Nuove specie del genere *Cryptocephalus* vicine a *Cryptocephalus marginellus* (Coleoptera Chrysomelidae). Memorie della Società entomologica italiana, 80: 107–138.
- Sassi D., 2005. Insecta Coleoptera Chrysomelidae Cryptocephalinae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 223–225 + CD-ROM.
- Sassi D. & Borowiec L., 2006. *Cassida inopinata*, a new species from Italy and Balkan Region (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 17: 545–560.
- Schaefer L., 1965. Une nouvelle espece d'*Acmaeodera* decouverte en Italie (Coleoptera Buprestidae). Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 20: 36–38.
- Schatzmayr A., 1926. Le *Oedemera* italiane. Memorie della Società entomologica italiana, 2: 131–151.

- Schatzmayr A., 1941. Coleotteri raccolti nella Grande Sila dal Dott. E. Moltoni. Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano: 49–102.
- Schatzmayr A., 1943. Elateridi raccolti dal Dott. E. Moltoni nella Grande Sila (Calabria). *Natura*, 34: 138–139.
- Schawaller W., 2002. Evidence of two species of *Eledona* Latreille and *Eledonoprius* Reitter in Europe (Coleoptera: Tenebrionidae). *Entomologische Blätter*, Berlin, 98: 31–34
- Scheerpeltz O., 1956. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXII. Coleoptera 12. Neue Kurzflugler aus Süditalien (Col., Staphylinidae). *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 8: 1–33.
- Scheerpeltz O., 1961. Wissenschaftliche ergebnisse der Zoologischen Explorationen des Gebietes von Aspromonte im südlichsten Calabrien in den Jahren 1957/58 durch Prof. S. Ruffo und Dr. M. Magistretti. Col. Staphylinidae. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 9: 115–154.
- Schimmel R., Tarnawski D., Han T. & Platia G., 2015. Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Elateridae: Denticollinae) Part I: Genera *Pristilophus* Latreille, 1834 stat. nov., *Selatosomus* Stephens, 1830, *Warchalowskia* (Tarnawski, 1995) stat. nov., and *Sinophotistus* gen. nov. *Polish Entomological Society, Monographs*, 11, Poznań, 328 pp.
- Schülke M., 1996. A new subspecies of *Tachinus marginellus* (Fabricius) from Italy (Coleoptera Staphylinidae). *Il Naturalista siciliano*, 20: 99–107.
- Sciaky R., 1979. Gli *Anisodactylus* italiani con riferimento alle altre specie mediterranee. *Memorie della Società entomologica italiana*, 57 (1978): 3–18.
- Sciaky R., 1984. Revisione dei *Pterostichus* italiani affini a *cristatus* Duf. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 11: 149–170.
- Sciaky R., 1987. Revisione delle specie paleartiche occidentali del genere *Ophonus* Dejean, 1821. *Memorie della Società entomologica italiana*, 65 (1986): 29–120.
- Sciaky R., 1991. Revisione dei *Philorhizus* della Regione Paleartica con descrizione di quattro nuovi taxa. (XXIII Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Carabidae). *Memorie della Società entomologica italiana*, 69 (1990): 53–78.
- Sciaky R. & Facchini S., 1999. Quattro specie di Carabidi nuove o confermate per la fauna italiana (Coleoptera, Carabidae). *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 54: 59–63.
- Sciaky R. & Pavesi M., 1986. Nuovi dati geonemici su Carabidae italiani. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano*, 127: 13–26.
- Scupola A., 2000. Revisione della tribù Cossyphini Latreille, 1802. Parte I. Introduzione e genere *Cossyphus* Olivier, 1791 (Coleoptera Tenebrionidae). *Atti del Museo Civico di Storia naturale di Trieste*, 48: 185–249.
- Seago A.E., Giorgi J.A., Li J. & Ślipiński S.A., 2011. Phylogeny, classification and evolution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) based on simultaneous analysis of molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 60: 137–151. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2011.03.015>
- Simonetta G., 1989. Contributo alla conoscenza dei Cerambicidi della Calabria. *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 43 (1988): 49–53.
- Smetana A., 1954. Ein Beitrag zur Kenntniss der italienischen *Philonthus* und *Gabrius*-Arten. *Entomologisk Tidskrift*, 75: 39–43.
- Solari F., 1932. Tre nuove specie di Curculionidi mediterranei. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 64: 160–164.
- Sörensson M. & Delgado J.A., 2019. Unveiling the smallest - systematics, classification and a new subfamily of featherwing beetles based on larval morphology (Coleoptera: Ptiliidae). *Invertebrate Systematics*, 33: 757–806. <https://doi.org/10.1071/IS19007>
- Sparacio I., 2000. Osservazioni sulle *Osmoderma* Le Peletier et Audinet-Serville europee con descrizione di una nuova specie dell'Italia meridionale (Coleoptera Cetoniidae). *Il Naturalista siciliano*, 24: 225–239.
- Sparacio I., 2006. Una nuova specie del genere *Acmaeoderella* Cobos, 1955 dell'Italia Meridionale (Coleoptera Buprestidae). *Il Naturalista siciliano*, 30: 35–42.
- Sparacio I., 2009. Note tassonomiche su Cetoniidae italiani (Coleoptera Scarabaeoidea Cetoniidae). *Il Naturalista siciliano*, 33: 157–165.
- Švec Z. & Angelini F., 1995. The Italian species of the family Phalacridae with the description of *Olibrus demarzoii* sp. n. (Coleoptera). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 127: 199–212.
- Szawaryn K., Bocak L., Ślipiński A., Escalona H.E. & Tomaszewska W., 2015. Phylogeny and evolution of phytophagous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini), with recognition of new genera. *Systematic Entomology*, 40: 547–569. <https://doi.org/10.1111/syen.12121>
- Tamanini L., 1955. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XIV. Coleoptera. 4. Catopidae, Liodidae, Scaphidiidae, Silphidae. *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli*, 6: 1–19.
- Tamanini L., 1969. Gli Scaphidiidae del Museo Civico di Storia naturale di Verona e descrizione di una

- nuova specie. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 16: 483–490.
- Tassi F., 1962a. Coleotteri Buprestidi dell'Aspromonte e della Sila. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 10: 211–231.
- Tassi F., 1962b. Su alcuni Buprestidi italiani specialmente delle Regioni centro-meridionali. Bollettino della Società entomologica italiana, 92: 53–57.
- Tassi F., 1966a. Ricerche Zoologiche sul Massiccio del Pollino. XXXII. Coleoptera 17. Cerambycidae. Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli, 17: 1–65.
- Tassi F., 1966b. Su alcuni Buprestidi italiani nuovi o particolarmente interessanti. Bollettino della Società entomologica italiana, 96: 17–27.
- Tassi F., 1966c. Su alcuni Coleotteri Buprestidi dell'Italia meridionale ed insulare. Accademia Gioenia di Catania, 8: 610–625.
- Tassi F., 1967. Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria, Campagne 1956-1957-1958. XIV. Coleoptera Buprestidae. Bollettino della Società entomologica italiana, 97: 135–152.
- Tassi F., 1970. Alcuni reperti interessanti dai Monti della Laga. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 25: 101–106.
- Terzani F. & Ceccolini F., 2015. Il genere *Mycterus* Schellenberg, 1798 in Italia (Insecta Coleoptera Mycteridae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, 41: 109–115.
- Terzani F., Ceccolini F., Håjek J. & Cianferoni F., 2017. Taxonomic review of the genus *Dascillus* Latreille, 1797 in the Western Palaearctic (Coleoptera: Dascillidae). Zootaxa 4282 (2): 255–268. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4282.2.2>
- Toledo M. & Rocchi S., 2017. Reperti inediti di Coleotteri acquatici in Italia (Coleoptera: Hydroscaphidae, Gyrinidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Limnichidae, Eirrhinidae). Onychium, 13: 63–74.
- Tomaszewska W. & Szawaryn K., 2016. Epilachnini (Coleoptera: Coccinellidae). A Revision of the World Genera. Journal of Insect Science, 16: 1–91. <https://doi:10.1093/jisesa/iew082>
- Tosevski I., Caldara R., Jovic J., Baviera C., Hernandez-Vera G., Gassmann A. & Emerson B.C., 2014. Revision of *Mecinus heydenii* species complex (Curculionidae): integrative taxonomy reveals multiple species exhibiting host specialization. Zoologica Scripta, 43: 34–51. <https://doi:10.1111/zsc.12037>
- Toskina I.N., 2012. Some new palaearctic species of the genus *Stagetus* Wollaston, 1861 (Coleoptera: Ptinidae: Dorcatominae). Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Ser. Biol., 117: 16–28. - Russian: Тоскина И. Н., 2012. Несколько новых палеарктических видов рода *Stagetus* Wollaston, 1861 (Coleoptera: Ptinidae: Dorcatominae). Бюл. Москов. об-ва испытателей природы. Отд.биол., 117: 16–28.
- Trizzino M., Carnevali L., De Felici S. & Audisio P., 2013. A revision of *Hydraena* species of the “*Haenydra*” lineage (Coleoptera, Hydraenidae). Zootaxa 3607 (1): 1–173. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3607.1.1>
- Vanni S. & Magrini P., 1995. Ridescrizione di *Duvalius silvestrii* (Gestro, 1896) e ulteriori note su *Duvalius caoduroi* Pace, 1986 (Coleoptera Carabidae Trechinae). Redia, Firenze, 78 (1): 141–147.
- Vasilikopoulos A., Balke M., Beutel R.G., Donath A., Podsiadlowski L., Pflug J.M., Waterhouse R.M., Meusemann K., Peters R.S., Escalona H.E., Mayer C., Liu S., Hendrich L., Alarie Y., Bilton D.T., Jia F., Zhou X., Maddison D.R., Niehuis O., Misof B., 2019. Phylogenomics of the superfamily Dytiscoidea (Coleoptera: Adephaga) with an evaluation of phylogenetic conflict and systematic error. Molecular Phylogenetics and Evolution, 135: 270–285. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.02.022>
- Vienna P., 1971. Gli Histeridae del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 19: 267–301.
- Vienna P., 1978. Elenco critico degli Histeridae di Puglia e considerazioni sulla transadriaticità di alcune entità. Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, 3: 49–54.
- Vienna P., 1980. Fauna d'Italia. Coleoptera Histeridae. XVI. Ed. Calderini, Bologna, 386 pp.
- Vienna P., 1999. Sulla presenza in Italia di *Saprinus lautus* Erichson, 1839 (Coleoptera, Histeridae). Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, 24: 121–122.
- Vigna Taglianti A., 1967. Note su alcuni Carabidae (Col.) della Regione Pugliese. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 22: 50–51.
- Vigna Taglianti A., 2005. Checklist e corotipi delle specie di Carabidae della fauna italiana. Appendice B, pp. 186–225. In: Brandmayr P., Zetto T. & Pizzolotto R. (Eds.), I Coleotteri Carabidi per la valutazione ambientale e la conservazione della biodiversità. Manuale operativo: APAt, Manuali e Linee Guida, 34: 240 pp.
- Vigna Taglianti A. & Bonavita P., 1995. Nuovi dati geonemici su Carabidi italiani. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 49 (1994): 137–149.
- Vigna Taglianti A., Spettoli R., Brandmayr P. & Algieri M.C., 2001. Note tassonomiche e corologiche su *Carabus granulatus* in Italia con descrizione di una nuova sottospecie di Calabria (Coleoptera Carabidae). Memorie della Società entomologica italiana, 80: 65–86.
- Vit S., 1985. Quelques elements de la faune coleopterologique resistant a la destruction de l'an-

- cienne foret de Pantano de Policoro (Basilicata). Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 85: 307–331.
- Vit S., 1985. Etude de la morphologie des espèces paléarctiques du genre *Eucinetus* Germar et quelques remarques sur son utilisation taxonomique (Coleoptera: Eucinetidae). Revue Suisse Zoologie, 92: 421–460.
- Vomero V., 1968. Nuovi reperti di Coleotteri Carabidi in Lucania. Bollettino dell'Associazione romana di entomologia, 23: 25–29.
- Wilson C., 2001. *Aphodius pedellus* (Degeer), a species distinct from *A. fimetarius* (Linnaeus) (Coleoptera: Aphodiidae). Tijdschrift voor Entomologie, 144: 37–143.
- Wilson C. & Angus R.B., 2004. A Chromosomal Analysis of the West European Species of *Aphodius* Illiger, subgenus *Aphodius* s. str. (Coleoptera: Aphodiidae). Tijdschrift voor Entomologie, 147: 259–264.
- Wittmer W., 1935. Risultati scientifici delle cacce entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro Della Torre e Tasso in Italia. IV. Malacodermata von M.te Pollino (Lucania). Bollettino della Società entomologica italiana, Genova, 67: 72–76.
- Wittmer W., 1974. Zur Kenntnis der Gattung *Malthinus* Latr. II (Col. Cantharidae) (60. Beitrag zur Kenntnis der palaarktischen Cantharidae). Entomologischen arbeiten aus dem Museum G. Frey, 25: 358–427.
- Wrase D.W. & Magrini P., 2012. Taxonomic revision of the mediterranean species of the genus *Amblystomus* Erichson, 1837, with description of a new species (Coleoptera, Carabidae, Harpalini, Amblystomina). Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 104: 1–77.
- Zahradník P., 2013. Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. Akademie České republiky, Praha, 349 pp., 60 pls.
- Zampetti M.F., 1979. Note sulla geonomia di alcuni Coleotteri Clavicorni. Bollettino della Società entomologica italiana, 111: 96–97.
- Zampetti M.F., 1982. Posizione sistematica di alcune specie appartenenti al genere *Bruchidius* Schilsky. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 383–410.
- Zampetti M.F. & Ricci M.S., 2012. Guida ai Coleotteri Bruchidi della Fauna Italiana. Darwin Edizioni, Roma, 430 pp.
- Zanetti A., 1971. Un nuovo *Stilicus* (Col., Staphylinidae) dell'Italia centromeridionale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 650–653.
- Zanetti A., 1977. Due nuove specie di Stafilinidi dell'Appennino. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 4: 307–315.
- Zanetti A., 1978. Note sulle specie italiane del genere *Acrolocha* Thoms. con descrizione di una nuova specie (Col. Staphylinidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 5: 547–553.
- Zanetti A., 1980a. Contributo alla conoscenza delle specie italiane del genere *Cryptobium* Mannh. con note sulle specie europee e del Caucaso. Società Veneziana di Scienze Naturali. Lavori, Venezia, 5: 31–41.
- Zanetti A., 1980b. Note su *Eusphalerum italicum* (Koch) e sulle specie vicine, con descrizione di quattro nuove entità (Coleoptera: Staphylinidae). Annali del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova, 83: 159–173.
- Zanetti A., 1982. Materiali per una revisione degli *Eusphalerum* italiani e centro europei con descrizione di nuove sottospecie e note sinonimiche. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8: 97–156.
- Zanetti A., 1983. Descrizione di *Osellia calabra* gen. n. sp. dell'Italia Meridionale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 9: 423–436.
- Zanetti A., 1987. Fauna d'Italia. Coleoptera Staphylinidae. Omaliini. Ed. Calderini, Bologna, vol. XXV, XII + 472 pp.
- Zanetti A., 1991. Osservazioni su alcuni *Quedius* (*Raphirus*) del gruppo *nemoralis* Baudi, con descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Staphylinidae). Animalia, 18: 125–139.
- Zanetti A., 2004. *Eusphalerum martiniae* n. sp. from southern Italy (Coleoptera Staphylinidae: Omaliinae). Bollettino del Museo Regionale di Scienze naturali di Torino, 21: 487–494.
- Zanetti A., 2005a. Insecta Coleoptera Staphylinidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 181 + CD-ROM.
- Zanetti A., 2005b. Insecta Coleoptera Staphylinidae Omaliinae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 185–186 + CD-ROM.
- Zanetti A., 2011a. New synonymies in the genus *Liogluta* Thomson, 1858, with notes on Italian species (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 35, Botanica Zoologia: 147–154.
- Zanetti A., 2011b. Contribution to the knowledge of Staphylinidae from southern Sardinia (Coleoptera), pp. 331–352. In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada L. & Cerretti P. (Eds.), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forests network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5. Cierre Edizioni, Sommacampagna, Verona.

- Zanetti A., 2012. New species and new synonymies in the Mediterranean Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia*, 36: 55–66.
- Zanetti A. & Pace R., 2005. Insecta Coleoptera Staphylinidae Aleocarinae (genere *Leptusa* Kraatz, 1859). In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 189–190 + CD-ROM.
- Zanetti A. & Tagliapietra A., 2005. Studi sulle taxocenosi a Staphylininae in boschi di latifoglie italiani (Coleoptera, Staphylinidae). *Studi trentini di Scienze naturali, Acta biologica*, 81 (2004): 207–231.
- Zanetti A., Sette A., Poggi R. & Tagliapietra A., 2016. Biodiversity of Staphylinidae (Coleoptera) in the Province of Verona (Veneto, Northern Italy). *Memorie della Società entomologica italiana*, 93: 3–237.
- Zhang S.-Q., Che L.-H., Li Y., Liang D., Pang H., Ślipiński A. & Zhang P., 2018. Evolutionary history of Coleoptera revealed by extensive sampling of genus and species. *Nature Communications*, 9 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02644-4>
- Zoia S., 1987. Appunti su Catopidi italiani con descrizione di una nuova specie. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 119: 117–122.
- Zoia S., 1989. Sulla presenza in Italia di *Catops kirby* (Spence, 1815) e *Catops dorni* Reitter, 1913 (Coleoptera, Cholevidae). *Bollettino dell'Associazione romana di entomologia*, 44: 61–66.
- Zoia S., 1990. Note sui *Namadeus* italiani con descrizione di *Namadeus italicus* n. sp. (Coleoptera, Cholevidae). *Bollettino del Museo Regionale di Scienze naturali di Torino*, 8: 233–242.
- Zoia S., 2014. The Mediterranean *Colaspidea* (Coleoptera Chrysomelidae Eumolpinae). *Entomologia*, 2 (159): 1–34. <https://doi.org/10.4081/entomologia.2014.159>
- Zoia S. & Latella L., 2005. Insecta Coleoptera Cholevidae e Platypyllidae. In: Ruffo S. & Stoch F. (Eds.), Checklist e distribuzione della Fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, Sezione Scienze della Vita 16: 177–180 + CD-ROM.
- Zombori L., 1984. The Symphyta of the Doderò Collection. 3. The list of species (Hymenoptera). *Bollettino della Società entomologica italiana*, 116: 105–120.
- Zunino M., 1972. Revisione delle specie paleartiche del genere *Onthophagus* (Coleoptera, Scarabaeoidea). I. Il sottogenere *Euonthophagus* Balth. *Bollettino del Museo di Zoologia Università di Torino*, 1: 1–28.
- Zuppa A.M. & Osella G.B., 1999. Revisione del genere *Aparopion* Hampe, 1861 (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 23: 1–49.
- Zyła D. & Solodovnikov A., 2019. Multilocus phylogeny defines a new classification of Staphylininae (Coleoptera, Staphylinidae), a rove beetle group with high lineage diversity. *Systematic Entomology*, 44: 1–14. <https://doi.org/10.1111/syen.12382>